




535
13
1



Library of:
Ernest E. Williams

Ernst H. Rieuwerts
Museum of Comparative Zoology
Harvard University

Er

13,20^h
1

KATALOG
DER
REPTILIEN-SAMMLUNG
IM
MUSEUM
DER
SENCKENBERGISCHEN NATURFORSCHENDEN
GESELLSCHAFT
IN
FRANKFURT AM MAIN.

II. THEIL
(SCHLANGEN).

Von
Prof. Dr. O. Boettger.

Abgeschlossen Mitte Mai 1898.

Frankfurt a. M.
Druck von Gebrüder Knauer.

100.1
100.1
100.1
100.1
100.1

KATALOG
DER
REPTILIEN-SAMMLUNG
IM
MUSEUM
DER
SENCKENBERGISCHEN NATURFORSCHENDEN
GESELLSCHAFT
IN
FRANKFURT AM MAIN.

II. THEIL
(SCHLANGEN).

Von
Prof. Dr. **O. Boettger.**

Abgeschlossen Mitte Mai 1898.

Frankfurt a. M.
Druck von Gebrüder Knauer.

Einleitung.

Mit dem vorliegenden Hefte ist die Reihe der herpetologischen Kataloge des Museums der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft abgeschlossen. Der „Katalog der Batrachier-Sammlung“ erschien Mitte August 1892, während der erste Teil des „Kataloges der Reptilien-Sammlung“, der die Rhynchocephalen, Schildkröten, Krokodile, Eidechsen und Chamäleons enthält, Mitte August 1893 veröffentlicht werden konnte.

In Dr. Eduard Rüppell's „Verzeichnis der in dem Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft aufgestellten Sammlungen. Dritte Abteilung: Amphibien. Frankfurt a. M. Gedruckt bei Joh. Dav. Sauerländer 1845, 4^o. 24 pagg.“, das die Kriechtiere und Lurche umfaßt, sind die Schlangen auf Seite 14—21 aufgezählt. Danach waren vor 55 Jahren — im August 1843 — von Ophidiern im Museum zur Aufstellung gekommen:

Familien	Gattungen	Arten	Stücke
Giftlose Schlangen	25 . . .	118 . . .	306
Giftschlangen	. . 12 . . .	32 . . .	65
2	37	150	371

Alle diese Arten und der größte Teil der alten Stücke liegen heute noch mit ihren Originaletiketten in unserer Sammlung. Über die Schenker dieses Grundstockes hat Herr Dr. Rüppell schon im Vorwort zu dem genannten ersten Verzeichnisse Mitteilungen gemacht, die ich schon im I. Teile des „Kataloges der Reptilien-Sammlung“ pag. IV erwähnt habe. Zu den dort erwähnten gütigen Gebern kommen aus älterer Zeit noch die längst verstorbenen Herren Herzog Max E. J. N. von Leuchtenberg in München und W. A. Bernus, W. Rosenbach, Dr. W. Schneider, Gebrüder G. & M. Worms und Frau von Panhuijs, sämtlich aus Frankfurt a. M., hinzu.

Zu der großen Anzahl von neueren Schenkern, deren Namen im „Katalog der Reptilien-Sammlung, I. Teil“ pag. IV—V und pag. 125—129 aufgezählt worden sind, treten noch folgende, deren Gaben durch Zahl, Seltenheit oder Schönheit besonders hervorragten:

- Herr Max Bamberger, Kaufmann in Frankfurt a. M.
„ Dr. med. O. Benecke in Deli, Sumatra.
„ Dir. Dr. Carlos Berg in Buenos-Aires, Argentina.
„ J. Blum, Oberlehrer in Frankfurt a. M.
„ Ferdinand Emmel, Kaufmann in Hamburg.
„ Friedrich Emmel, Kaufmann in Arequipa, Peru.
Herren Gebr. Egbert & Theodor Engelhard in Deli, Sumatra.
Herr C. Eylandt, Naturalist in Askhabad, Transkaspien †.
„ Dr. Finger, Oberlehrer in Frankfurt a. M. †.
„ Joh. von Fischer in Montpellier, Hérault.
„ Rud. Henrich, Brauer in Frankfurt a. M.
„ Gust. Herath aus Frankfurt a. M.
„ Dr. L. von Heyden, Major z. D. in Frankfurt a. M.
„ Ferdinand Knoblauch, Konsul in Frankfurt a. M. †.
„ Otto Koch, Kaufmann in Cebú, Philippinen †.
Frau H. Krämer, Wwe. in Frankfurt a. M.
Herr F. C. Lehmann, Konsul in Popayán, U. S. Columbia.
„ Dir. Dr. Heinrich Lenz in Lübeck.
„ E. Lörsch in Frankfurt a. M.
„ Dr. Löwenthal in Frankfurt a. M. †.
Das Naturhistorische Museum in Madras, Brit.-Indien.
Herr F. Mauß, Konsul in Valencia, Venezuela.
„ Fr. de Mimont, Gutsbesitzer in Xenochóri, Euböa †.
„ Dr. med. Pauli, Hofrat in Frankfurt a. M. †.
„ O. Retowski, Staatsrat in Theodosia, Krim.
„ Prof. Dr. Ferdinand Richters in Frankfurt a. M.
„ Dr. med. H. Schädle in Casablanca, Marokko.
„ Prof. Dr. Oskar Schneider in Dresden.
„ G. von Schröter, Konsul in San José, Costa Rica.
„ Albrecht Seitz, Kaufmann in Hamburg.
„ Prof. Dr. R. W. Semon in Jena.
„ Dir. August Siebert in Frankfurt a. M.
„ Hans Simon, Kaufmann in Stuttgart.
„ Dr. med. Stratz in Haag, Holland.

Unser heutiger Bestand an Schlangen verteilt sich in folgender Weise auf Familien, Gattungen, Arten, Nummern und Stücke¹⁾:

Schlangen.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern	Stücke
<i>Typhlopidae</i>	1	23	56	125
<i>Glauconiidae</i>	1	7	12	15
<i>Boidae</i>				
a) Pythoninae	5	10	40	45
b) Boinae	7	21	61	89
<i>Ilysiidae</i>	2	3	17	29
<i>Uropeltidae</i>	3	8	8	22
<i>Xenopeltidae</i>	1	1	3	10
<i>Colubridae</i>				
a) Acrochordinae	2	2	8	25
b) Colubrinae	79	285	818	1386
c) Rhachiodontinae	1	1	5	13
d) Homalopsinae	4	8	36	65
e) Dipsadomorphinae	37	84	298	461
f) Hydrophiinae	7	15	42	77
g) Elapinae	18	51	124	168
<i>Amblycephalidae</i>	3	9	18	30
<i>Viperidae</i>				
a) Viperinae	7	23	102	148
b) Crotalinae	4	33	76	129
9	182	584	1724	2837

Vergleichen wir die Zahl unserer Schlangen (584) mit der der im Jahre 1896 überhaupt bekannten Arten (1639), so besitzen wir also genau 35,63% davon. Wir sind also an Schlangen wesentlich reicher als an Eidechsen. Vor 55 Jahren hatten wir 150 Schlangenarten, jetzt 584, was eine Vermehrung unseres Bestandes um 434 Arten in diesem Zeitabschnitte bedeutet.

Sehr reich ist unsere Sammlung auch an Originalexemplaren, „Typen“, die durch Reuß, Rüppell, Jan. Werner und den Verfasser s. Z. als neu beschrieben worden sind. In der folgenden Aufzählung dieser Typen beschränke ich mich wie in

¹⁾ Wo in diesem Kataloge „Zahl, Stücke“ steht, wurde in der folgenden Aufstellung stets nur die Zahl „sieben“ gerechnet.

dem I. Teile dieses Kataloges auf die Arten, deren Berechtigung allgemein anerkannt zu sein scheint, während ich die Namen der neuen Varietäten und die der in die Synonymie gefallenen Formen der geringeren Wichtigkeit wegen übergehe.

Liste der in der Sammlung der
Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft
liegenden Schlangentypen.

1. *Typhlops reuteri* Boettger. No. 7021a. Nossibé.
Zoolog. Anzeiger 1881 pag. 650.
2. *Typhlops madagascariensis* Bttgr. No. 7025,1a. Nossibé.
Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 11. 1877 pag. 3. Taf. 1. Fig. 1.
3. *Typhlops ruber* Bttgr. No. 7031,1a. Insel Samar.
Zoolog. Anzeiger 1897 pag. 164.
4. *Typhlops mucronatus* Bttgr. No. 7037,2a. Nossibé.
Ebenda 1880 pag. 279.
5. *Typhlops congicus* Bttgr. No. 7040a. Congo.
Ebenda 1887 pag. 650.
6. *Typhlops schinzi* Bttgr. No. 7047,1a. Kalahari.
Ber. Senck. Nat. Ges. 1887 pag. 154. Taf. 5. Fig. 1.
7. *Typhlops simoni* (Bttgr.). No. 7051,1a. Syrien.
Ebenda 1878—79 pag. 58 (*Omychocephalus*).
8. *Typhlops bisubocularis* Bttgr. No. 7053a. Java.
Zoolog. Anzeiger 1893 pag. 336.
9. *Eryx thebaicus* Reuß. No. 7125c. Ober-Ägypten.
Mus. Senck. Bd. 1, 1834 pag. 134.
10. *Tropidonotus punctiventris* Bttgr. No. 7216a. Insel Halmahera.
Zoolog. Anzeiger 1895 pag. 129.
11. *Tropidonotus stumpffi* (Bttgr.). No. 7247a. Nossibé.
Ebenda 1881 pag. 358 (*Dromicus*).
12. *Tropidonotus halmahericus* Bttgr. No. 7264,1b. Insel Halmahera.
Ebenda 1895 pag. 130.
13. *Helicops pietiventris* Werner. No. 7275a. Brasilien.
(Diagnose noch nicht veröffentlicht).
14. *Parahadinaea melanogaster* Bttgr. No. 7313,1a. Nossibé.
Diagnose s. pag. 33 unter genannter Nummer.
15. *Tetralepis fruhstorferi* Bttgr. No. 7320a. Java.
29. 32. Ber. Offenbach. Ver. f. Natrk. 1892 pag. 125.

16. *Gonionotophis rossi* (Bttgr.). No. 7323,1a. Kamerun.
Zool. Anzeiger 1892 pag. 318 (*Gonionotus*).
17. *Zamenis bitacuiatus* Bttgr. No. 7392,1a. Guatemala.
Diagnose s. pag. 42 unter genannter Nummer.
18. *Zamenis mummifer* (Reuß). No. 7407a. Ägypten.
Mus. Senck. Bd. 1. 1834 pag. 135 (*Coluber*).
19. *Coluber moellendorffi* (Bttgr.). No. 8056,1a. Süd-China.
Zool. Anzeiger 1886 pag. 520 (*Cynophis*).
20. *Coluber schmackeri* Bttgr. No. 8056,2a. Liukiu-Inseln.
Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1895 pag. 108.
21. *Rhadinaea kinkelini* Bttgr. No. 8178,1a. Nicaragua.
Diagnose s. pag. 68 unter genannter Nummer.
22. *Fleischmannia obscura* Bttgr. No. 8185a. Costa Rica.
Diagnose s. pag. 69 unter genannter Nummer.
23. *Coronella amaliae* (Bttgr.). No. 8193a. Marokko.
Zool. Anzeiger 1881 pag. 570 (*Rhinechis*).
24. *Ablabes herminae* Bttgr. No. 8277a. Liukiu-Inseln.
Ebenda 1895 pag. 277.
25. *Ablabes philippinus* Bttgr. No. 8281a und b. Philippinen.
Ebenda 1897 pag. 164.
26. *Atractus lehmanni* Bttgr. No. 8310a. Ecuador.
Diagnose s. pag. 80 unter genannter Nummer.
27. *Atractus emmeli* (Bttgr.). No. 8311,1a. Bolivia.
Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 192. Fig. (*Geophis*).
28. *Calamorbiddium kuckenthali* Bttgr. No. 8330a. Insel Batjan.
Diagnose s. pag. 82 unter genannter Nummer.
29. *Calamaria semiannulata* Bttgr. No. 8345a. Borneo.
Diagnose s. pag. 84 unter genannter Nummer.
30. *Hypsirhina alternans* (Reuß). No. 9004,1a. Java.
Mus. Senck. Bd. 1. 1834 pag. 155. Taf. 9. Fig. 3 (*Brachyorrhos*).
31. *Stenophis granuliceps* (Bttgr.). No. 9041a. Nossibé.
Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 11. 1877 pag. 14. Taf. 1. Fig. 3 (*Dipsas
gaimardi* var.).
32. *Tarbophis obtusus* (Reuß). No. 9053a. Ägypten.
Mus. Senck. Bd. 1. 1834 pag. 137 (*Coluber*).
33. *Hemirhagerrhis kelleri* Bttgr. No. 9119,1a. Somaliland.
Zoolog. Anzeiger 1893 pag. 129.
34. *Coelopeltis moilensis* (Reuß). No. 9143c. Arabien.
Mus. Senck. Bd. 1. 1834 pag. 142. Taf. 7. Fig. 1 (*Coluber*).

35. *Microclaps muelleri* Bttgr. No. 9249 a. Syrien.
Ber. Senck. Nat. Ges. 1879—80 pag. 137. Taf. 3. Fig. 2.
36. *Diemenia maculiceps* Bttgr. No. 9321 a. Queensland.
Diagnose s. pag. 116 unter genannter Nummer.
37. *Hoplocephalus bitorquatus* (Jan). No. 9349 a. Neusüdwaales.
Rev. et Mag. Zool. 1859 pag. 128 (*Aleeto*).
38. *Elapechis hessei* (Bttgr.). No. 9360 a. Congo.
Zool. Anzeiger 1887 pag. 651 (*Elapsoidea*).
39. *Elapechis boulengeri* (Bttgr.). No. 9361 a. Sambesi.
Ebenda 1895 pag. 92 (*Elapsoidea*).
40. *Amblycephalus moellendorffi* (Bttgr.). No. 9443.1 a. Süd-China.
Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1885 pag. 125 (*Pareas*).
41. *Leptognathus peruana* Bttgr. No. 9448 a. Peru.
Diagnose s. pag. 128 unter genannter Nummer.
42. *Lachesis nummifera* (Rüppell). No. 9544,1 a. Mexiko.
Verz. Senck. Mus. Amphib. 1845 pag. 21 (*Atropos*).
43. *Lachesis lutea* (Bttgr.). No. 9553 a. Liukiu-Inseln.
Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1895 pag. 111 (*Trimeresurus*).

Dem vorliegenden Kataloge wurden in Anmerkungen die Beschreibungen von drei neuen Gattungen (*Pararhadimaca*, *Fleischmannia* und *Calamorhabdium*) und von je einer neuen Art von *Zamenis*, *Rhadimaca*, *Atractus*, *Calamaria*, *Diemenia* und *Leptognathus* beigegeben. Die Diagnosen oder Fundortsangaben von *Stegonotus muelleri* D. B., *Zamenis mentorarius* (D. B.) und *florulentus* (Geoffr.), *Atractus reticulatus* Blgr. und *Hemibungarus fasciatus* (Pts.) konnten ebenfalls vervollständigt werden.

Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich betreffs der Konservierung, Aufstellung und Etikettierung und Nummerierung der Reptilsammlung auf das, was ich 1892 im „Katalog der Batrachier-Sammlung“ pag. VII—IX der Vorrede gesagt habe.

Die Bestimmung und Anordnung geschah nach dem neuen Boulenger'schen System an der Hand der Kataloge des British Museums:

„G. A. Boulenger, Catalogue of the Snakes in the British Museum (Nat. Hist.). London: Vol. I, 1893; Vol. II, 1894; Vol. III, 1896. 8^o.“

Auch bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht verfehlen, meinen Dank auszusprechen für die fürsorgliche Unterstützung, die die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft und die Herren Kustoden Adam und August Koch in richtiger Würdigung der Verhältnisse der Vergrößerung und der Erhaltung besonders auch der Reptilsammlung widmen. Wie bisher ist der Sektionär für Herpetologie auch für die Folge bereit, die Bestimmung eingeschickter Reptilien und Batrachier — soweit es ihm seine Zeit gestattet — gegen Überlassung von Dubletten für unsere Sammlung zu übernehmen und den Einsendern schnell und gern Mitteilungen über Namen, geographische Verbreitung, Giftigkeit oder Unschädlichkeit u. s. w. der vorgelegten Objekte zu machen.



Ordnung

OPHIDIA.

Familie I. Typhlopidae.

Genus I. Typhlops *Schneid.*

1. *Typhlops lineatus* Boie.

Boulenger, Cat. Snakes Brit. Mus. (N. H.) Vol. I. 1893 pag. 15.

7014a. Zahlr. Stücke. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

7014b. Erw. Atschin, **Nord-Sumatra**. Gek. 1882 von Konrad Kläsi, Zürich.

2. *Typhlops braminus* (Daud.).

Boulenger, Cat. I pag. 16; Boettger, Abh. Senck. Ges. Bd. 11, 1879 pag. 459, Taf. 1, Fig. 1 und Zool. Anzeiger 1882 pag. 479 (*T. euproctus*).

7016a. 2 erw. Dapitan, **Nord-Mindanao**. Gesch. 1893 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

7016b. Erw. Insel **Ternate**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

7016c. Jung. Insel **Halmheira**. Erh. 1895 von derselben.

7016d. Erw. Insel **Bangka**. Gek. 1881 von Konrad Kläsi, Zürich.

7016e. Erw. Gebirge Lo-fon-shan bei Kanton, **Süd-China**. Gek. 1886 von Otto Herz, St.-Petersburg.

7016f. Zahlr. Stücke. **Madras**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.

7016g. Erw. Insel **Cebu**, Philippinen. Gesch. 1890 von Otto Koch, daselbst.

7016h. Zahlr. Stücke. Manila, **Luzon**. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, daselbst.

7016i. Erw. **Mindanao**. Gesch. 1888 von demselben.

7016k. Erw. Nilgiris, **Süd-Indien**. Gesch. 1890 vom Museum in Madras.

7016l. Erw. **Ceylon**. Gesch. 1846 von W. Worms.

7016m. Erw. Insel Hainan, **Süd-China**. Gek. 1886 von Otto Herz, St.-Petersburg.

7016n. 6 erw. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

7016o. Erw. Atschin, **Nord-Sumatra**. Gek. 1882 von Konrad Kläsi, Zürich.

7016p. 3 erw., 1 jung. Lukubé auf **Nossibé**. Gesch. 1881–83 von Anton Stumpff, daselbst.

- 7016q. Halbw. (Typus von *T. euproctus* Bttgr.) **Ebendaher**. Gesch. 1882 von demselben.
7016r. 2 erw. Ambatolampy. Bembatokabai. **West-Madagaskar**. Gesch. 1897 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.
7016s. Erw. Insel **Cebu**. Gesch. 1897 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila, und Otto Koch, Cebu.
7016t. Zahlr. Stücke. Majunga. **West-Madagaskar**. Gesch. 1897 von Dr. A. Voeltzkow.
7016u. Erw. Betsako. N.-Majunga. **West-Madagaskar**. Gesch. 1897 von demselben.

var. *pammeces* Gthr.

Günther, Rept. Brit. India pag. 176. Taf. 16. Fig. C (*tenuis*).

- 7016.1a. Halbw. **Madras**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.

3. *Typhlops reuteri* Bttgr.

Boettger, Zool. Anzeiger 1881 pag. 659 (nächstverwandt *T. comorenensis* Blgr., aber mit schmälereim Rostrale und kürzerem Schwanz) und 1882 pag. 478 (*T. lenzi*).

- 7021a. Erw. Lukubé auf **Nossibé**. Gesch. 1881 von Anton Stumpff, daselbst.
7021b. 3 erw. (Typen von *T. lenzi* Bttgr.) **Ebendaher**. Gesch. 1881--83 von demselben.

4. *Typhlops vermicularis* Merr.

Boulenger, Cat. I pag. 21; Boettger, Zool. Jahrb. Bd. 3, 1888 pag. 920.

- 7022a. Erw. Prevesa. **Epirus**. Gesch. 1892 von César Conéménos, daselbst.
7022b. Erw. Insel **Euböa**. Gesch. 1880 von Fr. Joséphine Thiesse, Chalkis.
7022c. Erw. Xenochori. **Nord-Euböa**. Gesch. 1891 von Fr. de Mimont, daselbst.
7022d. Halbw. (Rüppell, Cat. II EEE3a) Nisib. **Anatolien**. Gesch. 1840 von Dr. Schneider, hier.
7022e. 6 Ste. **Jerusalem**. Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.

5. *Typhlops muelleri* Schlegel.

Boulenger, Cat. I pag. 25.

- 7025a. Erw. Reich Deli. **Nord-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens Hohlwiesner, hier.

6. *Typhlops madagascariensis* Bttgr.

Boulenger, Cat. I pag. 25; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 11, 1877 pag. 3. Taf. 1. Fig. 1.

- 7025.1a. Erw. **Nossibé** (Madagaskar). Gesch. 1875 von Konsul C. Ebenau, Hamburg.

7. *Typhlops flaviventer* Pts.

Boulenger, Cat. I pag. 25.

- 7025.2a. Erw. Insel **Batjan**. Erh. 1895 von der Ruppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.
7025.2b. 3 erw. See Konorra auf **Halmabeira**. Erh. 1895 von derselben.
7025.2c. Erw. (Vorderhälfte). Mansinam Adoréh. **Nordwest-Neuguinea**.
Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strabell, Bonn.

8. *Typhlops reticulatus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 27.

- 7027.2a. Erw. (Ruppell, Cat. II EEE 2a). **Surinam**. Alte Sammlung 1845.

var. *crassa* Jan.

Jan, Icon. Ophid. Lief. 5. Taf. 5. Fig. 7.

- 7027.3a. 2 erw. (Ruppell, Cat. II EEE 1a). **Süd-Amerika**. Get. 1841 vom Naturhist. Museum in Darmstadt.

var. *troscelli* Jan.

Jan, Icon. Ophid. Lief. 4. Taf. 6. Fig. 1c.

- 7028a. Erw. **Trinidad**, Westindien. Gesch. 1888 von Ingenieur G. Gerold, Port of Spain.

9. *Typhlops lumbricalis* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 31.

- 7031a. Erw. **Süd-Amerika**. Get. 1882 vom Naturh. Museum in Lübeck.
7031b. Halbw. Cap Haytien, **Haiti**. Gek. 1888 vom Naturh. Institut Linnaea, Berlin.

10. *Typhlops ruber* Bttgr.

Boettger, Zoolog. Anzeiger 1897 pag. 164.

- 7031.1a. Erw. Insel **Samar**, Philippinen. Gesch. 1897 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila, und Otto Koch, Cebu.

11. *Typhlops polygrammicus* Schlg.

Boulenger, Cat. I pag. 34; Jan, Icon. Ophid. pag. 14. Lief. 9. Taf. 1. Fig. 2 (*T. rueppelli*).

- 7034.2a. 4 erw. (Typen von *T. rueppelli* Jan). Sydney, **Neusüdwaales**. Gesch. 1862 von Adam Becker, daselbst.

12. *Typhlops wiedi* Pts.

Boulenger, Cat. I pag. 36.

7036a. Erw. Burnett River, **Queensland**. Gesch. 1894 von Prof. Dr. R. W. Semon, Jena.

13. *Typhlops mucronatus* Bttgr.

Boulenger, Cat. I pag. 37; Boettger, Zool. Anzeiger 1880 pag. 279 und Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 12, 1881 pag. 438, Taf. 1, Fig. 1.

7037.2a. 4 erw. Lukubé auf **Nossibé**. Gesch. 1880—81 von Konsul C. Ebenau und Anton Stimpff, daselbst.

14. *Typhlops boettgeri* Blgr.

Boulenger, Cat. I pag. 39, Taf. 2, Fig. 6.

7039.1a. 3 halbw., 2 jung. Majunga, **West-Madagaskar**. Gesch. 1897 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.

15. *Typhlops congicus* Bttgr.

Boulenger, Cat. I pag. 40; Boettger, Zool. Anzeiger 1887 pag. 650 und Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 44, Taf. 1, Fig. 5.

7040a. Erw. Povo Neronna bei Banana **Unter-Congo**. Gek. 1886 von Paul Hesse, Venedig.

16. *Typhlops punctatus* (Leach).

Boulenger, Cat. I pag. 42; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 42 (*T. eschrichti*).

7042a. Erw. (var. Ae Blgr.) **Goldküste**, Grenze gegen Aschantiland. Gesch. 1884 von Hans Simon, Stuttgart.

var. *intermedia* Jan.

Boulenger l. c. pag. 43.

7043.1a. 4 erw. Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1886 von Paul Hesse, Venedig.

var. *nigrolineata* Hallow.

Boulenger l. c. pag. 43.

7043.2a. 2 erw. **Kamerun**. Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz, Berlin.

17. *Typhlops delalandei* Schlg.

Boulenger, Cat. I pag. 45.

var. *paucisquamata* Bttgr.

Boettger, 22/23. Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1883 pag. 155.

7045 a. 3 erw. mit 26 Schuppenreihen um die Rumpfmittle. Smithfield.
Transvaal. Gesch. 1882 von Hans Simon. Stuttgart.

18. *Typhlops dinga* (Pts.).

Boulenger, Cat. I pag. 45.

7045.1a. Halb. Boroma am **Sambesi.** Gesch. 1894 von Prof. Dr. Osk.
Boettger. hier.

19. *Typhlops mucruso* (Pts.).

Boulenger, Cat. I pag. 46.

7046.1a. Halb. (var. *varia* Pts.). Dar-es-Salaam, **Ost-Afrika.** Gek. 1896
vom Naturh. Museum in Berlin.

20. *Typhlops schinzi* Bttgr.

Boulenger, Cat. I pag. 47; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1887
pag. 154. Taf. 5. Fig. 1.

7047.1a. Erw. 1 Noi Nas bei Ghanze, **Nord-Kalahari.** Gesch. 1887 von Prof.
Dr. Hans Schinz. Zürich.

21. *Typhlops simoni* (Bttgr.).

Boulenger, Cat. I pag. 51; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1878
—79 pag. 58 und 1880—81 pag. 135. Taf. 3. Fig. 1 (*Ongchocephalus*).

7051.1a. Zahlr. Stücke. Haiffa, **Syrien.** Gesch. 1879—93 von Hans Simon.
Stuttgart.

22. *Typhlops bisubocularis* Bttgr.

Boettger, Zool. Anzeiger 1893 pag. 336.

7053 a. Erw. **West-Java.** Gek. 1893 von Hans Eruistorfer, Berlin.

23. *Typhlops ater* Schlg.

Boulenger, Cat. I pag. 53.

7053.1a. 4 erw. Soa Konorra auf **Hahualheira.** Erh. 1895 von der Rüppell-
reise Prof. Dr. W. Kükenthals. Jena.

Familie II. Glauconiidae.

Genus I. *Glauconia* Gray.

1. *Glauconia distanti* Blgr.

Boulenger, Cat. I pag. 62.

7062a. Erw. Boroma am **Sambesi**. Gesch. 1895 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

2. *Glauconia albifrons* (Wgl.).

Boulenger, Cat. I pag. 63.

7063a. Erw. **Venezuela**. Gesch. 1893 von Dr. Heimr. Lenz, Lübeck.

7063b,c. Erw. und jung. **Trinidad**. Gesch. 1894 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.

7063d. Erw. (var. *albipuncta* Burm.). Buenos Aires, **Argentina**. Gek. 1877 von Pöhl, Hamburg.

7063e. 2 erw. (var. *albipuncta* Burm.). Cujapa, Staat **Matogrosso**, Brasilien. Gesch. 1886 von Jakob Schumacher, hier.

7063f. Erw. Mapiri, Nebenfluss des Beni, **Bolivia**. Gesch. 1888 von Ferdinand Emmel, Arequipa.

7063g. Erw. Santa Ana, Prov. Cuzco, **Peru**. Gesch. 1890 von Friedrich Emmel, Gelnhausen.

3. *Glauconia conjuncta* (Jan).

Boulenger, Cat. I pag. 67; Boettger, 22, 23, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1883 pag. 156 (*Stenostoma nigricans*).

7067.2a. 2 erw. Smithfield, **Transvaal**. Gesch. 1882 von Hans Simon, Stuttgart.

4. *Glauconia scutifrons* (Pts.).

Boulenger, Cat. I pag. 68.

7068a. Erw. Bethanien, **Namaland**. Gesch. 1891 von Dr. A. Schenck, Halle (Saale).

5. *Glauconia sundevalli* (Jan).

Boulenger, Cat. I pag. 68.

7068.1a. Erw. Akkra, **Goldküste**. Gesch. 1885 von Hans Simon, Stuttgart.

6. *Glauconia bicolor* (Jan).

Boulenger, Cat. I pag. 69; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1886 pag. 59.

7069a. Erw. Akkra, **Goldküste**. Gesch. 1887 von Major Dr. L. von Heyden, hier.

7. *Glauconia macrolepis* (Pts.).

Boulenger, Cat. I pag. 69.

7069.1a. Erw. San Esteban bei Puerro Cabello, **Venezuela**. Gesch. 1895 von Konsul F. Mauss, daselbst.

Familie III. Boidae.

Subfamilie I. Pythoninae.

Genus I. Nardoa Gray.

1. *Nardoa boa* (Schlg.).

Boulenger, Cat. I pag. 76.

7076a. 2 Halbw. Mioko, **Neuirland**. Gek. 1887 von Pöhl, Hamburg.

Genus II. Liasis Gray.

1. *Liasis childreni* Gray.

Boulenger, Cat. I pag. 77, Taf. 4, Fig. 1.

7077a. Erw. Baudin Island, **Nord-Australien**. Get. 1893 vom British Museum (N. H.). London.

Genus III. Python Daud.

1. *Python spilotes* (Lacép.).

Boulenger, Cat. I pag. 82.

7082a. Halbw. (typ.) **Neusüdwaies**. Gesch. 1844 von Konsul W. Kirchner, Wiesbaden.

7082b. Halbw. (typ.) Rüppell, Cat. III E 3a als *P. punctatus*. **Ebendaher**. Get. 1840 vom Hofmuseum in Wien.

7082c. Erw. (typ.) **Neuholland**. Gesch. 1892 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

7082d. Erw. (gestopft). **Ebendaher**. Gek. 1846 von Boissoucan.

var. *B* (*variegata* Krefft).

Boulenger, l. c. pag. 83.

7083a. Erw. **Neusüdwaies**. Gesch. 1891 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

var. *variegata* Gray.

Boulenger, l. c. pag. 83.

7083.1a. Halbw. Burnett River, **Queenland**. Gesch. 1894 von Prof. Dr. R. W. Semou, Jena.

2. *Python amethystinus* (Schnd.).

Boulenger, Cat. I pag. 83.

7084a. Erw. Soa Konorra auf **Halmahera**. Erf. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthal, Jena.

7084b. Jung. **Ebendaher**. Erf. 1895 von derselben.

7084c. Halbw. Stadt Haruku auf der Insel **Haruku** bei Ceram. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

3. *Python reticulatus* (Schnd.).

Boulenger, Cat. I pag. 85.

- 7085 a. Halbw. Reich Deli. **Nord-Sumatra**. Gesch. 1894 von Wwe. H. Krämer, hier.
- 7085 b. Jung u. ein Kopf. Insel **Batjan**. Erh. 1895 von der Ruppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.
- 7085 c. Halbw. Rüppell, Cat. III E 2 c als *P. schneideri*. **Java**. Get. 1838 vom Rijksmuseum in Leiden.
- 7085 d. Halbw. Atschin. **Nord-Sumatra**. Gek. 1882 von Konrad Kläsi, Zürich.
- 7085 e. Halbw. Rüppell, Cat. III E 2 d als *P. schneideri*. **Java**. Gesch. 1838 von Dr. von Siebold, Leiden.
- 7085 f. Kopf u. Schwanz eines erw. u. ein junges Stück. **Mittel-Luzon**. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
- 7085 g. Halbw. Wai auf Hiru. **Nord-Amboina**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strübel, Bonn.
- 7085 h. Halbw. Insel **Mindoro**. Get. 1889 von B. Schmacker, Shanghai.
- 7085 i. 2 halbw. Reich Deli. **Nord-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens Hohwiesner, hier.
- 7085 k. Halbw. Manila auf Luzon. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, daselbst.
- 7085 l. Erw. **Singapore**. Gek. 1877 von Hamburg.
- 7085 m. Erw. (gestopft). **Java** Rüppell, Cat. III E 2 b als *P. schneideri*. Get. 1832 vom Rijksmuseum in Leiden.
- 7085 n. Erw. (gestopft). **Ostindien**. Gek. 1846 von Boissonneau.
- 7085 o. Erw. (gestopft). **Java** (Rüppell, Cat. III E 2 a als *P. schneideri*). Gesch. 1838 von Dr. med. Dübel, Batavia.
- 7085 p. Halbw. Banjermasin. **Südost-Borneo**. Gek. 1894 von Wwe. H. Krieb, hier.

4. *Python sebae* (Gmel.).

Boulenger, Cat. I pag. 86.

- 7086 a. Halbw. Akkra. **Goldküste**. Gesch. 1887 von Major Dr. L. von Heyden, hier.
- 7086 b. Jung. Banana. **Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.
- 7086 c. 2 Junge. **West-Afrika**. Gesch. 1896 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

5. *Python molurus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 87.

- 7087 a. Erw. **Java**. Gesch. 1887 von der Neuen Zool. Gesellschaft, hier.
- 7087 b. Erw. **Britisch-Ostindien**. Gek. 1884 aus einer Menagerie.
- 7087 c. Erw. (gestopft). **Ostindien**. Gek. 1846 von Boissonneau.
- 7087 d. Erw. (gestopft). **Java** Rüppell, Cat. III E 1 e als *P. bicittatus*. Gesch. 1836 von Dr. med. Peitsch, Batavia.

- 7087 e und g. 2 erw. (gestopft). **Java** (Rüppell. Cat. III E 1 a—b als *P. bivittatus*). Gesch. 1838 von Dr. med. Döbel, Batavia.
7087 f. Erw. (gestopft). **Java**. Gek. 1884 aus einer Menagerie, hier.
7087 h. Erw. (gestopft). **Ostindien**. Gek. 1846 von Boissoneau.

6. *Python regius* (Shaw).

Boulenger. Cat. I pag. 88.

- 7089 a. Halbw. **West-Afrika**. Gek. 1877 von Hamburg.

Genus IV. Chondropython A. B. Mey.

1. *Chondropython viridis* (Schlg.).

Boulenger. Cat. I pag. 90; Boettger in Semon. Zool. Forsch. Bd. 5. pag. 120, Taf. 5. Fig. 3 (1894).

- 7090 a. Halbw. **Südost-Neuguinea**. Gesch. 1894 von Prof. Dr. R. W. Semon. Jena.

Genus V. Aspidites Pls.

1. *Aspidites melanocephalus* (Krefft).

Boulenger. Cat. I pag. 91; Boettger l. c. pag. 119.

- 7091 a. Erw. Cooktown, **Nord-Queensland**. Gesch. 1894 von Prof. Dr. R. W. Semon. Jena.

Subfamilie 2. Boinae.

Genus VI. Epicrates Wgl.

1. *Epicrates cenchris* (L.).

Boulenger. Cat. I pag. 95.

- 7095 a. 2 Junge. **Trinidad**. Gesch. 1895 von F. W. Urich und R. R. Mole. Port of Spain.
7095 b. Jung (Rüppell. Cat. III D 3 c). **Surinam**. Gek. 1838 vom Rijksmuseum in Leiden.
7095 c. Erw. (Rüppell. Cat. III D 3 b). Ilheos, **Brasilien**. Gesch. 1832 von Gebr. Koch. hier.
7095 d. Erw. (gestopft) **Brasilien** (Rüppell. Cat. III D 3 a). Gesch. 1832 von denselben.
7095 e. Halbw. Carácas, **Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller, hier.

var. *fusca* Gray.

Boulenger, Cat. I pag. 96.

- 7096 a. Halbw. **Trinidad**. Gesch. 1893 von F. W. Urich. Port of Spain.
7096 b. Halbw. (Rüppell, Cat. III D 3 d). **Venezuela**. Alte Sammlung 1845.
7096 c. Erw. **Trinidad**. Gesch. 1896 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.

2. *Epicrates striatus* (Fischer).

Boulenger, Cat. I pag. 96.

- 7096,2 a. Erw. **San Domingo**. Gek. 1877 von Hamburg.

Genus VII. Corallus Daud.

1. *Corallus cooki* Gray.

Boulenger, Cat. I pag. 99. Taf. 4, Fig. 3.

- 7099 a. Erw. (typ.) Insel **Grenada**. Gesch. 1893 von F. W. Urich und R. R. Mole. Port of Spain.
7099 b. Jung (typ.) **Trinidad**. Gesch. 1895 von denselben.
7099 c. Erw. (typ.) **Ebendaher**. Gesch. 1895 von denselben.

var. C.

Boulenger, l. c. pag. 100.

- 7100 a. Erw. **Grenada**. Gesch. 1895 von denselben.
7100 b. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1895 von denselben.

var. *ruschenbergi* Cope.

Boulenger, l. c. pag. 101.

- 7101 a. Erw. **Trinidad**. Gesch. 1893 von denselben.

2. *Corallus hortulanus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 101; ReuB. Mus. Senck. Bd. I. 1834 pag. 129 (*Bou modesta*).

- 7101.1 a. Kopf. San Fernando am Alto Orinoco, **Süd-Venezuela**. Gek. 1895 von Georg Hübner, Dresden.
7101.1 b. Halbw. Typus von *Bou modesta* Rss. c. Illicos, **Brasilien** Rüppell. Cat. III D 5 b). Gesch. 1835 von Gebr. Koch, hier.
7101.1 c. Halbw. Rüppell, Cat. III D 5 a). **Surinam**. Gek. 1838 vom Rijksmuseum in Leiden.

3. *Corallus caninus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 102.

7102.1a. Halbw. (Rüppell, Cat. III D 4 a). **Brasilien**. Alte Sammlung 1845.

7102.1b. Jung. **Unterer Rio Madeira**. Gek. 1896 von Georg Hübner, Dresden.

4. *Corallus madagascariensis* (D. B.).

Boulenger, Cat. I pag. 103; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges.

Bd. 11. 1877 pag. 21 und Bd. 11, 1879 pag. 470.

7103 a. 3 halb w. **Nossibé**. Gesch. 1879—81 von Konsul C. Ebenau und Anton Stumpff, daselbst.

Genus VIII. Enygrus Wgl.

1. *Enygrus australis* (Montr.).

Boulenger, Cat. I pag. 105.

7105 a. Halb w. **Neuhebriden**. Get. 1893 vom Brit. Museum (N. H.) in London.

2. *Enygrus bibroni* Hombr. Jacq.

Boulenger, Cat. I pag. 106.

7106 a. 2 halb w. **Fidji-Inseln**. Gek. 1887 von Pöhl, Hamburg.

3. *Enygrus carinatus* (Schnd.).

Boulenger, Cat. I pag. 107.

7107 a. Erw. Mindassa auf **Celebes**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

7107 b. 2 erw., 1 jung. Insel **Ternate**. Erh. 1895 von derselben.

7107 c. 6 Ste. Sea Konorra auf **Halmahera**. Erh. 1895 von derselben.

7107 d. Erw., und 3 jung. Insel **Batjan**. Erh. 1895 von derselben.

7107 e. Halb w. **Palau-Inseln**. Gek. 1887 von Pöhl, Hamburg.

7107 f. Halb w. Sirisori auf **Saparua** bei Ceram. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

7107 g. Halb w. Ena auf Leitimor, **Süd-Amboina**. Gesch. 1890 von demselben.

4. *Enygrus asper* (Gthr.).

Boulenger, Cat. I pag. 109.

7109 a. Erw. Kaiserwillehelmsland auf **Neuguinea**. Get. 1896 vom Groß. Museum in Karlsruhe.

Genus IX. Ungalia Gray.

1. *Ungalia maculata* (Bibr.).

Boulenger, Cat. I pag. 112.

7112 a. Halbw. **Haiti**. Gek. 1877 von Hamburg.

Genus X. Eunectes Wgl.

1. *Eunectes murinus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 115.

7115 a. Erw. (gestopft). **Surinam** (Rüppell, Cat. III D 2 a). Gek. 1844 von Cardua.

Genus XI. Boa L.

1. *Boa constrictor* L.

Boulenger, Cat. I pag. 117.

7117 a und c. Jung u. erw. **Trinidad**. Gesch. 1893 u. 95 von F. W. Urich und R. R. Mole. Port of Spain.

7117 b. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1876 von Carl Urich. Port of Spain.

7117 d. Halbw. **Süd-Amerika**. Gek. 1883 von H. Deermann. hier.

7117 e. 3 Embryonen. Fluss São Amaro. Staat Bahia, **Brasilien**. Gesch. 1871 von August Frömmel. hier.

7117 f. Halbw. Magdalenathal. **U. S. Columbia**. Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel. Jena.

7117 g. Erw. Caréas. **Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller. hier.

2. *Boa diviniñoqua* (Laur.).

Boulenger, Cat. I pag. 118.

7118.1 a. Erw. **Westindien**. Gek. 1877 von Hamburg.

3. *Boa imperator* Daud.

Boulenger, Cat. I pag. 119.

7119 a. Jung. Retalhulen, **Guatemala**. Gesch. 1894 von Carl Fleischmann. Guatemala.

7119 b. Erw. **Mexiko**. Gek. 1884 aus einer Menagerie. hier.

7119 c. Erw. **Central-Amerika**. Gesch. 1892 von der Neuen Zoolog Gesellschaft. hier.

7119 d. Jung. San José, **Costa Rica**. Gesch. 1893 von C. Fleischmann.

4. *Boa madagascariensis* (D. B.).

Boulenger, Cat. I pag. 120; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 11. 1877 pag. 20.

7120.1 a. Erw. **Madagaskar**. Gesch. 1875 von Konsul C. Ebenau. Nossibé.

- 7120.1b, 2 erw. Kandani im Süden der Bembatokabai. **West-Madagaskar.**
Gesch. 1892 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.
7120.1c, Erw. Majunga, **West-Madagaskar.** Gesch. 1892 von demselben.

Genus XII. Eryx Daud.

1. *Eryx conicus* (Schnd.).

Boulenger, Cat. I pag. 124.

- 7124 a, Halbw. **Bombay.** Gesch. 1888 von Prof. Dr. Ferd. Richters, hier.
7124 b, Halbw. (gestopft). **Ostindien.** Gek. 1846 von Boissoneau.

2. *Eryx thebaicus* Reuß.

Boulenger, Cat. I pag. 125; Reuß, Mus. Senck. Bd. 1, 1834 pag. 134.

- 7125 a, Halbw. **Ober-Aegypten.** Gek. 1877 von Pöhl, Hamburg.
7125 b, 2 erw. Theben, **Aegypten.** Gek. 1880 von Gustav Schneider, Basel.
7125 c, Erw. (Rüppell, Cat. III B 1 d unter *E. jaculus*). **Ober-Aegypten.**
Gesch. 1830 von Dr. Eduard Rüppell, hier.

3. *Eryx jaculus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 125; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges.
1879—80 pag. 166 und in Radde, Faun. Casp.-Geb. 1886 pag. 73.

- 7126 a, 3 Ste. Salmas, **Persien.** Gesch. 1895 von Pfarrer G. Nägele, Walters-
weiler bei Offenburg (Baden).
7126 b, 3 erw. (Rüppell, Cat. III B 1 a c). **Aegypten.** Gesch. 1828 von Dr.
Eduard Rüppell, hier.
7126 c, 6 Ste. Sarona bei Jaffa, **Syrien.** Gesch. 1881 von Hans Simon,
Stuttgart.
7126 d, Erw. **Transkaspien.** Gesch. 1897 von der Neuen Zoolog. Gesell-
schaft, hier.

var. *miliaris* Pallas.

Boettger, Zool. Jahrb. Bd. 3, 1888 pag. 938.

- 7127 a, 2 erw. Askhabad, **Transkaspien.** Gesch. 1888—90 von C. Eylandt,
daselbst.
7127 b, Erw. Mor-kala am Kutschk, **Transkaspien.** Gesch. 1888 von Staats-
rat Dr. Gustav von Radde, Exez., Tiflis.

4. *Eryx johui* (Russell).

Boulenger, Cat. I pag. 127.

- 7127.1a, Erw. **Sind.** Gesch. 1890 von G. A. Boulenger, F. R. S., London.

5. *Eryx elegans* (Gray).

Boulenger, Cat. I pag. 128, Taf. 5, Fig. 1.

- 7128 a, Erw. ♀, Ai-Dére, **Transkaspien.** Gesch. 1894 von Staatsrat Dr.
Gustav von Radde, Exez., Tiflis.

Familie IV. Ilysiidae.

Genus I. *Ilysia* Hempr.

1. *Ilysia scytale* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 133.

- 7133a. 2 erw. (Rüppell, Cat. III A 1 c—d). **Surinam**. Get. 1838 vom Rijksmuseum in Leiden.
7133b. Erw. (Rüppell, Cat. III A 1 g). **Süd-Amerika**. Alte Sammlung 1845.
7133c. 4 erw. (Rüppell, Cat. III A 1 a—b, e—f). **Surinam**. Gesch. 1839 von Dr. Siebel, hier.
7133d. Halbw. (Rüppell, Cat. III A 3 a). **Süd-Amerika**. Alte Sammlung 1845.

Genus II. *Cylindrophis* Wgl.

1. *Cylindrophis rufus* (Laur.).

Boulenger, Cat. I pag. 135.

- 7135a. Halbw. Pontianak, **West-Borneo**. Gesch. 1893 von Baron Albert von Rejnach, hier.
7135b. Erw. Stabat in Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1893 von Fr. Bey-schlag, daselbst.
7135c. Jung. Baramtaß, **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.
7135d. Erw. Insel **Batjan**. Erh. 1895 von derselben.
7135e. 3 Ste. (Rüppell, Cat. III A 2 a—b). **Java**. Gesch. 1840 von Dr. Peitsch, Batavia.
7135f. Erw. **Java**. Gesch. 1876 von Major Dr. L. von Heyden, hier.
7135g. Erw. u. jung. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.
7135h. 6 Ste. (Rüppell, Cat. III A 2 c—h). **Java**. Gesch. 1838 von Dr. von Siebold, Leiden.
7135i. Halbw. Bangkok, **Siam**. Gesch. 1885 von Konsul Dr. Fr. O. von Moellendorff, Manila.
7135k. Halbw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1891 von Dr. med. O. Benecke, daselbst.
7135l. Halbw. **Borneo**. Gesch. 1886 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
7135m. Erw. **Java**. Gesch. 1896 von Direktor August Siebert, hier.

2. *Cylindrophis maculatus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 136.

- 7136a. Erw. **Ceylon**. Gek. 1889 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

Familie V. Uropeltidae.

Genus I. Rhinophis Hempr.

1. *Rhinophis oxyrrhynchus* (Schnd.).

Boulenger, Cat. I pag. 141.

7140 a. Erw. **Central-Ceylon.** Gek. 1889 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

2. *Rhinophis planiceps* Pts.

Boulenger, Cat. I pag. 141.

7141.1 a. Erw. **Central-Ceylon.** Get. 1889 vom Naturh. Museum in Basel.

3. *Rhinophis trevelyanus* (Kel.).

Boulenger, Cat. I pag. 142.

7142 a. Erw. **Central-Ceylon.** Get. 1889 vom Naturh. Museum in Basel.

4. *Rhinophis blythi* Kel.

Boulenger, Cat. I pag. 144.

7144 a. 3 erw., 2 jung. **Central-Ceylon.** Gesch. 1846 von W. Worms, dastelbst.

Genus II. Silybura Gray.

1. *Silybura pulneyensis* (Bedd.).

Boulenger, Cat. I pag. 147; Boettger, Ber. Offenbach, Ver. f. Naturk. 1892 pag. 76.

7147 a. 6 Ste. Kodaikanal, Palni Hills, **Süd-Indien.** Gesch. 1889 von Theodor Kolb, Madras.

2. *Silybura nigra* Bedd.

Boulenger, Cat. I pag. 151.

7151 a. Erw. ♂. Kodaikanal, Palni Hills, **Süd-Indien.** Gesch. 1889 von Theodor Kolb, Madras.

3. *Silybura brevis* Gthr.

Boulenger, Cat. I pag. 158.

7158 a. Erw. Nilgherries, **Süd-Indien.** Gesch. 1890 vom Museum in Madras.

Genus III. Platyplectrurus Gthr.

1. *Platyplectrurus madurensis* Bedd.

Boulenger, Cat. I pag. 166. Taf. 11. Fig. 2.

7166 a. 6 Ste. Kodaikanal, Palni Hills, **Süd-Indien.** Gesch. 1889 von Theodor Kolb, Madras.

Familie VI. Xenopeltidae.

Genus I. Xenopeltis Reinw.

1. *Xenopeltis unicolor* Reinw.

Bonlenger, Cat. I pag. 168.

7168 a. Erw. n. 4 Jungge. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

7168 b. 4 Ste. Atschiu, **Nord-Sumatra**. Gek. 1882 von Konrad Kläsi, Zürich.

7168 c. Erw. Insel **Bangka**. Gek. 1881 von demselben.

Familie VII. Colubridae.

Subfamilie 1. Acrochordinae.

Genus I. Acrochordus Hornst.

1. *Acrochordus javanicus* Hornst.

Bonlenger, Cat. I pag. 173.

7173 a. Kopf. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

7173 b und c. Erw. (gestopft). **Java** (Rüppell, Cat. III F 1 a—b). Gesch. 1838 von Dr. med. Döbel, Batavia.

Genus II. Chersydrus Cur.

1. *Chersydrus granulatus* (Schnd.).

Bonlenger, Cat. I pag. 174.

7174 a. 6 erw. Manila auf **Luzon**. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, daselbst

7174 b. Zahlr. Ste. **Mittel-Luzon**. Gesch. 1888 von demselben.

7174 c. Zahlr. Ste. Umgebung von **Manila**. Gesch. 1891 von demselben.

7174 d. Jung. See Taal, **Luzon**. Gesch. 1897 von demselben.

7174 e. Halb. **Singapore**. Gesch. 1892 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

Subfamilie 2. Colubrinae.

Genus I. Polyodontophis Blgr.

1. *Polyodontophis torquatus* (Blgr.).

Bonlenger, Cat. I pag. 183; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 11. 1877 pag. 8 (*Enicognathus rhodogaster*).

7183 a. Zahlr. Ste. **Nossibé**. Gesch. 1879—83 von Konsul C. Ebenau und Anton Stumpff, daselbst.

7183 b. Halb. u. 2 Jungge. **Ebendaher**. Gesch. 1897 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.

2. *Polyodontophis collaris* (Gray).

Boulenger, Cat. I pag. 184, Taf. 12, Fig. 1.

7184 a. Erw. Darjeeling, **Ost-Himalaya**. Gek. 1891 von British Museum (N. H.), London.

3. *Polyodontophis geminatus* (Boie).

Boulenger, Cat. I pag. 185; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1892 pag. 127 (*melanocephalus*).

7185 a. Erw. (typ.). Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

7185 b. Erw. (typ.). Tenggergebirge in 1200 m. **Ost-Java**. Gek. 1891 von Haus Fruhstorfer, Berlin.

4. *Polyodontophis bivittatus* Blgr.

Boulenger, Cat. III pag. 597.

7185.4 a. Erw. Insel Culion, **Calamianes**, Philippinen. Gesch. 1897 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

5. *Polyodontophis subpunctatus* (D. B.).

Boulenger, Cat. I pag. 186.

7186 a. Erw. Honore, **Britisch Ostindien**. Gesch. 1864 von Missionar Albrecht, daselbst.

Genus II. Dromicodryas Blgr.1. *Dromicodryas bernieri* (D. B.).

Boulenger, Cat. I pag. 189; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 12. 1881 pag. 443 (*Herpetodryas bernieri* var. *trilineata*).

7189.1 a. Erw. (Typus von *H. bernieri* var. *trilineata* Bittgr.), **Nossibé**. Gesch. 1876 von Konsul C. Ebenan, daselbst.

7189.1 b. Erw. Marambitsy, **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.

7189.1 c. Halbw. Soalala, **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von demselben.

7189.1 d. 4 erw. Majunga, **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von demselben.

7189.1 e. 2 erw. Kandani, S.-Bembatokabai, **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von demselben.

2. *Dromicodryas quadrilineatus* (D. B.).

Boulenger, Cat. I pag. 190; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 11. 1877 pag. 9, Bd. 11. 1879 pag. 463 und Bd. 12. 1881 pag. 443 (*Herpetodryas bernieri* var.).

7190 a. 5 erw., 2 jung. **Nossibé**. Gesch. 1876–83 von Konsul C. Ebenan und Anton Stumpff, daselbst.

- 7190 b. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1897 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.
7190 c. 6 Ste. Majunga. **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von demselben.
7190 d. 2 erw. Kandani, S.-Bembatokabai. **West-Madagaskar**. Gesch. 1892
von demselben.
7190 e. 2 erw. Soalala. **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von demselben.

Genus III. Tropidonotus Kuhl.

1. *Tropidonotus scalaris* (Cope).

Boulenger, Cat. I pag. 204.

- 7204 a. Erw. Jalisco in 8500'. **Mexiko**. Gek. 1893 von British Museum
(X. H.), London.

2. *Tropidonotus ordinatus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 205.

var. *sirtalis* L.

Boulenger, l. c. pag. 206.

- 7206 a. 4 Junge. Milwaukee, **Wisconsin**. Gesch. 1893 von Bierbrauer Rudolf
Henrich, hier.
7206 b. Erw. **Baltimore**. Gek. 1873 vom Naturh. Museum in Offenbach.
7206 c. 4 Junge. **Oestliche Verein. Staaten**. Gesch. 1892 von der Neuen
Zoolog. Gesellschaft, hier.
7206 d. Erw. (Rüppell, Cat. III O* 8a als *bipunctatus*). **Verein. Staaten**.
Gesch. 1840 von Dr. med. Reuß und W. Engemann, St. Louis.
7206 e. 2 erw. **Mexiko**. Gesch. 1857 von Theodor Passavant, hier.
7206 f. Erw. **Florida**. Gesch. 1896 von Dr. med. A. Zipperlen, Cincinnati, O.

var. *infernalis* Blainv.

Boulenger, l. c. pag. 207.

- 7207 a. Halbw. **Californien**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.

var. *eques* Reuß.

Boulenger, l. c. pag. 209; Reuß, Mus. Senck. Bd. 1. 1834 pag. 152.
Taf. 8, Fig. 2 (*Coluber*).

- 7209 a. 2 erw. (Rüppell, Cat. III O* 8b—c als *bipunctatus*). **Mexiko**. Gesch.
1832 von F. A. Dillenburger, Mexiko.
7209 b. Erw. (Rüppell, Cat. III O* 8d als *bipunctatus*). **Ebendaher**.
7209 c. Erw. **Mexiko**. Gesch. 1896 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.

3. *Tropidonotus saurita* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 212.

- 7213 a. Erw. **Texas**. Gesch. 1892 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.
7213 b. 2 erw. (Rüppell, Cat. III P. 4a--b als *Herpetodryas*). **Verein. Staaten**.
Gesch. 1838 von Dr. med. Reuß und W. Enghmann, St. Louis.
7213 c. Halb. **Verein. Staaten**. Gesch. 1874 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

4. *Tropidonotus picturatus* Schlg.

Boulenger, Cat. I pag. 215.

- 7215 a. Erw. (var. *australis* Gray). Burnett River, **Queensland**. Gesch. 1894
von Prof. Dr. R. W. Semon, Jena.
7215 b. Halb. (var. *semicincta* D. B.). **Queensland**. Gek. 1887 von C. A.
Pöhl, Hamburg.

5. *Tropidonotus punctiventris* Bttgr.

Boettger, Zoolog. Anzeiger 1895 pag. 129; Boulenger, Cat. III
pag. 602.

- 7216 a. Erw. Soa Konorra auf **Halmaleira**. Erh. 1895 von der Rüppellreise
Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

6. *Tropidonotus fuliginoides* (Gthr.).

Boulenger, Cat. I pag. 217.

- 7217 a. Erw. **Kamerun**. Gesch. 1893 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.
7217 b. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1892 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
7217 c. 2 halb. **Ebendaher**. Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz, Berlin.

7. *Tropidonotus variegatus* (Pfs.).

Boulenger, Cat. I pag. 217.

- 7217.1 a. Erw. Aburi, **Goldküste**. Gesch. 1885 von Hans Simon, Stuttgart

8. *Tropidonotus natrix* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 219; Boettger, Zoolog. Jahrb. Bd. 3.
1888 pag. 933.

- 7219 a. Erw. **Deutschland**. Gesch. 1882 von Siegmund Winter, hier.
7219 b. Erw. **Tannus**. Gesch. 1889 von Carl Happe, Rödellheim.
7219 c. 2 erw. Kobyllno bei Oppeln, **Oberschlesien**. Gesch. 1880 von Otto
Goldfuß, Halle (Saale).
7219 d. Erw. **Vegesack** bei Bremen. Gesch. 1882 von Hollmann, daselbst.
7219 e. Erw. ♀ mit Eiern. Middachten, **Holland**. Gesch. 1891 von Prof. Dr.
Friedr. Kinkelin, hier.

- 7219f. Jung. Svica-See, **Süd-Kroatien**. Gek. 1880 von Edmund Reitter, Paskau (Mähren).
- 7219g. Eier. Wolfogge-Ach. **Schwaben**. Gesch. 1877 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
- 7219h. Erw. var. *sicula* Cuv., **Sicilien** (Rüppell, Cat. III O* 1c). Gesch. 1886 von Dr. med. Reuß, hier.
- 7219i. Erw. und jung (var. *sicula* Cuv.). Palermo. Jung (dieselbe Varietät). Caltanisetta, **Sicilien**. Gesch. 1880 von Chefinspektor Carl Hirsch, daselbst.
- 7219k. Erw. var. *pontica* Pall., Theodosia, **Krim**. Gesch. 1881 von Staatsrat O. Retowski, daselbst.
- 7219l. Erw. (var. *sicula* Cuv.). Mte. Rosso bei Syrakus, **Sicilien**. Gesch. 1886 von Chefinspektor Carl Hirsch, Palermo.
- 7219m. Jung. **Weinheim** a. d. Bergstraße. Gesch. 1886 von Albrecht Weis, hier.
- 7219n. Erw. **Europa**. Gesch. 1891 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.
- 7219o. 2 erw. (var. *sicula* Cuv.). Palermo, **Sicilien**. Gesch. 1880 von Chefinspektor Carl Hirsch, daselbst.
- 7219p. Jung. Malaga, **Süd-Spanien**. Gesch. 1881 von H. Simon, Stuttgart.
- 7219q. 2 erw. **Frankfurt a. M.** Gesch. 1891 von Oberlehrer J. Blum, hier.
- 7219r. Erw. und 2 Junge. Rüppell, Cat. III O* 1a - c. **Bad Ems**. Gesch. 1838 von Schöff. Dr. C. von Heyden, hier.
- 7219s. Erw. ♀² (var. *sicula* Cuv.). Acquasanta bei Palermo, **Sicilien**. Gesch. 1886 von Chefinspektor Carl Hirsch, Palermo.
- 7219t. ♂ und ♀ (var. *sicula* Cuv.). **Palermo**. Gesch. 1882 von demselben.

var. *picturata* Jan.

Jan. Icon. Ophid. Lief. 26, Taf. 1, Fig. 1.

- 7220a. Erw. **Südost-Europa**. Gesch. 1896 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

var. *persa* Pallas.

Bonlenger, l. c. pag. 221.

- 7221a. Jung. Burgas, **Ost-Rumelien**. Gesch. 1894 von Dr. med. C. Flaeh. Aschaffenburg.
- 7221b. Halbw. **Kleinasien**. Gesch. 1862 von Adam Becker, Sydney.
- 7221c. Halbw. Insel Solta, **Dalmatien**. Gesch. 1891 von Dr. Franz Werner, Wien.
- 7221d. Erw. u. halbw. Prevesa, **Epirus**. Gesch. 1888 von César Conéniénos, daselbst.
- 7221e. Erw. Smyrna, **Kleinasien**. Gek. 1885 vom Naturh. Institut Linnaea, Berlin.
- 7221f. Kopf. Akerathal im Karabagh, **Transkaukasien**. Erh. 1890 durch Dr. Jean Valentins Reise.
- 7221g. Erw. Karabagh, **Transkaukasien**. Erh. 1890 von derselben.
- 7221h. Erw. See Beumbasch an der Atrek-mündung, **Transkaspien**. Gesch. 1888 von Staatsrat Dr. Gustav von Radde, Exez., Tiflis.

7221 i. Erw. **Süd-Europa.** Gesch. 1893 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

7221 k. Erw. Prevesa, **Epirus.** Gesch. 1889 von César Conéménos, daselbst.

7221 l. Erw. Patras, **Nord-Morea.** Gek. 1892 von Dr. Christian Broemme, Wiesbaden.

7221 m. 2 erw., 2 jung. **Chios.** Gesch. 1862 von Hofrat Dr. med. Pauli, hier.

7221 n. 2 erw. Xenochori, **Nord-Euböa.** Gesch. 1891 von Fr. de Mimont, daselbst.

7221 o. Jung. Vrachori, **Aetolien.** Gesch. 1892 von Dr. Christian Broemme.

var. *scutata* Pallas.

Boulenger, l. c. pag. 221.

7221.1 a. Erw. **Südost-Europa.** Gesch. 1896 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

7221.1 b. Erw. Katzenssee, Kanton Zürich, **Schweiz.** Gesch. 1897 von Dr. med. Arthur Hanau, St. Gallen.

var. *atra* Eichw.

Boulenger, l. c. pag. 221.

7221.2 a. Erw. **Südost-Europa.** Gesch. 1893 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

7221.2 b. Erw. (Rüppell, Cat. III O* 1 d), **Italien.** Get. 1840 vom Hofmuseum in Wien.

9. *Tropidonotus vibakari* Boie.

Boulenger, Cat. I pag. 221.

7221.3 a. 2 erw. **Nippon.** Gek. 1886 auf der Prof. Ahlberg'schen Auktion, hier.

10. *Tropidonotus conspicillatus* Gthr.

Boulenger, Cat. I pag. 222; Boettger, Ber. Offenbach, Ver. 1. Naturk. 1892 pag. 109.

7222 a. Halbw. (einen *Bufo quadriporcatus* Blgr. verschlingend). Baramfluß, **Nord-Borneo.** Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthal's, Jena.

7222 b. Erw. Deli, **Nordost-Sumatra.** Gesch. 1891 von Fritz Beyschlag, daselbst.

11. *Tropidonotus trianguligerus* Boie.

Boulenger, Cat. I pag. 224.

7224 a. Erw. Sultanat Deli, **Ost-Sumatra.** Gesch. 1894 von Dr. med. Carl Flach, Aschaffenburg.

- 7224 b. Erw. Baramfluß, **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von der Rüppellreise
Prof. Dr. W. Kükenthals. Jena.
7224 c. Halbw. Insel **Bangka**. Gek. 1881 von Konrad Kläsi. Zürich.
7224 d. ♀ mit Eiern und 2 Junge. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890
von Dr. Adolf Strubell. Bonn.

var. *annularis* Fisch.

Boulenger, l. c. pag. 224.

- 7224.1 a. Erw. Pontianak, **West-Borneo**. Gesch. 1896 von Dr. Heinr. Lenz.
Lübeck.

12. *Tropidonotus olivaceus* (Pts.).

Boulenger, Cat. I pag. 227; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges.
1888 pag. 48 (*Coronella*).

- 7227 a. Erw. Boma, **Unter-Congo**. Gek. 1886 von Paul Hesse. Venedig.
7227 b. Erw. Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von demselben.
7227 c. Erw. Kokotoni auf **Sausibar**. Gesch. 1897 von Dr. Alfr. Voeltzkow,
Berlin.
7227 d. Erw. Peccetoni, **Witulaud**, Ost-Afrika. Gesch. 1897 von demselben.

13. *Tropidonotus piscator* (Schm.).

Boulenger, Cat. I pag. 230; RenB. Mus. Senck. Bd. 1. 1834
pag. 150, Taf. 9, Fig. 2 (*Coluber hippos*); Boettger, Ber. Offen-
bach. Ver. f. Naturk. 1888 pag. 76 (*quinquecinctus*).

- 7230 a. Erw. (var. B.) **West-Java**. Gek. 1893 von H. Frühstorfer, Berlin.
7230 b. 6 erw. (var. B.) **Hainan**, Süd-China. Gesch. 1894 von B. Schmacker.
Shanghai.
7230 c. 2 jung. Hongkong, **Süd-China**. Gesch. 1894 von demselben.
7230 d. Jung (var. B.) **Ostindien**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.
7230 g. 5 Ste. (var. B.) **Kantou**, Süd-China. Gesch. 1885 von Konsul Dr.
O. Fr. von Moellendorff, Manila.
7230 h. Erw. u. jung. Rüppell, Cat. III O* 5a—b als *quinquecinctus*. **Java**.
Gesch. 1837 von Dr. med. Peitsch, Batavia.
7230 i. 3 erw. (var. B.) **Hainan**. Gek. 1886 von Otto Herz, St.-Petersburg.
7230 k—m. 3 erw. (gestopft) **Ostindien**. Gek. 1846 von Boissonneau.

var. *melanozosta* Gray.

Boulenger, l. c. pag. 232.

- 7231 a. Erw. (Rüppell, Cat. III O* 3a als *Tr. vittatus*). **Java**. Gesch. 1838
von Dr. W. von Siebold, Leiden.
7231 b. 2 halbw. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. A. Strubell.
Bonn.

14. *Tropidonotus asperrimus* Blgr.

Boulenger. Cat. I pag. 232. Taf. 15. Fig. 2.

- 7230 e. 3 Junge. **Ceylon**. Gesch. 1846 von H. Worms.
7230 f. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1881 von Gustav Herath.

15. *Tropidonotus annularis* Hallow.

Boulenger. Cat. I pag. 233.

- 7233 a. 2 erw. Chin-hai bei **Ningpo**, China. Gesch. 1894 von Bernh. Schmaecker, Shanghai.

16. *Tropidonotus tessellatus* (Laur.).

Boulenger. Cat. I pag. 233; Boettger. Ber. Senck. Nat. Ges. 1879—80 pag. 160. in Radde's Faun. Casp.-Geb. 1886 pag. 71 und Zool. Jahrb. Bd. 3. 1888 pag. 934.

- 7234 a. Erw. Schwechatfluß bei **Baden** nächst Wien. Gesch. 1893 von Dr. Fr. Werner, Wien.
7234 b. Erw. (var. *flavescens* Wern.). Zara. **Dalmatien**. Gesch. 1893 von demselben.
7234 c. Jung. Haiffa. **Syrien**. Gesch. 1879 von Hans Simon, Stuttgart.
7234 d. 2 Junge. Jerusalem. **Syrien**. Gesch. 1880 von demselben.
7234 e. Erw. u. 4 Junge. Brumána im **Libanon**. Gesch. 1881 von demselben.
7234 f. Jung. Besch-tau bei Pjätigorsk. **Ciskaukasien**. Gesch. 1881 von demselben.
7234 g. Jung. Utsch-deré. Abchasien. **Transkaukasien**. Erh. 1884 von Staatsrat Otto Retowskis Reise.
7234 h. Halbw. Nawaginskaja am Pschisch. Kuban'scher Distrikt. **Ciskaukasien**. Gek. 1891 von Paul Reibisch, Dresden.
7234 i. Jung. (Rüppell. Cat. III O* 2 e). Bad **Ems**. Gesch. 1838 von Schöff Dr. C. von Heyden, hier.
7234 k. Erw. (Rüppell. Cat. III O* 2 f). **Baden** bei Wien. Gek. 1840 vom Hofmuseum, Wien.
7234 l. Erw. Siaret bei Schirwan im Atrekthal. **Nord-Persien**. Gek. 1887 von Otto Herz, St.-Petersburg.
7234 m. 2 halbw. Askhabad. **Transkaspien**. Gesch. 1888—89 von Staatsrat Dr. Gustav von Radde, Exez., Tiflis, und C. Eylandt, daselbst.
7234 n. 2 erw. (Rüppell. Cat. III O* 2 g—h). **Trentino**. Gek. 1836 von Graf Jenison, Heidelberg.
7234 o. Erw. (Rüppell. Cat. III O* 2 i). **Süd-Frankreich**. Alte Sammlung 1845.
7234 p. 4 erw. (Rüppell. Cat. III O* 2 a—d). Bad **Ems**. Gesch. 1838 von Schöff Dr. C. von Heyden, hier.

17. *Tropidonotus viperinus* (Latr.).

Boulenger, Cat. I pag. 235; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 13, 1883 pag. 101.

- 7235 a. 3 Embryonen und Ei mit Embryo. Montpellier, Dép. **Hérault**. Gesch. 1887 von Joh. von Fischer, daselbst.
7235 b. Erw. u. 3 Junge. Route Tanger—Tetuan, **Marokko**. Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.
7235 c. Erw. Landschaft Sus, **Süd-Marokko**. Gesch. 1872 von Prof. Dr. C. von Fritsch, Halle (Saale), und J. J. Reim, Bonn.
7235 d. 2 erw., 2 jung. Algeciras, **Süd-Spanien**. Gesch. 1880 von Hans Simon, Stuttgart.
7235 e. Halbw. u. jung. Ahmuradiel, Sierra Morena, **Spanien**. Gesch. 1868 von Major Dr. L. von Heyden, hier.
7235 f. 2 erw. Tlemcen, **Algerien**. Erh. 1881 von der IV. Ruppellreise Dr. W. Kobelt, Schwanheim a. M.
7235 g. Jung. Lagos, **Süd-Portugal**. Gesch. 1887 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
7235 h. 6 erw., 2 jung. Biscra, **Algerien**. Gek. 1885 von Louis Fischer, daselbst.
7235 i. Erw. Stadt **Marokko**. Gesch. 1872 von Prof. Dr. C. von Fritsch, Halle (Saale).

var. *ocellata* Wgl.

Boulenger, l. c. pag. 237.

- 7236 a. Erw. Montpellier, Dép. **Hérault**. Gesch. 1887 von Johann von Fischer, daselbst.
7236 b. Jung. San Moro auf Mallorca, **Balearen**. Gek. 1880 von Premier-Lieutenant Dr. Fr. Will, Erlangen.
7236 c. Halbw. Algeciras, **Süd-Spanien**. Gesch. 1880 von H. Simon, Stuttgart.
7236 d. Erw. u. 2 Junge. Route Tanger—Tetuan, **Marokko**. Gesch. 1881 von denselben.

18. *Tropidonotus ferox* Gthr.

Boulenger, Cat. I pag. 241.

- 7241 a. 2 erw. **Sierra Leone**, West-Afrika. Get. 1893 vom British Museum (N. H.), London.

19. *Tropidonotus fasciatus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 242.

- 7243 a. Jung. Monstrum mit zwei Köpfen (Jan. Icon. Ophid. Lief. 26, Taf. 3, Fig. 2). San Antonio, **Texas**. Gesch. 1867 von Prof. Dr. Rud. Chr. Boettger, hier.
7243 b. Erw. **Verein. Staaten**. Gesch. 1874 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

20. *Tropidonotus dolichocercus* (Peracca).

Boulenger, Cat. I pag. 246.

7246.1 a. Erw. ♂. Moromanga, **Ost-Madagaskar**. Gesch. 1892 von Dr. Alfr. Voeltzkow, Berlin.

21. *Tropidonotus stumppi* (Bttgr.).

Boulenger, Cat. I pag. 247; Boettger, Zoolog. Anzeiger 1881 pag. 358 und Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 12. 1881 pag. 441. Taf. 1. Fig. 2 (*Dromicus*).

7247 a. 4 erw., 4 jung. **Nossibé**. Gesch. 1881—83 von Konsul A. Stumppf. daselbst.

7247 b. Halbw. **Ebendaher**. Gesch. 1897 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.

7247 c. Erw. Moromanga, **Ost-Madagaskar**. Gesch. 1892 von demselben.

22. *Tropidonotus lateralis* (D. B.).

Boulenger, Cat. I pag. 248.

7248 a. Erw. Majunga, **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.

23. *Tropidonotus platyceps* Blyth.

Boulenger, Cat. I pag. 248.

7248.1 a. Erw. Darjeeling, **Ost-Himalaya**. Get. 1891 von British Museum (N. H.), London.

24. *Tropidonotus tigrinus* Boie.

Boulenger, Cat. I pag. 249.

7249 a. Erw. **Nippon**. Gek. 1886 auf der Prof. Ahlberg'schen Auktion, hier.

7249 b. Erw. ♀. Nikko auf **Nippon**. Get. 1889 von B. Schmacker, Shanghai.

7249 c. 2 halbw. Tschifu, **Nord-China**. Gesch. 1891 von demselben.

7249 d. Erw. Dalanshan-Gebirge bei Ningpo, **Nordost-China**. Get. 1889 von demselben.

7249 e. Halbw. **Nord-China**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.

7249 f. 2 erw., 1 jung. (Rüppell, Cat. III O* 6a—c), **Japan**. Get. 1838 vom Rijksmuseum, Leiden.

7249 g. 2 erw. Insel **Jeso**, Japan. Get. 1889 von B. Schmacker, Shanghai.

7249 h. 6 Ste. Jokohama, **Nippon**. Get. 1889 von demselben.

7249 i. Erw. Wei-hei-wei, **Nord-China**. Gesch. 1891 von demselben.

7249 k. Erw. Lüshan-Gebirge bei Kinkiang, **Ost-China**. Get. 1889 von demselben.

7249 l. 3 erw., 2 jung. **Japan**. Gesch. 1876 von Prof. Dr. J. J. Rein, Bonn.

7249 m. 3 erw. **Nippon**. Gek. 1886 auf der Prof. Ahlberg'schen Auktion, hier.

25. *Tropidonotus pryeri* Blgr.

Boulenger, Cat. I pag. 250.

- 7250 a. Jung. Okinawa, **Mittlere Linkin-Inseln.** Gesch. 1895 von Bernh. Schmacker, Shanghai.
7250 b. Erw. Yaeyama auf Mijakoshima, **Südl. Linkin-Inseln.** Gesch. 1895 von demselben.

26. *Tropidonotus himalayanus* Gthr.

Boulenger, Cat. I pag. 251.

- 7251 a. Halbw. u. jung. Darjeeling, **Ost-Himalaya.** Get. 1891 vom British Museum (N. H.), London.

27. *Tropidonotus stolatus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 253; Boettger, Ber. Offenbach, Ver. f. Naturk. 1888, pag. 79.

- 7253 a. 7 erw. **Hainan,** Süd-China. Gesch. 1894 von B. Schmacker, Shanghai.
7253 b. Erw. **Ceylon.** Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.
7253 c. 2 erw. Kanton, **Süd-China.** Gesch. 1885 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
7253 d. 3 erw., 1 jung. **Madras.** Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.
7253 e. Erw. **Himalaya.** Gek. 1877 von Hamburg.
7253 f. 2 erw. **Hainan.** Gek. 1886 von Otto Herz, St.-Petersburg.
7253 g. Erw. **Ceylon.** Gesch. 1881 von Gustav Herath, hier.
7253 h. Erw. Nyen-hong-li bei Hongkong, **Süd-China.** Gesch. 1880 von Hans Simon, Stuttgart.
7253 i. 3 erw. **Ceylon.** Gesch. 1846 von H. Worms.
7253 k. Erw. (gestopft). **Ostindien.** Gek. 1846 von Boissoneau.

28. *Tropidonotus vittatus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 255.

- 7255 a. Erw. **Java.** Gesch. 1882 von Oberlehrer J. Blum, hier.
7255 b. 2 erw. Buitenzorg, **West-Java.** Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.
7255 c. Erw. Insel **Bangka.** Gek. 1881 von Konrad Kläsi, Zürich.
7255 d. 2 erw., 2 halbw. (Rüppell, Cat. III O* 3a—d), **Java.** Gesch. 1839 von Dr. med. Peitsch, Batavia.
7255 e. 3 erw. (Rüppell, Cat. III O* 3e—g), **Java.** Gesch. 1838 von Dr. W. von Siebold, Leiden.

29. *Tropidonotus subminiatus* Schlg.

Boulenger, Cat. I pag. 256.

- 7256 a. Halbw. **Java.** Gesch. 1893 von Albert Textor, Eisenach.
7256 b. Halbw. (Rüppell, Cat. III O* 4b als *chrysurus*), **Java.** Gesch. 1838 von Dr. med. Peitsch, Batavia.

- 7256 c. Halbw. Reich Jolo auf **Java**. Gesch. 1868 von E. Lörsch, hier.
7256 d. Erw. Surabaya, **Java**. Gesch. 1889 von Dr. med. Stratz, Haag.
7256 e. Erw. (Rüppell, Cat. III O* 7 a als *miniatus*), **Java**. Gesch. 1840 von Dr. W. von Siebold, Leiden.
7256 f. 3 erw. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

30. *Tropidonotus spilogaster* Boie.

Boulenger, Cat. I pag. 257.

- 7257 a. Erw. Umgebung von Manila auf **Luzon**. Gesch. 1891 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
7257 b. 2 erw. Insel **Cebu**, Philippinen. Gesch. 1890 von Otto Koch, daselbst.
7257 c. Zahlr. Ste. Umgebung von Manila, **Luzon**. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
7257 d. Erw. Prov. Nueva Ecija, **Luzon**. Gesch. 1897 von demselben.
7257 e. Erw. Insel Culion, **Calamianes**. Gesch. 1897 von demselben.

31. *Tropidonotus chrysargus* Schlg.

Boulenger, Cat. I pag. 258.

- 7258 a. 2 erw. Insel Culion, **Calamianes**. Gesch. 1893 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
7258 b. Jung. **West-Java**. Gek. 1893 von Hans Fruhstorfer, Berlin.
7258 c. Halbw. Stabat Estate bei Bindjey, Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1893 von Fritz Beyschlag, daselbst.
7258 d. 2 Junge. Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1879 von W. von Schouler, Wiesbaden.
7258 e. Erw. Tengger-Gebirge in 1200 m. **Ost-Java**. Gek. 1891 von Hans Fruhstorfer, Berlin.
7258 f. 3 halbw., 1 jung. Atschin, **Nord-Sumatra**. Gek. 1882 von Konrad Kläsi, Zürich.
7258 g. Erw. (Rüppell, Cat. III O* 4 a), **Java**. Gek. 1838 vom Rijksmuseum in Leiden.
7258 h. Jung. Banjarmasin, **Südost-Borneo**. Gek. 1894 von Wwe. H. Krieb, hier.

32. *Tropidonotus maculatus* Edel.

Boulenger, Cat. I pag. 260.

- 7260 a. Erw. Baramfluß, **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

33. *Tropidonotus chrysargoides* Gthr.

Boulenger, Cat. I pag. 260. Taf. 16. Fig. 1.

- 7260.1 a. Erw. Minalhassa, **Celebes**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

34. *Tropidonotus auriculatus* Gthr.

Boulenger, Cat. I pag. 261, Taf. 17. Fig. 1.

7261.1 a. Halbw. Insel **Leyte**, Philippinen. Gesch. 1893 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

35. *Tropidonotus callistus* Gthr.

Boulenger, Cat. I pag. 263.

7263.1 a. Erw. Rurukan auf **Celebes**. Erh. 1895 von der Prof. Dr. W. Kükenthal'schen Ruppelreise.

36. *Tropidonotus halmahericus* Bttgr.

Boulenger, Cat. III pag. 609: Boettger. Zool. Anzeiger 1895 pag. 130.

7264.1 a. Erw. u. jung. Insel **Batjan**. Erh. 1895 von der Ruppelreise Prof. Dr. W. Kükenthals. Jena.

7264.1 b. 3 erw. Soa Konorra auf **Halmahera**. Erh. 1895 von derselben.

Genus IV. Styporhynchus Pts.

1. *Styporhynchus truncatus* Pts.

Boulenger, Cat. I pag. 216 (*Tropidonotus*).

7265 a. 2 erw. Insel **Batjan**. Erh. 1895 von der Ruppelreise Prof. Dr. W. Kükenthals. Jena.

7265 b. 4 erw. Soa Konorra auf **Halmahera**. Erh. 1895 von derselben.

Genus V. Macropisthodon Blgr.

1. *Macropisthodon flaviceps* (D. B.).

Boulenger, Cat. I pag. 266.

7266 a. Jung. Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1894 von Wwe. H. Krämer, hier.

7266 b. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1891 von Dr. med. O. Benecke, daselbst.

7266 c. Halbw. **Ebendaher**. Gesch. 1886 von Clemens Holwiesner, hier.

7266 d. Erw. **Borneo**. Gesch. 1896 von Dr. Heimr. Lenz. Lübeck.

2. *Macropisthodon rhodomelas* (Boie).

Boulenger, Cat. I pag. 266.

7266.1 a. Erw. Insel **Bangka**. Gek. 1881 von Konrad Kläsi, Zürich.

3. *Macropisthodon plumbicolor* (Cant.).

Boulenger, Cat. I pag. 267.

7267 a. Erw. Kodaikanal, Palmi Hills. **Süd-Indien**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb, Madras.

7267 b. Erw. Nilgherries. **Süd-Indien**. Gesch. 1890 vom Museum in Madras.

Genus VI. Lioheterodon Blgr.

1. *Lioheterodon madagascariensis* (D. B.).

Boulenger, Cat. I pag. 269; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 11, 1877 pag. 5 und Bd. 12, 1881 pag. 442 (*Heterodon*).

7268 a. 4 Ste. Nossibé. Gesch. 1883 von Konsul Anton Stumpff, daselbst.

7268 b. 2 erw. Ebendaher. Gesch. 1875 von Konsul Carl Ebenau, daselbst.

7268 c. Erw. Majunga. **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.

7268 d. 2 erw. Kandani. **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von demselben.

2. *Lioheterodon modestus* (Gthr.).

Boulenger, Cat. I pag. 269, Taf. 18, Fig. 1.

7269 a. 2 erw. Majunga. **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.

7269 b. 3 Ste. Ebendaher. Gesch. 1892 von demselben.

7269 c. Halbw. Soalala. **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von demselben.

7269 d. 2 jung. Majunga. **West-Madagaskar**. Gesch. 1897 von demselben.

Genus VII. Pseudoxenodon Blgr.

1. *Pseudoxenodon macrops* (Blyth).

Boulenger, Cat. I pag. 270.

7270 a. Erw. Darjeeling. **Ost-Himalaya**. Get. 1891 vom British Museum (N. H.), London.

2. *Pseudoxenodon inornatus* (Boie).

Boulenger, Cat. I pag. 272.

7272 a Jung. **Java**. Gesch. 1896 von Direktor August Siebert, hier.

Genus VIII. Helicops Wgl.

1. *Helicops schistosus* (Daud.).

Boulenger, Cat. I pag. 274.

7274 a. Jung. Kandy in **Central-Ceylon**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strabell, Bonn.

7274 b. Erw. **Ceylon**. Gek. 1889 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

2. *Helicops pictiventris* Werner.

Werner (noch nicht veröffentlicht).

7275a. Erw. **Brasilien.** Gesch. 1898 von Dr. Franz Werner. Wien.

3. *Helicops carinicauda* (Wied).

Boulenger. Cat. I pag. 276.

7276.1a. Erw. Stadt Rio Grande. **Rio Grande do Sul,** Brasilien. Gek. 1886 von Prof. Dr. H. von Ihering. daselbst.

7276.1b. Erw. (Rüppell. Cat. III X 3a als *Homalopsis*). **Brasilien.** Gesch. 1838 von Schöff. Dr. C. von Heyden. hier

var. *infrataeniata* Jan.

Boulenger. l. c. pag. 277.

7277a. Erw. **Rio Grande do Sul,** Brasilien. Get. 1888 von Prof. Dr. H. von Ihering. daselbst.

4. *Helicops modestus* Gthr.

Boulenger. Cat. I pag. 277.

7277.2a. Erw. u. jung. **São Paulo,** Brasilien. Gek. 1881 von Jos. Duschaneck. daselbst.

7277.2b. Halbw. u. jung. **Ebendaher.** Gek. 1876 von Prof. Carlos Müller. daselbst.

5. *Helicops leopardinus* (Schlg.).

Boulenger. Cat. I pag. 278.

7278a. Erw. Cujapa. Staat **Matogrosso,** Brasilien. Gesch. 1885 von Josef Schumacher. hier.

7278b. Halbw. **Nord-Brasilien.** Gesch. 1897 von Prof. Dr. O. Boettger. hier.

6. *Helicops angulatus* (L.).

Boulenger. Cat. I pag. 278.

7278.1a. 2 erw., 2 jung (Rüppell. Cat. III X 4a—d als *Homalopsis*). **Ilheos, Brasilien.** Gesch. 1838 von Gebr. Koch. hier.

Genus IX. Tretanorhinus D. B.

1. *Tretanorhinus nigroluteus* Cope.

Boulenger. Cat. I pag. 282.

7282.1a. Erw. **Nicaragua.** Gesch. 1892 von Prof. Dr. O. Boettger. hier.

Genus X. Ischnognathus D. B.

1. *Ischnognathus dekayi* (Holbr.).

Boulenger, Cat. I pag. 286.

7286.1 a. Erw. Milwaukee. **Wisconsin.** Gesch. 1893 von Bierbrauer Rudolf Henrich, hier.

7286.1 b. Erw. (Rüppell, Cat. III O* 10 a) als *Tropidonotus fasciatus*). **Verein. Staaten.** Gesch. 1838 von Dr. Reuß und W. Engelmann, St. Louis.

2. *Ischnognathus occipitomaculatus* (Stor.).

Boulenger, Cat. I pag. 287.

7287 a. Halbw. n. 2 Junge. Milwaukee. **Wisconsin.** Gesch. 1893 von Bierbrauer Rudolf Henrich, hier.

3. *Ischnognathus storeroioides* (Cope).

Boulenger, Cat. I pag. 288.

7288 a. Erw. Jalisco in 8500'. Hochland von **Mexiko.** Get. 1893 vom British Museum (N. H.), London.

Genus XI. Streptophorus D. B.

1. *Streptophorus diadematus* (B. G.).

Boulenger, Cat. I pag. 292.

7292 a. Erw. Chiacany in 850 m, **Guatemala.** Gek. 1891 von München.

2. *Streptophorus atratus* (Hallow.).

Boulenger, Cat. I pag. 293.

7293.1 a. Erw. **Trinidad.** Gesch. 1894 von F. W. Ulrich und R. R. Mole. Port of Spain.

var. *iansbergi* D. B.

Boulenger, l. c. pag. 294.

7294 a. 2 Ste. Oropouche auf **Trinidad.** Gesch. 1895 von denselben.

var. *maculata* Pts.

Boulenger, l. c. pag. 294.

7294.1 a. 3 erw. San José. **Costa Rica.** Gesch. 1892—93 von Carl Fleischmann, daselbst.

7294.1 b. Jung (schlecht gehalten). **Ebendaher.** Gesch. 1894 von Konsul G. von Schröter, daselbst.

var. *sebae* D. B.

Boulenger, Cat. I pag. 294.

7294.2 a. 2 erw. **Britisch-Honduras**. Get. 1893 vom British Museum (N. H.), London.

7294.2 b. 3 Ste. Retalhulen, **Guatemala**. Gesch. 1894 von Carl Fleischmann, Quezaltenango.

Genus XII. Trachischium Gthr.

1. *Trachischium fuscum* (Blyth).

Boulenger, Cat. I pag. 297.

7297 a. 2 erw. Darjeeling, **Ost-Himalaya**. Get. 1891 vom British Museum (N. H.), London.

2. *Trachischium guentheri* Blgr.

Boulenger, Cat. I pag. 298. Taf. 19, Fig. 1.

7298 a. Erw. Darjeeling, **Ost-Himalaya**. Get. 1891 vom British Museum (N. H.), London.

Genus XIII. Oxyrhabdium Blgr.

1. *Oxyrhabdium modestum* (D. B.).

Boulenger, Cat. I pag. 302; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1886 pag. 106 (partim).

7302 a. Halbw. Manila auf **Luzon**. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, daselbst.

7302 b. Erw. **Central-Luzon**. Gesch. 1890 von demselben.

7302 c. Erw. Insel **Samar**, Philippinen. Gesch. 1897 von demselben.

Genus XIV. Xylophis Beddome.

1. *Xylophis perroteti* (D. B.).

Boulenger, Cat. I pag. 304.

7304 a. Erw. Nilgherries, **Süd-Indien**. Gesch. 1890 vom Museum, Madras.

Genus XV. Brachyorrhus Boie.

1. *Brachyorrhus albus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 305.

7305 a. Erw. u. 2 Junge. Insel **Batjan**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthal, Jena.

7305 b. Erw. Insel **Ternate**. Erh. 1895 von derselben.

7305 c. 3 erw. u. 3 jung. Soa Konorra auf **Halmahera**. Erh. 1895 von derselben.

Genus XVI. Elapoides Boie.

1. *Elapoides fuscus* Boie.

Boulenger, Cat. I pag. 307.

7307 a. Erw. Buitenzorg. **West-Java.** Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

Genus XVII. Aechalinus Pts.

1. *Aechalinus spinalis* Pts.

Boulenger, Cat. I pag. 309.

7309.1 a. Erw. Hakonegebirge auf **Nippon.** Get. 1889 von B. Schmacker, Shanghai.

7309.1 b. 2 erw. **Japan.** Gek. 1886 auf der Prof. Ahlberg'schen Auktion, hier.

Genus XVIII. Haplocereus Gthr.

1. *Haplocereus ceylonensis* Gthr.

Boulenger, Cat. I pag. 309.

7310 a. 4 erw. (Rüppell, Cat. III C 6 a—d als *Calamaria scytale*). **Ceylon.** Gesch. 1846 von W. Worms, daselbst.

Genus XIX. Aspidura Wgl.

1. *Aspidura trachyprocta* Cope.

Boulenger, Cat. I pag. 313.

7313 a. 2 erw. Nuwara Ellija, **Ceylon.** Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

Genus XX. Pararhadinaea uor.

Oberkiefer zart und schlank, mit etwa 17 schwachen, nach hinten allmählich an Länge zunehmenden Zähnen in gleichen Abständen, der hinterste nur mäßig vergrößert, zusammengedrückt; Unterkiefer breit, kräftig, mit 11 ziemlich stumpfen Zähnen, die vordersten klein, allmählich nach hinten größer werdend, vom sechsten an erheblich größer und weitlängiger gestellt. Kopf nicht vom Halse abgesetzt; Auge klein, mit runder Pupille. Körper walzenförmig, Schuppen glatt, ohne Endgrübchen, in 17 Reihen; Ventrallen gerundet. Schwanz kurz; Subcaudalen zweireihig, Hypapophysen längs der ganzen Wirbelsäule deutlich entwickelt. Nossibé.

Hierher als einzige Art:

1. *Pararhadinaea melanogaster* n. sp. *)

7313.1 a. Erw. ♀. Insel **Nossibé.** Gesch. 1897 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.

*) Kopf niedergedrückt. Rostrale doppelt so breit wie lang, von oben

Genus XXI. Lycognathophis Blgr.

1. *Lycognathophis sechellensis* (Schlg.).

Boulenger, Cat. I pag. 317.

7317.1a. Erw. **Seychellen**. Gesch. 1896 von Privatdoc. d. Zool. Dr. Aug. Brauer, Marburg (Hessen).

eben noch sichtbar: Internasalsutur viel kürzer als die Praefrontalsutur. Frontale ziemlich dreieckig, vorn $1\frac{1}{3}$ mal so breit wie lang und doppelt so breit wie ein Oculare, so lang oder etwas kürzer als sein Abstand von der Schnauzenspitze, viel kürzer als die Parietalen, Oculare kleiner und viel schmaler als ein Praefrontale, Frenale fehlend; Nasale geteilt; das hintere Nasale stößt an das Praeoculare und trennt das Praefrontale von den Supralabialen; zwei Postocularen, Temporalen 1 + 2, das vordere nicht mit dem oberen Postoculare in Berührung, Sieben Supralabialen, von denen das dritte und vierte ans Auge treten, Vier Infralabialen in Berührung mit den vorderen Kinnschildern, die so lang sind wie die hinteren, Das vierte Infralabiale sehr groß; das hintere Submentalenpaar bildet nur mit je einem Infralabiale Suturen.

Schuppenformel: Squ. 17; G. $5\frac{1}{4}$, V. 163, A. $1\frac{1}{2}$, Sc. $4\frac{1}{4}$ + 1.

Hell braungelb mit fünf scharf markierten dunkelbraunen Längsstreifen, von denen die äußersten am breitesten sind, dann folgt der Mittelstreifen; am schmalsten sind die dazwischen liegenden Dorsolateralstreifen. Die jederseitigen beiden Seitenstreifen vereinigen sich an der Schwanzwurzel zu einem einzigen Streifen, so daß der Schwanz nur drei dunkle Streifen zeigt. Vorn reichen diese Streifen bis an ein weißgelbes breites Band, das quer über das Hinterhaupt zieht; nur die äußersten Seitenstreifen setzen sich nach vorn hin fort und ziehen durchs Auge bis zum Nasenloch. Die Kopfoberseite trägt eine dunkelbraune, weiß umsäumte Kappe. Die Oberlippe ist zum größten Teil hell gefärbt, Kehle und Kinn sind milchweiß mit je einem schwarzen Flecken auf jeder Schuppe, die Ventralen schwarz mit weißem Seitenrand; auf der untersten milchweiß gefärbten Schuppenreihe eine fortlaufende Reihe feiner schwarzer Pünktchen, Subcaudalen milchweiß, in der ersten Schwanzhälfte jedes Subcaudalschildchen mit einem großen schwarzen Querflecken.

Maße: Totallänge des erwachsenen ♀: 239, Schwanzlänge 37 mm.

Fundort: **Nossibé**, sehr selten, nur in einem Stück, einem eierträchtigen ♀ von Herrn Dr. Alfred Voeltzkow aus Berlin gesammelt und eingeschickt. Ein zweites, aber kleineres Exemplar befindet sich in der Sammlung des Naturhistorischen Museums zu Lübeck.

Bemerkungen: Diese kleine Art erinnert in Gestalt und Färbung sehr an die Gattung *Elapotinus* Jan, ist aber aglyphodont, hat zahlreichere Zähne im Oberkiefer und nach hinten größere und weitläufiger gestellte Zähne im Unterkiefer.

Genus XXII. Ablabophis Blgr.

1. *Ablabophis rufulus* (Licht.).

Boulenger, Cat. I pag. 318.

7318 a. Erw. **Süd-Afrika**. Gesch. 1873 von Dr. Löwenthal, hier.

7318 b. Erw. **Ebendaher**. (Rüppell, Cat. III G 7 a als *Coronella rufescens*.)
Gesch. 1838 von Baron von Ludwig.

Genus XXIII. Tetralepis Bttgr.

1. *Tetralepis fruhstorferi* Bttgr.

Boulenger, Cat. I pag. 320; Boettger, Ber. Offenbach, Ver. f.
Naturk. 1892 pag. 125.

7320 a. 2 erw. Tengger-Gebirge in 1200 m. **Ost-Java**. Gek. 1891 von Hans
Fruhstorfer, Berlin.

Genus XXIV. Lamprophis Smith.

1. *Lamprophis aurora* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 321.

7321 a. Erw. (Rüppell, Cat. III G 8 a als *Coronella*). **Süd-Afrika**. Alte
Sammlung 1845.

Genus XXV. Gonionotophis Blgr.

1. *Gonionotophis vossi* (Bttgr.).

Boulenger, Cat. I pag. 323; Boettger, Zool. Anzeiger 1892
pag. 318 (*Gonionotus*).

7323, 1a. Halb. **Kamerun**. Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz, Berlin.

Genus XXVI. Cyclocorus D. B.

1. *Cyclocorus lineatus* (Reinh.).

Boulenger, Cat. I pag. 327.

7327 a. 3 erw. **Central-Luzon**. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von
Moellendorff, Manila.

7327 b. Halb. Insel **Samar**, Philippinen. Gesch. 1897 von demselben.

Genus XXVII. Boodon D. B.

1. *Boodon geometricus* (Schlg.).

Boulenger, Cat. I pag. 329.

7329 a. Erw. **Seychellen**. Gesch. 1896 von Dr. Aug. Brauer, Marburg
(Hessen).

2. *Boodon lineatus* D. B.

Boulenger, Cat. I pag. 332; Boettger, 24/25. Ber. Offenbach.
Ver. f. Naturk. 1885 pag. 184 und Ber. Senck. Nat. Ges. 1887—88
pag. 69 und 1889 pag. 294.

- 7333 a. 6 Ste. Banana. **Unter-Congo**. Gek. 1885 von Paul Hesse, Venedig.
7333 b. Halbw. Odumase. **Ost-Goldküste**. Gesch. 1892 von Hans Simon,
Stuttgart.
7333 c. Jung (var. *variegata* Jan). **Süd-Afrika**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl,
Hamburg.
7333 d. Erw. Kinshassa am Stanley Pool. **Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul
Hesse, Venedig.
7333 e. Halbw. Akkra. **Goldküste**. Gesch. 1887 von Major Dr. L. von Heyden,
hier.
7333 f. Halbw. (var. *quadrilineata* Jan). **Port Natal**. Gek. 1877 von Hamburg.
7333 g. Erw. Insel **S. Thomé**, West-Afrika. Gesch. 1891 von Dr. Jacques
de Bedriaga, Nizza.
7333 h. Erw. u. jung. Kokotoni auf **Sansibar**. Gesch. 1897 von Dr. Alfred
Voeltzkow, Berlin.
7333 i. Erw. u. jung. Moschi bei Tanga. **Kilima-Njaro**. Gesch. 1897 von
Ingenieur Karl Nolte, daselbst.

3. *Boodon fuliginosus* (Boie).

Boulenger, Cat. I pag. 334; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges.
Bd. 12, 1881 pag. 398 (*unicolor*).

- 7334 a. Erw. Akkra. **Goldküste**. Gesch. 1887 von Major Dr. L. von Heyden,
hier.

4. *Boodon olivaceus* (A. Dum.).

Boulenger, Cat. I pag. 335.

- 7335.1 a. Halbw. **Kamerun**. Gesch. 1896 von Dr. Heinr. Lenz, Lübeck.
7335.1 b. Erw. **Ebendaher**. Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz, Berlin.

Genus XXVIII. Lycophidium D. B.

1. *Lycophidium laterale* Hallow.

Boulenger, Cat. I pag. 338; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888
pag. 68 (*capense* var.).

- 7338.1 a. Erw. u. halbw. **Kamerun**. Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz, Berlin.

2. *Lycophidium capense* (Smith).

Boulenger, Cat. I pag. 339.

- 7339.1 a. Erw. (var. B). Kokotoni auf **Sansibar**. Gesch. 1897 von Dr. Alfred
Voeltzkow, Berlin.

var. *multimaculata* Bttgr.

Boulenger, Cat. I pag. 340; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 67.

7340a. 2 erw. **Banana, Unter-Congo.** Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.

3. *Lycophidium fasciatum* (Gthr.).

Boulenger, Cat. I pag. 342, Taf. 22, Fig. 2.

7342.1a. Erw. **Kamerun.** Gesch. 1892 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

7342.1b. 2 erw. (schlecht gehalten). **Ebendaher.** Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz, Berlin.

Genus XXIX. Hormonotus Hallow.

1. *Hormonotus modestus* (D. B.).

Boulenger, Cat. I pag. 343.

7344a. Erw. u. jung. **Odmase, Goldküste.** Gesch. 1892 von Hans Simon, Stuttgart.

Genus XXX. Lycodon Boie.

1. *Lycodon striatus* (Shaw).

Boulenger, Cat. I pag. 349.

7349a. Erw. **Ceylon.** Gesch. 1881 von Gustav Herath, hier.

7349b. Jung. **Madras.** Gesch. 1890 von Theodor Kolb, daselbst.

2. *Lycodon aulicus* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 352.

7352a. Erw. (Rüppell, Cat. III L 1a als *lebe*). **Java.** Gesch. 1838 von Dr. von Siebold, Leiden

7352b. Erw. **Bombay.** Gek. 1877 von Hamburg.

7352c. 2 erw. (Rüppell, Cat. III V 11a—b als *Dipsas*). **Java.** Gesch. 1835 von Dr. med. Peitsch, Batavia.

var. *capucina* Boie.

Boulenger, l. c. pag. 353.

7353a. Erw. **Dapitan auf Mindanao.** Gesch. 1893 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

7353b. Erw. **Madras.** Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.

7353c. 3 erw. **Buitenzorg, West-Java.** Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

7353d. 6 Ste. **Mittel-Luzon.** Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

7353e. 2 erw. **Manila auf Luzon.** Gesch. 1891 von demselben.

7353f. Jung. **Insel Cebu, Philippinen.** Gesch. 1897 von Otto Koch, daselbst.

3. *Lycodon travancoricus* (Bedd.).

Boulenger, Cat. I pag. 355. Taf. 24. Fig. 3.

7355 a. Halbw. Nilgherries, **Süd-Indien**. Gesch. 1890 vom Museum in Madras.

4. *Lycodon subcinctus* Boie.

Boulenger, Cat. I pag. 359.

7359 a. Jung. Samarang. **Java**. Gesch. 1876 von Major Dr. L. von Heyden. hier.

7359 b. Erw. u. 2 halbw. Buitenzorg. **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell. Bonn.

7359 c. Halbw. Sultanat Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens Hohwiesner, hier.

Genus XXXI. Dinodon D. B.

1. *Dinodon rufozonatus* (Cant.).

Boulenger, Cat. I pag. 361; Boettger, 24./25. Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1885 pag. 124 (var. *formosana*) und 1895 pag. 108.

7361 a. 3 erw. Yaeyama auf Mijakoshima. **Süd-Liukiu-Gruppe**. Gesch. 1895 von Bernhard Schmacker, Shanghai.

7361 b. Erw. (var. *formosana* Bitger.) Insel **Formosa**. Gesch. 1872 von Konsul Ferdinand Knoblauch, hier.

2. *Dinodon japonicus* (Gthr.).

Boulenger, Cat. I pag. 363.

7363.1 a. Erw. **Nippon**. Gek. 1896 von Gustav Schneider, Basel.

Genus XXXVII. Stegonotus D. B.

1. *Stegonotus reticulatus* Blgr.

Boulenger, Cat. III pag. 619; Boettger in Semon's Zool. Forsch. Heft 5. 1894 pag. 120 (*modestus*, non Schlg.).

7366 a. Erw. **Südost-Neuguinea**. Gesch. 1894 von Prof. Dr. R. W. Semon. Jena.

2. *Stegonotus modestus* (Schlg.).

Boulenger, Cat. I pag. 366.

7366 a. Erw. **Neu-Guinea**. Gesch. 1897 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

7366 b. Erw. Ema auf Leitimor. **Süd-Amböina**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

3. *Stegonotus heterurus* Blgr.

Boulenger, Cat. I pag. 367, Taf. 25, Fig. 1.

7367a. Halbw. **Neubritannien**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.

4. *Stegonotus muelleri* D. B. *)

Boulenger, Cat. I pag. 367.

7367.1a. Halbw. Insel **Samar**, Philippinen. Gesch. 1897 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

5. *Stegonotus batjanensis* (Gthr.).

Boulenger, Cat. I pag. 368.

7368a. 6 Ste. Soah Konorah auf **Halmahera**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

6. *Stegonotus dumerili* Blgr.

Boulenger, Cat. I pag. 368.

7369a. Erw. **Central-Luzon**. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

Genus XXXIII. Dryocalamus Gthr.

1. *Dryocalamus nympha* (Daud.).

Boulenger, Cat. I pag. 370.

7370a. Jung. **Madras**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.

7370b. Erw. (Rüppell, Cat. III M 2 a als *Clelia* sp.). **Ceylon**. Alte Sammlung 1845.

*) Abweichend von der Originalbeschreibung durch 8 (nicht 9) Supralabialen, von denen das vierte und fünfte ans Auge treten.

Schuppenformel: Squ. 17; G. $\frac{3}{2}$, V. 224, A. 1, Sc. $\frac{102}{102} + 1$.

 " 17; " $\frac{3}{2}$, " 232, " 1, " $\frac{78}{78} + ?$

Rumpf (bei halbwüchsigen Stücken) mit etwa 17—20 breiten schwarzen Querbinden, die durch schmale, auf der Rückenmitte nur etwa zwei Schuppenreihen breite, nach den Ventralen hin verbreiterte weiße Querbinden von einander getrennt werden. Diese weißen Querbinden zeigen bräunliche Punkteflecken. Lippen und Unterseite weißgelb, Bauch nach hinten häufig mit breiten grauen Quergürteln, die gegen den After hin immer breiter und dunkler werden und sich auf der Schwanzunterseite stets zu einfarbig schwarzgrauer Färbung verdichten.

2. *Dryocalamus davisoni* (Blanf.).

Boulenger, Cat. I pag. 372; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1888 pag. 55 (*Utape*).

7372 a. Halbw. Bangkok. **Siam**. Gesch. 1893 von Dir. Dr. Erich Haase, daselbst.

7372 b. Erw. **Ebendaher**. Gek. 1886 von Otto Herz, St.-Petersburg.

Genus XXXIV. Pseudaspis Cope.

1. *Pseudaspis cana* (L.).

Boulenger, Cat. I pag. 373.

7373 a. Halbw. **Damaraland**. Gesch. 1893 von Dr. Ed. Fleck, Azuga (Rumänien).

7373 b. Halbw. (Rüppell, Cat. III O 12a als *Coluber*). **Kapland**. Alte Sammlung 1845.

var. *phocorum* Gthr.

Boulenger, l. c. pag. 374.

7374 a. Erw. **Süd-Afrika**. Gesch. 1893 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

Genus XXXV. Zaocys Cope.

1. *Zaocys dhumnades* (Cantor).

Boulenger, Cat. I pag. 375, Taf. 26, Fig. 1.

7375 a. Erw. n. jung. **Shanghai**. Get. 1889 von Bernh. Schmacker, daselbst.

7375 b. Erw. Lüshan-Gebirge bei **Kinkiang**. Get. 1889 von demselben.

7375 c. Erw. Hongkong. **Süd-China**. Gek. 1877 von Hamburg.

2. *Zaocys nigromarginatus* (Blyth).

Boulenger, Cat. I pag. 376.

7376 a. Halbw. Darjeeling. **Ost-Himalaya**. Get. 1891 vom British Museum (N. H.). London.

3. *Zaocys luzonensis* Gthr.

Boulenger, Cat. I pag. 377, Taf. 26, Fig. 2.

7377 a. Erw. **Mittel-Luzon**. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

4. *Zaocys carinatus* (Gthr.).

Boulenger, Cat. I pag. 377, Taf. 27, Fig. 1.

7377.1 a. Erw. ♂. Sultanat Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens Hohwiesner, hier.

5. *Zaocys fuscus* (Gthr.).

Boulenger. Cat. I pag. 378, Taf. 27, Fig. 2.

- 7378 a. Erw. Sultanat Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens Hohwiesner. hier.

Genus XXXVI. Zamenis Wgl.

1. *Zamenis korros* (Schlg.).

Boulenger. Cat. I pag. 384.

- 7384 a. Erw. Nyen-lang-li bei Hongkong. **Süd-China**. Gesch. 1880 von Hans Simon, Stuttgart.
- 7384 b. Erw. Buitenzorg. **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.
- 7384 c. Erw. Insel **Hainan**, Süd-China. Gek. 1886 von Otto Herz. St.-Petersburg.
- 7384 d. Jung. Samarang. **Java**. Gesch. 1876 von Major Dr. L. von Heyden. hier.
- 7384 e. Erw. Kanton. **Süd-China**. Gesch. 1886 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila, und Otto Herz. St.-Petersburg.
- 7384 f. Erw. Reich Jolo. **Java**. Gesch. 1868 von E. Lörseh, hier.

2. *Zamenis mucosus* (L.).

Boulenger. Cat. I pag. 385; Boettger. Zool. Jahrb. Bd. 3. 1888 pag. 931 (*Ptyas*).

- 7385 a. Erw. Taiwanfoo auf **Süd-Formosa**. Gesch. 1895 von Bernhard Schmacker, Shanghai.
- 7385 b. 3 erw. Kanton. **Süd-China**. Gesch. 1885 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
- 7385 c. Erw. Insel **Hainan**, Süd-China. Gek. 1886 von Otto Herz. St.-Petersburg.
- 7385 d. Erw. Hongkong. **Süd-China**. Gek. 1877 von Hamburg.
- 7385 e. Erw. **Ceylon**. Gesch. 1846 von W. Worms. hier.
- 7385 f. Erw. **Hongkong**. Gek. 1887 von B. Schmacker, Shanghai.
- 7385 g. 4 Junge. **Ceylon**. Gesch. 1846 von W. Worms. hier.
- 7385 h und i. 2 erw. (gestopft). **Ostindien**. Gek. 1846 von Boissoneau.

3. *Zamenis constrictor* (L.).

Boulenger. Cat. I pag. 387.

- 7387 a. 2 erw. (typ. u. var. *flaviventris* Say). **Verein. Staaten**. Gesch. 1874 u. 1891 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft. hier.
- 7387 b. 2 erw. (var. *flaviventris* Say). **Verein. Staaten** (Rüppell. Cat. III 05a als *Coluber*). Gesch. 1838 von Dr. med. Reuß und W. Engelmann, St. Louis.

4. *Zamenis mentovarius* (D. B.).

Boulenger, Cat. I pag. 389.

7389 a. Halbw. (Var. ohne Fleckenreihen auf den vorderen Ventralen). Carácas, Venezuela.*) Gek. 1897 von Ingenieur Müller, hier.

5. *Zamenis flagelliformis* (Laur.).

Boulenger, Cat. I pag. 389.

7389, 1 a. Erw. Mexiko. Gek. 1846 von H. Finck, Ludwigsburg.

6. *Zamenis taeniatus* (Hallow.).

Boulenger, Cat. I pag. 390.

7390 a. Erw. (typ.). Mexiko. Gek. 1882 von Lehrer Hollmann, Vegesack.

7. *Zamenis bitaeniatus* n. sp.**)

7392, 1 a. Erw. Retalhulen, Guatemala. Gesch. 1895 von Carl Fleischmann, Guatemala.

*) Sicherer Fundort! Vergl. auch Jan. Elenco sist. d. Ofidi. Milano 1863 pag. 64 (Mus. Turin). — Boulenger, l. c., kennt die Art nur aus Mexico und Guatemala und zwar speciell von San Geronimo in der Vera Paz, vom Rio Chisoy und aus Mexico.

**) Nächster Verwandt *Z. pulcherrimus* (Cope) von Tehuantepec, aber mit etwas zahlreicheren Ventralen, vorn breiterem und überhaupt relativ kürzerem Frontale und abweichender Färbung. — Maxillarzähne 20, die beiden letzten nicht kräftiger und nur sehr wenig länger als die vorhergehenden. Schnauze ziemlich stark vorgezogen, vorn abgestumpft. Rostrale etwas breiter als hoch, sein oben sichtbarer Teil nur etwa ein Drittel des Abstandes zwischen ihm und dem Vorderrand des Frontale messend. Internasalen wenig kürzer als die Praefrontalen: Frontale vorn deutlich breiter als das Supraoculare, nur etwa $1\frac{1}{2}$ mal so lang wie vorne breit, etwas länger als sein Abstand vom Schnauzenende, kürzer als die Parietalen. Frenale knapp $1\frac{1}{2}$ mal so lang wie hoch; ein Praeoculare, das das Frontale nicht erreicht; Subocularen fehlen: zwei Postocularen, das untere kleiner, nur halb so hoch wie das obere; Temporalen klein, $2 + 2 + 2$. Neun Supralabialen, von denen das vierte, fünfte und sechste in den Augenkreis treten: fünf Infralabialen in Berührung mit den vorderen Kinnschildern; hintere Kinnschilder länger als die vordern und von einander durch Schuppen getrennt. Schuppen glatt: Ventralen seitlich nur sehr undeutlich stumpf gewinkelt.

Schuppenformel: Squ. 17; G. $1\frac{1}{1}$, V. 208, A. $1\frac{1}{1}$, Sc. $142\frac{1}{142} + 1$.

Oberseits bis zur (verrundeten) Bauchkante hell grünlichgrau mit jederseits einem vom Nasenloch durch das Auge an den Rückenseiten und dem Schwanz entlang laufenden, breiten tiefschwarzen Dorsolateralstreifen, der

8. *Zamenis gemonensis* (Laur.).

Boulenger, Cat. I pag. 395; Boettger, Sitz.-Ber. Akad. Berlin 1888 pag. 183 und Ber. Senck. Nat. Ges. 1879—80 pag. 151 (*viridiflavus* vars. *asiana* et *carbonaria*).

- 7395 a. Erw. Caltanissetta auf **Sicilien**. Gesch. 1880 von Chefinspektor C. Hirsch, Palermo.
- 7395 b. Erw. Olivuzza auf **Sicilien**. Gesch. 1880 von demselben.
- 7395 c. 2 erw. (var. *carbonaria* Bonap.). Taormina auf **Sicilien**. Gesch. 1880 von demselben.
- 7395 d. Erw. (lieselbe Varietät). **Palermo**. Gesch. 1882 von demselben.
- 7395 e. Erw. **Italien**. Gesch. 1876 von Hofr. Prof. Dr. O. Bütschli, Heidelberg.
- 7395 f. Erw. **Ebendäher**. Gesch. 1891 von Prof. Dr. med. Edinger, hier.
- 7395 g. 2 erw. Patras, **Nord-Morea**. Gek. 1892 von Dr. Christian Brümme, Wiesbaden.
- 7395 h. Erw. **Italien**. Gesch. 1891 von Prof. Dr. med. Edinger, hier.
- 7395 i. Halbw. Insel **Capri**. Gesch. 1891 von Oberlehrer J. Blum, hier.
- 7395 k. Erw. ♂ (Rüppell, Cat. III O 2 a als *Coluber viridiflavus*). **Triest**. Get. 1838 von Michaelles, München.
- 7395 l. 2 erw. **Palermo**. Gesch. 1881 von Chefinspektor C. Hirsch, daselbst.
- 7395 m. 3 jung. Caltanissetta auf **Sicilien**. Gesch. 1886 von demselben.
- 7395 n. Erw. (Rüppell, Cat. III O 2 b als *Coluber viridiflavus*). **Trentino**. Get. 1838 von Graf Jenison, Heidelberg.
- 7395 o. 3 erw. (Rüppell, Cat. III O 2 c—d und 3 a als *C. viridiflavus* und *caspius*). Knin, **Dalmatien**. Get. 1838 von demselben.
- 7395 p. 6 erw. **Palermo**. Gesch. 1880 von Chefinspektor C. Hirsch, daselbst.
- 7395 q. 2 erw. (var. *carbonaria* Bonap.) Cap Gallo bei **Palermo**. Gesch. 1880 von demselben.
- 7395 r. Erw. n. jung. (Rüppell, Cat. III O 2 e—f als *C. viridiflavus*). **Süd-Europa**. Alte Sammlung 1845.

var. *trabalis* Pallas.

Boulenger, l. c. pag. 396; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1889 pag. 206.

- 7396 a. Erw. Thcodosia, **Krim**. Gesch. 1882 von Staatsrat O. Retowski, daselbst.
- 7396 b. Erw. Sinope, **Kleinasien**. Erh. 1888 von Staatsrat O. Retowski's II. Reise.
- 7396 c. Erw. Insel **Chios**. Gesch. 1862 von Hofr. Dr. med. Pauli, hier.

drei Schuppenreihen einnimmt, während der durch diese Streifen begrenzte helle Medianstreifen zwei Schuppenreihen breit ist. Kopf oben olivengrün; Lippen und die ganze Unterseite einfarbig elfenbeinweiß.

Maße: Totallänge 857, Schwanzlänge 302 mm.

Fundort: Retalhulen in Guatemala, nur das vorliegende Stück von Herrn Carl Fleischmann 1895 gefunden und eingesandt.

var. *asiana* Bttgr.

Boulenger, l. c. pag. 397.

- 7397 a. 2 Ste. **Jerusalem**. Gesch. 1880 von Hans Simon, Stuttgart.
7397 b. Erw. (melanotische Form). **Ebendaher**. Gesch. 1880 von demselben.
7397 c. Erw. (desgl.). Sarona bei Jaffa. **Syrien**. Gesch. 1881 von demselben.
7397 d. Jung. **Syrien**. Gesch. 1840 von W. Rosenbach, hier.
7397 e. Kopf. Haiffa, **Syrien**. Gesch. 1880 von Hans Simon, Stuttgart.
7397 f. 3 halbw. **Jerusalem**. Gesch. 1881 von demselben.

9. *Zamenis dahli* (Fitz.).

Boulenger, Cat. I pag. 397; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1879—80 pag. 153.

- 7397.1a. 2 erw. (Rüppell, Cat. III S 1a als *Tyria*). **Dalmatien**. Get. 1838 von Michaelles, München.
7397.1b. 4 Ste. **Jerusalem**. Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.
7397.1c. Erw. **Syrien**. Gesch. 1840 von W. Rosenbach, hier.
7397.1d. Kopf u. jung. Prevesa, **Epirus**. Gesch. 1890 von César Conéménos, daselbst.
7397.1e. Erw. u. jung. Jaffa, **Syrien**. Gesch. 1879 von Major Dr. L. von Heyden, hier.
7397.1f. Erw. (var. *najadum* Eichw.). Oberer Araxes, **Russisch-Armenien**. Erh. 1890 von Dr. Jean Valentin's Reise in den Karabagh.

10. *Zamenis rhodorhachis* Jan.

Boulenger, Cat. I pag. 398; Boettger, Zool. Anzeiger 1893 pag. 118 (*ladacensis* var. *subnigra*)

- 7398 a. Erw. Askhabad, **Transkaspien**. Gesch. 1889 von C. Eylandt, daselbst.

var. *ladacensis* Anders.

Boulenger, l. c. pag. 399.

- 7399 a. Erw. (Rüppell, Cat. III O 11 als *Coluber florulentus*). **Tor. Arabien**. Gesch. 1836 von Dr. Eduard Rüppell, hier.

11. *Zamenis karelini* (Brandt).

Boulenger, Cat. I pag. 401; Boettger, Zool. Jahrb. Bd. 3, 1888 pag. 928 (*centrimaculatus* var.).

- 7401 a. Erw. Askhabad, **Transkaspien**. Gesch. 1890 von C. Eylandt, daselbst.
7401 b. Erw. Durum, **Transkaspien**. Gesch. 1888 von Staatsrat Dr. Gustav von Radde, Exez, Tiflis.

12. *Zamenis florulentus* (Geoffr.).

Boulenger, Cat. I pag. 402.

- 7403 a. 3 halbw. (Rüppell, Cat. III O 1 d—e als *Coluber*). **Nubien**. Gesch. 1830 von Dr. Eduard Rüppell, hier.
7403 b. 3 erw. (Rüppell, Cat. III O 1 a—c als *Coluber*). **Ägypten**. Gesch. 1836 von demselben.
7403 c. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1897 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.
7403 d. Jung (Rüppell, Cat. III O 15 a als *Coluber floriceps*). **Ebendaher**. Gesch. 1836 von Dr. Eduard Rüppell, hier. *)

13. *Zamenis ravergeri* (Ménétr.).

Boulenger, Cat. I pag. 405; Boettger, Zool. Jahrb. Bd. 3. 1888 pag. 927 (var. *fedtschenkoï*).

- 7405 a. Erw. Oberer Araxes, **Russisch-Armenien**. Erh. 1890 von Dr. Jean Valentin's Reise in den Karabagh.
7405 b. Erw. (var. *fedtschenkoï* Strauch). **Aschabad, Transkaspien**. Gesch. 1888 von Staatsrat Dr. Gustav von Radde, Excz., Tiflis.

14. *Zamenis nummifer* (Reuß).

Boulenger, Cat. I pag. 407; Reuß, Mus. Senck. Bd. I. 1834 pag. 135 (*Coluber*); Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1879—80 pag. 154 (*ravergeri* var.).

- 7407 a. Erw. (Original. Rüppell, Cat. III O 4*a als *Coluber*). **Ägypten**. Gesch. 1832 von Dr. Eduard Rüppell, hier.
7407 b. 4 halbw. (Rüppell, Cat. III O 4*b—c). **Syrien**. Gesch. 1839 von W. Rosenbach, hier.
7407 c. 4 halbw. **Jerusalem**. Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.

15. *Zamenis algirus* (Jan).

Boulenger, Cat. I pag. 408; Boettger in Kobelt's Reise Alg. Tunis 1885 pag. 459.

- 7408.1 a. 2 erw., 2 jung. Biscra, Prov. Constantine. **Algerien**. Gek. 1885 von Louis Fischer, daselbst.
7408.1 b. 2 erw. **Ebendaher**. Gek. 1885 von demselben.

*) Dieses noch sehr junge Stück ist in der Färbung sehr eigentümlich. läßt sich aber auf keine andere Art beziehen. Die schwarzen Querzeichnungen auf dem Kopfe sind sehr markiert, der Rumpf einfarbig hell.

16. *Zamenis hippocrepis* (L.).

- Boulenger, Cat. I pag. 409; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 9, 1874 pag. 157, Bd. 12, 1881 pag. 374, Bd. 13, 1883 pag. 100 und in Kobelt's Reise Alg. Tunis 1885 pag. 459.
- 7409 a. Erw. ♀, jung u. Eier. **Tunis.** Gesch. 1885 von Francesco Miceli, daselbst.
- 7409 b. Erw. Malaga, **Süd-Spanien.** Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.
- 7409 c. Erw. u. 2 jung. Tlemgen, **Algerien.** Erh. 1881 von der IV. Rüppellreise Dr. med. W. Kobelt's, Schwannheim (Main).
- 7409 d. Erw. u. 4 jung. Tanger, **Marokko.** Erh. 1881 von derselben.
- 7409 e. Erw. n. 2 jung. Casablanca, **Marokko.** Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.
- 7409 f. Erw. Granada, **Süd-Spanien.** Erh. 1881 von der IV. Rüppellreise Dr. med. W. Kobelt's.
- 7409 g. Jung. Cartagena, **Süd-Spanien.** Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.
- 7409 h. Kopf. Casablanca, **Marokko.** Gesch. 1889 von Dr. med. H. Schädle, daselbst.
- 7409 i und k. 2 erw. Landschaft Sus, **Süd-Marokko.** Gesch. 1872 von den Proff. Dr. C. v. Fritsch, Halle (Saale), und J. J. Rein, Bonn.
- 7409 l. Halb. Stadt **Marokko.** Gesch. 1876 von denselben.
- 7409 m. Halb. **Tunis.** Gesch. 1884 von Francesco Miceli, daselbst.

17. *Zamenis diadema* (Schlg.).

- Boulenger, Cat. I pag. 411; Boettger, Zool. Jahrb. Bd. 3, 1888 pag. 925 und in Kobelt's Reise Alg. Tunis 1885 pag. 458 (*versicolor*).
- 7411 a. 2 jung. Biscra, Prov. Constantine, **Algerien.** Gek. 1885 von Louis Fischer, daselbst.
- 7411 b. Erw. **Ägypten.** Gesch. 1886 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
- 7411 c. 2 erw. (Rüppell, Cat. III O 4 a--b als *Coluber parallelus*), **Ebendaher.** Gesch. 1834 von Dr. med. Ednard Rüppell, hier.
- 7411 d. Erw. **Süd-Tunis.** Gesch. 1896 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

Genus XXXVII. Lytorhynchus Pts.

1. *Lytorhynchus diadema* (D. B.).

- Boulenger, Cat. I pag. 415; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1878—79 pag. 61 (*Simotes*).
- 7415 a. 5 Ste. Jaffa, **Syrien.** Gesch. 1879—82 von Hans Simon, Stuttgart, und Major Dr. L. von Heyden, hier.
- 7415 b. Erw. **Süd-Tunis.** Gesch. 1897 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

Genus XXXVIII. Xenelaphis Gthr.

1. *Xenelaphis hexagonotus* (Cant.).

Boulenger, Cat. Snak. Brit. Museum (N. II.) Bd. II. 1894 pag. 8.

8008 a. Erw. Stabat bei Bindjey. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1893 von Fritz Beyschlag, daselbst.

8008 b. Erw. **Borneo**. Gesch. 1896 von Dr. Heinrich Lenz. Lübeck.

Genus XXXIX. Drymobius Cope.

1. *Drymobius bifossatus* (Raddi).

Boulenger, Cat. II pag. 10; Boettger, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. 58, 1885 pag. 233 (*Ptyas pantherinus*).

8010 a. Halbw. (Varietät ohne jede dunkle Zeichnung). Ilheos. **Brasilien**. (Rüppell, Cat. III P 3 b als *Herpetodryas olfersi*). Gesch. 1838 von Gebr. Koch, hier.

8010 b. Erw. **São Paulo**, Brasilien. Gek. 1876 von Prof. Carlos Müller, daselbst.

2. *Drymobius boddaerti* (Santz).

Boulenger, Cat. II pag. 11; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1889 pag. 313 (*Herpetodryas boddaerti* var. *heathi* Cope).

8011 a. 2 erw. (typ.). Insel **Tobago**, Westindien. Gesch. 1894 von A. Seitz, Hamburg.

8011 b. 4 erw. (Rüppell, Cat. III P 7 b—e als *Herpetodryas*). **Surinam**. Gesch. 1838 von Dr. med. Sichel, hier.

8011 c. Erw. (Rüppell, Cat. III P 7 a als *Herpetodryas*). **Surinam**. Gesch. 1836 von demselben.

8011 d. Erw. (var. *bilineata* Jan). **Brasilien**. Gesch. 1886 von Prof. Dr. Oskar Boettger, hier.

8011 e. Erw. (var. *bilineata* Jan). **Trinidad**. Gesch. 1893 von F. W. Urich und R. R. Mole, daselbst.

8011 f. Erw. u. halb w. (typ.). Caracas. **Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller, hier.

var. *heathi* Cope.

Cope, Journ. Acad. Philadelphia (2) Bd. 8, 1876 pag. 179 (spec.).

8012 a. 3 erw., 2 jung. Pacasmayo. **Nord-Perú**. Gesch. 1889 von Max Bamberger, hier.

8012 b. Jung. **Ebendaher**. Gesch. 1897 von demselben.

var. *rappi* Gthr.

Boulenger, l. c. pag. 13.

- 8013 a. Halbw. **Nordost-Brasilien**. Gesch. 1886 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
8013 b. Jung (Rüppell, Cat. III O 14 a als *Coluber lichtensteini*). **Brasilien**.
Get. 1838 von Graf Jenison, Heidelberg.
8013 c. Jung. **Trinidad**. Gesch. 1879 von Carl Knoblauch, hier.
8013 d. Jung. Cancahal in 500 m. **U. S. Columbia**. Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel, Jena.
8013 e. 5 Junge. Carácas, **Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller, hier.

var. *quinquelineata* Stdehr.

Boulenger, l. c. pag. 14.

- 8014 a. Erw. Alto Orenoco, **Süd-Venezuela**. Gek. 1895 von Georg Häbner, Dresden.

3. *Drymobius rhombifer* (Gthr.).

Boulenger, Cat. II pag. 14.

- 8014.3 a. Halbw. **U. S. Columbia**. Gesch. 1894 von Konsul F. C. Lehmann, Popayán.

4. *Drymobius dendrophis* (Schlg.).

Boulenger, Cat. II pag. 15.

- 8015.1 a. Erw. Puerto Cabello, **Venezuela**. Gesch. 1893 von Konsul F. Maub, daselbst.

5. *Drymobius margaritiferus* (Schlg.).

Boulenger, Cat. II pag. 17.

- 8017 a. 2 Ste. Retalhuleu, **Guatemala**. Gesch. 1895 von Carl Fleischmann, daselbst.
8017 b. Erw. **Britisch-Honduras**. Get. 1893 vom Brit. Museum (N. H.), London.
8017 c. Erw. **Mexiko**. Gek. 1846 von H. Finck, Ludwigsburg.

Genus XL. Phrynonax Cope.

1. *Phrynonax sulphureus* (Wagl.).

Boulenger, Cat. II pag. 19.

- 8019 a. Kopf u. Schwanz. **Central-Trinidad**. Gesch. 1893 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.

2. *Phrynonax poecilonotus* (Gthr.).

Boulenger, Cat. II pag. 20.

8020 a. Erw. **U. S. Columbia.** Gek. 1896 von W. F. H. Rosenberg, London.

3. *Phrynonax fasciatus* (Pts.).

Boulenger, Cat. II pag. 21.

8021, 1 a. Jung. Carenage bei Port of Spain, **Trinidad.** Gesch. 1895 von F. W. Urich und R. R. Mole, daselbst.

4. *Phrynonax eutropis* Blgr.

Boulenger, Cat. II pag. 22. Taf. 1, Fig. 1; Boettger, Bull. Trinid. Club, Bd. 2, 1894 pag. 85.

8022 a. Erw. Caparo auf **Trinidad.** Gesch. 1894 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.

Genus XLI. Spilotes Wagl.

1. *Spilotes pullatus* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 23.

8023 a. Erw. (var. B). **Trinidad.** Gesch. 1895 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.

8023 b. Erw. u. jung. Insel **Tobago,** Westindien. Gesch. 1894 von A. Seitz, Hamburg.

8023 c. Erw. (var. A). **Trinidad.** Gesch. 1893 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.

8023 d. Erw. (var. A). **Brasilien** (Rüppell, Cat. III O 19 a als *Coluber variabilis*). Gek. 1838 vom Naturh. Hofmuseum, Wien.

8023 e. Erw. (var. A; gestopft). **Brasilien** (Rüppell, Cat. III O 19 b als *Coluber variabilis*). Gesch. 1840 von Frau von Panhuijs, hier.

8023 f. Erw. (var. A). Remedios in 600 m. **U. S. Columbia.** Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel, Jena.

8023 g. Erw. (var. A). Carácas, **Venezuela.** Gek. 1897 von Ing. Müller, hier.

Genus XLII. Coluber L.

1. *Coluber corais* Boie.

Boulenger, Cat. II pag. 31.

8031 a. Halbw. **Trinidad.** Gesch. 1893 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.

8031 b. Jung. **Ebendaher.** Gesch. 1879 von Karl Knoblauch, hier.

8031 c. Erw. Sorata, **Bolivia.** Gesch. 1894 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.

var. *melanura* D. B.

Boulenger, l. c. pag. 32.

- 8032 a. Halbw. (Rüppell, Cat. III G 4k als *Coronella cobella*). **Surinam**.
Alte Sammlung 1845.
8032 b. Halbw. **Guatemala**. Gesch. 1892 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
8032 c. Erw. **Mexiko**. Gek. 1846 von H. Finck. Ludwigsburg.

2. *Coluber porphyraceus* Cant.

Boulenger, Cat. II pag. 34.

- 8034 a. Erw. u. halbw. Darjeeling. **Ost-Himalaya**. Get. 1891 vom British
Museum (N. H.), London.

3. *Coluber cantoris* Blgr.

Boulenger, Cat. II pag. 35.

- 8035 a. 2 halbw. Darjeeling. **Ost-Himalaya**. Get. 1891 vom British Museum
(N. H.), London.

4. *Coluber leopardinus* Bonap.

Boulenger, Cat. II pag. 41.

- 8041 a. Halbw. Spalato, **Dalmatien**. Gek. 1880 von Edmund Reitter, Wien.
8041 b. Erw. Prevesa, **Epirus**. Gesch. 1888 von César Conéménos, daselbst.
8041 c. Erw. Makrinitza bei Volo, **Thessalien**. Gesch. 1888 von Josef
Stussiner, Laibach.
8041 d. 3 erw. (Rüppell, Cat. III O 7a—c). **Dalmatien**. Get. 1836 von
Dr. Michaelles, München.
8041 e. Erw. Sudak, **Krim**. Gesch. 1883 von Staatsrat O. Retowski, Theodosia.
8041 f. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1884 von demselben.
8041 g. Erw. Prevesa, **Epirus**. Gesch. 1889 von César Conéménos, daselbst.

var. *quadrilineata* Pall.

Boulenger, l. c. pag. 42.

- 8042 a. 2 erw. Insel **Chios**. Gesch. 1862 von Hofrat Dr. med. Pauli, hier.
8042 b. Kopf u. Vorderhälfte. Xenochóri, **Nord-Euböa**. Gesch. 1891 von
Fr. de Mimont, daselbst.

5. *Coluber rufodorsatus* (Cant.).

Boulenger, Cat. II pag. 43; Boettger, Ber. Offenbach, Ver. f.
Naturk. 1888 pag. 70 und Zool. Anzeiger 1886 pag. 519 (*Simotes
herzi*).

- 8043 a. Erw. Hills bei **Shanghai**. Gek. 1886 von Otto Herz, St.-Petersburg.

8043 b. Erw. Lüshan-Gebirge bei **Kinkiang**. Get. 1889 von Bernh. Schmacker, Shanghai.

8043 c. Erw. Sitai-See bei **Shanghai**. Get. 1889 von demselben.

8043 d. Erw. Chin-hai bei **Ningpo**. Gesch. 1894 von demselben.

6. *Coluber dione* Pallas.

Boulenger, Cat. II pag. 44.

8044 a. Erw. Tschinas. **Turkestan**. Get. 1879 vom Naturh. Museum in St.-Petersburg.

8044 b. Erw. Tschifu. **Nord-China**. Gesch. 1891 von B. Schmacker, Shanghai.

7. *Coluber quatuorlineatus* Lacép.

Boulenger, Cat. II pag. 45.

8045 a. Kopf. Prevesa. **Epirus**. Gesch. 1890 von César Conéménos, daselbst.

8045 b. Embryo. **Dalmatien**. Gesch. 1893 von Schulrat Dr. Egid Schreiber, Görz.

8045 c. Kopf n. jung. Xenochóri. **Nord-Euböa**. Gesch. 1891 von Fr. de Mimont, daselbst.

8045 d. Erw. (Rüppell, Cat. III O 20 a). **Dalmatien**. Get. 1836 von Dr. Michaelles, München.

var. *sauromates* Pallas.

Boulenger, l. c. pag. 47.

8046 a. Halbw. Smyrna. **Kleinasien**. Get. 1885 vom Naturh. Institut Linnaea Berlin.

8. *Coluber taeniurus* (Cope).

Boulenger, Cat. II pag. 47; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1894 pag. 144.

8047 a. Erw. Insel **Formosa**. Gesch. 1872 von Konsul Ferd. Knoblauch, hier.

8047 b. Erw. **Shanghai**. Gek. 1886 von Otto Herz, St.-Petersburg.

8047 c. Erw. Fluß Wusung bei **Shanghai**. Get. 1889 von Bernhard Schmacker, Shanghai.

8047 d. 2 erw. **Shanghai**. Get. 1889 von demselben.

8047 e. Erw. Südcap von **Formosa**. Gesch. 1891 von demselben.

8047 f. 2 erw. **Shanghai**. Get. 1897 vom Naturh. Hofmuseum, Wien.

9. *Coluber schrencki* (Strauch).

Boulenger, Cat. II pag. 48.

8048 a. Erw. **Korea**. Gesch. 1886 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

10. *Coluber obsoletus* Say.

Boulenger, Cat. II pag. 50.

- 8050 a. Erw. (gestopft). **Verein, Staaten** (Rüppell, Cat. III O* 11 a als *Tropidonotus poecilostoma*). Gesch. 1840 von Baron A. von Rothschild durch Prof. Freyreiß.

11. *Coluber conspicillatus* Boie.

Boulenger, Cat. II pag. 51.

- 8051 a. Erw. u. 2 halb. **Nippon**. Gesch. 1876 von Prof. Dr. J. J. Rein, Bonn.

12. *Coluber longissimus* (Laur.).

Boulenger, Cat. II pag. 52; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1889 pag. 271 (*aesculapii*).

- 8052 a. Erw. Vrachori, **Aetolien**. Gek. 1892 von Dr. phil. Christian Broemme, Wiesbaden.
8052 b. 3 erw. (Rüppell, Cat. III O 6 a—c als *flavescens*). **Schlangenbad**. Gesch. 1838 von Schöff Dr. Carl von Heyden, hier.
8052 c. 2 erw. (Rüppell, Cat. III O 6 d—e als *flavescens*). **Trentino**. Get. 1838 von Graf Jenison, Heidelberg.
8052 d. Erw. Prevesa, **Epirus**. Gesch. 1889 von César Conéménos, daselbst.
8052 e. Erw. Mte. Rosso bei Syrakus, **Sicilien**. Gesch. 1886 von Chefinspektor Carl Hirsch, Palermo.
8052 f. Erw. Caltanissetta auf **Sicilien**. Gesch. 1886 von demselben.
8052 g. Erw. **Schlangenbad**. Gesch. 1888 von Prof. Dr. Ferd. Richters, hier.

13. *Coluber climacophorus* Boie.

Boulenger, Cat. II pag. 54.

- 8054 a. Erw. **Nippon**. Gesch. 1876 von Prof. Dr. J. J. Rein, Bonn.
8054 b. Erw. Hakone-Gebirge, **Nippon**. Get. 1889 von Bernhard Schmacker, Shanghai.
8054 c. Erw. u. jung. Nikko, **Nippon**. Get. 1889 von demselben.
8054 d. 2 erw. **Nippon**. Gesch. 1876 von Prof. Dr. J. J. Rein, Bonn.
8054 e. Erw. Miyanoshta im Hakone-Gebirge, **Nippon**. Get. 1889 von Bernhard Schmacker, Shanghai.
8054 f. 3 erw., 2 jung. **Japan**. Gek. 1886 auf der Dr. Ahlberg'schen Auktion, hier.

14. *Coluber moellendorffi* (Bttgr.).

Boulenger, Cat. II pag. 56; Boettger, Zoolog. Anzeiger 1886 pag. 520 und Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1888 pag. 72, Taf. 1. Fig. 1 (*Cynophis*).

- 8056,1 a. Erw. Nan-ning am Ju-tshang, Prov. **Guanghsi**. Gek. 1886 von Otto Herz, St.-Petersburg.

15. *Coluber schmackeri* Bttgr.

Boulenger, Cat. III pag. 627; Boettger, Ber. Offenbach, Ver. f. Naturk. 1895 pag. 108.

8056.2a. Erw. Yaeyama auf Mijakoshima, **Südliche Liukiu-Gruppe**. Gesch. 1895 von Bernhard Schmacker, Shanghai.

16. *Coluber oxycephalus* Boie.

Boulenger, Cat. II pag. 56.

8057a. 2 erw. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

8057b. Erw. **Malakka**. Get. 1893 vom British Museum (N. H.), London.

8057c. Erw. Stabat Estate bei Bindjey, Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1893 von Fritz Beyschlag, daselbst.

8057d. Erw. Indrapura, **West-Sumatra**. Gesch. 1886 von Prof. Dr. Oskar Boettger, hier.

8057e. Erw. Pontianak, **West-Borneo**. Gesch. 1896 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.

17. *Coluber quadrivirgatus* Boie.

Boulenger, Cat. II pag. 59.

8059.1a. 2 erw., 1 jung. **Nippon**. Gesch. 1876 von Prof. Dr. J. J. Rein, Bonn.

8059.1b. Erw. Insel **Jeso**, Nord-Japan. Get. 1889 von Bernh. Schmacker, Shanghai.

8059.1c. Erw. Nikko auf **Nippon**. Get. 1889 von demselben.

var. *atra* Jan.

Boulenger, l. c. pag. 60; Jan., Icon. Ophid. Lief. 24, Taf. 1, Fig. 3.

8059.2a. Erw. **Japan**. Gek. 1877 von Hamburg.

18. *Coluber melanurus* Schlg.

Boulenger, Cat. II pag. 60.

8060a. Erw. Faramfluß, **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

8060b. Halb. Samarang auf **Java**. Gesch. 1876 von Major Dr. L. von Heyden, hier.

8060c. Erw. Surabaya, **Ost-Java**. Gesch. 1889 von Dr. med. Stratz, Haag.

8060d. 3 jung. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

8060e. 2 erw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1894 von Wwe. H. Krämer, hier.

8060f. Erw. Atschin, **Nord-Sumatra**. Gek. 1882 von Konrad Kläsi, Zürich.

8060g. Erw. u. jung. Bindjey in Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1890 von Gebr. Theodor und Egbert Engelhard, daselbst.

- 8060 h. Jung (Rüppell, Cat. III O 13 a). **Java**. Gek. 1840 vom Rijksmuseum, Leiden.
8060 i. 2 erw. Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens Hohwiesner, hier.

19. *Coluber radiatus* Schlg.

Boulenger, Cat. II pag. 61.

- 8061 a. 2 jung. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.
8061 b. Jung (Rüppell, Cat. III O 17 a). **Java**. Gesch. 1838 von Dr. W. von Siebold, Leiden.
8061 c. Erw. Samarang auf **Java**. Gesch. 1876 von Major Dr. L. von Heyden, hier.
8061 d. Erw. **Java**. Gesch. 1886 von Oberlehrer J. Blum, hier.

20. *Coluber erythrus* (D. B.).

Boulenger, Cat. II pag. 62.

- 8062 a. Erw. u. 2 jung. Manila auf **Luzon**. Gesch. 1891 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, daselbst.
8062 b. Erw. Umgebung von Manila, **Luzon**. Gesch. 1891 von demselben.
8062 c. 3 erw., 3 jung. **Mittel-Luzon**. Gesch. 1888 von demselben.
8062 d. Halbw. Insel **Samar**, Philippinen. Gesch. 1897 von demselben.
8062 e. 2 erw. Insel Cidlon, **Calamianes-Gruppe**. Gesch. 1893 von demselben.

21. *Coluber scalaris* Schinz.

Boulenger, Cat. II pag. 65.

- 8065 a. Halbw. **Spanien**. Gesch. 1893 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.
8065 b. Halbw. **Ebendaher**. Gek. 1875 von Hamburg.
8065 c. 2 halbw. Montpellier, Dép. **Hérault**. Gesch. 1887 von Johann von Fischer, daselbst.

22. *Coluber deppei* (D. B.).

Boulenger, Cat. II pag. 66.

- 8066.1 a. Erw. (Rüppell, Cat. III O*9 a als *Tropidonotus* sp.). **Mexiko**. Gesch. 1842 von F. A. Dillenburger, daselbst.

23. *Coluber melanoleucus* Daud.

Boulenger, Cat. II pag. 68.

- 8068 a. Halbw. **Mexiko**. Gesch. 1895 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.
8068 b. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1891 von derselben.

Genus XLIII. Herpetodryas Wgl.

1. *Herpetodryas sexcarinatus* (Wgl.).

Boulenger, Cat. II pag. 72; Boettger, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. 58, 1885 pag. 233 (*carinatus*).

8072 a. 3 Ste. **São Paulo**, Brasilien Gek. 1876 und 1881 von Prof. Carlos Müller und Josef Duschaneck, daselbst.

2. *Herpetodryas carinatus* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 73.

8074 a. 3 Ste. (var. *macrophthalmus* Jan). **Trinidad**. Gesch. 1895 von F. W. Ulrich und R. R. Mole, Port of Spain.

8074 b. Erw. (Rüppell, Cat. III P 1 a). **Brasilien**. Get. 1838 von Graf Jenison, Heidelberg.

8074 c. 2 erw., 1 jung (Rüppell, Cat. III P 1 d—e). **Ebendaher**. Alte Sammlung 1845.

8074 d. Erw. ♀ u. 2 Junge (Rüppell, Cat. III P 1 f—g). Ilheos, **Brasilien**. Gesch. 1838 von Gebr. Koch, hier.

8074 e. Erw. (var. *macrophthalmus* Jan). **Trinidad**. Gesch. 1893 von F. W. Ulrich und R. R. Mole, Port of Spain.

8074 f. Erw. (typ.). **Ebendaher**. Gesch. 1893 von denselben.

var. *bicarinata* Wied.

Boulenger, l. c. pag. 74.

8074.2 a. Erw. San José, **Costa Rica**. Gesch. 1894 von Konsul Guido von Schröter, daselbst.

8074.2 b. Erw. (Rüppell, Cat. III P 1 b). **Brasilien**. Get. 1838 von Graf Jenison, Heidelberg.

8074.2 c. Erw. **Rio Grande do Sul**, Brasilien. Gesch. 1873 von Oberlehrer Dr. Finger, hier.

8074.2 d. Erw. ♀. San José, **Costa Rica**. Gesch. 1892 von Carl Fleischmann, Guatemala.

8074.2 e. Erw. ♂ u. ♀. **São Paulo**, Brasilien. Gesch. 1890 von Prof. Dr. Osk. Boettger, hier.

8074.2 f. Erw. **Brasilien**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.

8074.2 g. Erw. **Rio Grande do Sul**. Gek. 1887 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst

8074.2 h. Erw. Sorata, **Bolivia**. Gesch. 1891 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.

8074.2 i. Jung (Rüppell, Cat. III T 4 a als *Dendrophis laevicollis*). **Brasilien**. Alte Sammlung 1845.

var. *flavolineata* Jan.

Boulenger, Cat. II pag. 75; Boettger, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. 58, 1885 pag. 234 (spec.).

8075 a. Erw. (Rüppell, Cat. III P 1 c). **Brasilien**. Get. 1838 von Graf Jenison, Heidelberg.

Genus XLIV. Dendrophis Boie.

1. *Dendrophis pictus* (Gmel.).

Boulenger, Cat. II pag. 78.

- 8078 a. 2 erw. Baranfluß in **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.
- 8078 b. Erw. Ema auf Leitimor, **Süd-Amboina**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.
- 8078 c. Erw. **Madras**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.
- 8078 d. 4 Ste. (Rüppell, Cat. III T 2 c—f). **Java**. Gesch. 1838 von Dr. von Siebold, Leiden.
- 8078 e. Erw. Buitenzorg. **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell.
- 8078 f. Halbw. Balangan auf **Borneo**. Gesch. 1892 von Prof. Dr. Oskar Boettger, hier.
- 8078 g. 3 erw. Bindjey, Sultanat Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1890 von Theodor und Egerbert Engelhard, daselbst.
- 8078 h. Erw. Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1894 von Wwe. H. Krämer, hier.
- 8078 i. 2 erw. Umgebung von Manila auf **Luzon**. Gesch. 1891 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, daselbst.
- 8078 k. Erw. **Manila**. Gesch. 1877 von Konsul Ferd. Knoblauch, hier.
- 8078 l. Erw. Culion. **Calamianes-Gruppe**, Philippinen. Gesch. 1893 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff.
- 8078 m. Erw. Surabaya. **Ost-Java**. Gesch. 1889 von Dr. med. Stratz, Haag.
- 8078 n. 6 erw. Atschin. **Nord-Sumatra**. Gek. 1882 von Konrad Kläsi, Zürich.
- 8078 o. 2 erw. (Rüppell, Cat. III T 2 a—b). **Java**. Gek. 1839 vom Rijksmuseum in Leiden.
- 8078 p. Zahlr. Ste. **Mittel-Luzon**. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff.
- 8078 q. Erw. Banjermasin. **Südost-Borneo**. Gek. 1894 von Wwe. H. Krieb, hier.

2. *Dendrophis calligaster* Gthr.

Boulenger, Cat. II pag. 80; Boettger in Semon's Zool. Forsch. Hft. 5. 1894 pag. 120 (*punctulatus* part.).

var. *salomonis* Gthr.

Boulenger, l. c. pag. 82.

- 8082.1 a. Erw. **Südost-Neuguinea**. Gesch. 1894 von Prof. Dr. R. W. Semon, Jena.
- 8082.1 b. Erw. Insel Duke of York, **Neubritannien**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.

3. *Dendrophis punctulatus* (Gray).

Boulenger, Cat. II pag. 82; Boettger in Semon's Zool. Forsch.
Hft. 5. 1894 pag. 110.

8082a. Erw. **Nord-Australien**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl. Hamburg.

4. *Dendrophis formosus* Boie.

Boulenger, Cat. II pag. 84; Boettger in Semon's Zool. Forsch.
Hft. 5. 1894 pag. 123 (*pictus*).

8084,1a. Erw. (Rüppell. Cat. III T 3a). **Java**. Gesch. 1838 von Dr. von Siebold. Leiden.

5. *Dendrophis lineolatus* Hombr. Jacq.

Boulenger, Cat. II pag. 85; Boettger in Semon's Zool. Forsch.
Hft. 5. 1894 pag. 120 (*punctulatus* part.).

8085,1a. Erw. **Palau-Inseln**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl. Hamburg.

Genus XLV. Dendrelaphis Blgr.

1. *Dendrelaphis tristis* (Daudin).

Boulenger, Cat. II pag. 88.

8088a. Erw. **Ceylon**. Gesch. 1881 von Gustav Herath. hier.

2. *Dendrelaphis caudolineatus* (Gray).

Boulenger, Cat. II pag. 89.

8089,1a. Erw. Bindjey im Sultanat Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1890
von Theodor und Egbert Engelhard. daselbst.

8089,1b. 2 erw. Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1892 von Dr. med. O.
Benecke. daselbst.

8089,1c. Erw. Stabat Estate bei Bindjey. Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch.
1893 von Fritz Beyschlag. daselbst.

8089,1d. Erw. Pontianak. **West-Borneo**. Gesch. 1896 von Dr. Heinr. Lenz.
Lübeck.

3. *Dendrelaphis terrificus* (Pis.).

Boulenger, Cat. II pag. 90.

8090a. Erw. Ormoc auf **Leyte**, Philippinen. Gesch. 1890 von Otto Koch. Cebu.

8090b. Halb. Dapitan. **Nord-Mindanao**. Gesch. 1893 von Konsul Dr. O.
Fr. von Moellendorff, Manila.

8090c. 6 Ste. **Mittel-Luzon**. Gesch. 1890 von demselben.

4. *Dendrelaphis modestus* Blgr.

Boulenger, Cat. II pag. 91. Taf. 4. Fig. 4.

8091 a. 4 erw. Insel **Batjan**. Erh. 1895 von der Ruppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals. Jena.

8091 b. Erw. Insel **Ternate**. Erh. 1895 von derselben.

8091 c. 6 Ste. Soah Konorah auf **Halmahera**. Erh. 1895 von derselben.

Genus XLVI. Chlorophis Hallow.

1. *Chlorophis hoplogaster* (Gthr.).

Boulenger, Cat. II pag. 93. Taf. 5. Fig. 2.

8093.1 a. Halbw. Boroma am **Sambesi**. Gesch. 1894 von Prof. Dr. O. Boettger. hier.

2. *Chlorophis heterolepidotus* (Gthr.).

Boulenger, Cat. II pag. 95. Taf. 5. Fig. 3; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 60 (*Philothamnus*).

8095.1 a. Erw. Boma, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse. Venedig.

3. *Chlorophis irregularis* (Leach).

Boulenger, Cat. II pag. 96; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 61 (*Philothamnus*).

8096 a. 2 erw. Povo Netonna bei Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse. Venedig.

4. *Chlorophis heterodermus* Hallow.

Boulenger, Cat. II pag. 97; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 59 (*Philothamnus*).

8097 a. Halbw. Povo Nemlao bei Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse. Venedig.

8097 b. Erw. **Kamerun**. Gesch. 1893 von Dr. Heinrich Lenz. Lübeck.

8097 c. Erw. Odmase, **Ost-Goldküste**. Gesch. 1892 von Hans Simon. Stuttgart.

8097 d. Jung. **Kamerun**. Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz. Berlin.

Genus XLVII. Philothamnus Smith.

1. *Philothamnus semivariiegatus* (Smith).

Boulenger, Cat. II pag. 99.

8099 a. 3 erw. Kokotoni auf **Sansibar**. Gesch. 1897 von Dr. A. Voeltzkow, Berlin.

2. *Philothamnus dorsalis* (Bocage).

Boulenger, Cat. II pag. 101; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 58.

- 8101a. 4 Ste. Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1886 von Paul Hesse, Venedig.
8101b. Erw. **Ebendaher**. Gek. 1887 von demselben.

3. *Philothamnus thomensis* Bocage.

Boulenger, Cat. II pag. 101.

- 8101.1a. Erw. Insel **St. Thomé**, West-Afrika. Gesch. 1891 von Dr. J. von Bedriaga, Nizza.

Genus XLVIII. Gastropyxis Cope.

Boulenger, Cat. II pag. 103; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 62 und 1889 pag. 279 (*Hapsidophrys*).

- 8183a. Erw. **Sierra Leone**. Gef. 1873 vom Naturh. Museum in Offenbach (Main).
8103b. Erw. **Brass River**, West-Afrika. Gesch. 1880 von D. O. W. Nabert. hier.
8103c. Halbw. Cabinda, **Unter-Congo**. Gek. 1885 von Paul Hesse, Venedig.
8103d. 2 erw. Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von demselben.
8103e. Erw. Odumase, **Ost-Goldküste**. Gesch. 1892 von Hans Simon, Stuttgart.
8103f. Halbw. **Kamerun**. Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz, Berlin.

Genus XLIX. Thrasops Hallow.

1. *Thrasops flavigularis* (Hallow.).

Boulenger, Cat. II pag. 105; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1889 pag. 279 (var. *pustulata*).

- 8105a. Erw. Povo Nemlao bei Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1886 von Paul Hesse, Venedig.
8105b. 2 erw. (typ. u. var. *pustulata* Buchh. Pts.), **Ebendaher**. Gek. 1887 von demselben.

Genus L. Leptophis Bell.

1. *Leptophis occidentalis* (Gthr.).

Boulenger, Cat. II pag. 111, Taf. 3, Fig. 2.

- 8111.1a Erw. San José, **Costa Rica**. Gesch. 1893 von Carl Fleischmann, Guatemala.

2. *Leptophis liocercus* (Wied).

Boulenger, Cat. II pag. 113.

- 8113a. Jung. **Trinidad.** Gesch. 1879 von Karl Knoblauch, hier.
8113b. 2 erw. (Rüppell, Cat. III T 1a—b als *Dendrophis ahaetulla*). **Ilheos, Brasilien.** Gesch. 1838 von Gebr. Koch, hier.
8113c. Erw. (Rüppell, Cat. III T 1c als *D. ahaetulla*). **Surinam.** Gesch. 1836 von Dr. med. Sichel, hier.
8113d. 4 Ste. (Rüppell, Cat. III T 1d—g als *D. ahaetulla*). **Brasilien.** Alte Sammlung 1845.
8113e. Erw. **Trinidad.** Gesch. 1893 von F. W. Ulrich und R. R. Mole. Port of Spain.
8113f. Erw. (mit verletztem Kopf). Remedios in 600 m. **U. S. Columbia.** Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel, Jena.

Genus LI. Uromacer D. B.

1. *Uromacer catesbyi* (Schlg.).

Boulenger, Cat. II pag. 115.

- 8115a. Erw. Cap Haytien. **Haiti.** Gek. 1888 vom Naturh. Institut Linnaea, Berlin.

2. *Uromacer oxyrrhynchus* D. B.

Boulenger, Cat. II pag. 116.

- 8117a. 2 erw. Cap Haytien. **Haiti.** Gek. 1888 vom Naturh. Institut Linnaea, Berlin.

Genus LII. Hypsirhynchus Gthr.

1. *Hypsirhynchus ferox* Gthr.

Boulenger, Cat. II pag. 117. Taf. 6, Fig. 1.

- 8118a. Erw. Cap Haytien. **Haiti.** Gek. 1888 vom Naturh. Institut Linnaea, Berlin.
8118b. Erw. **San Domingo.** Gek. 1893 vom Naturhist. Verein in Augsburg.

Genus LIII. Dromicus Bibr.

1. *Dromicus chamissoi* (Wgm.).

Boulenger, Cat. II pag. 119.

- 8119a. Erw. **Chile.** Gesch. 1874 von Bergingenieur Eich. Geismidda (Oberhessen).

2. *Dromicus antillensis* (Schlg.).

Boulenger, Cat. II pag. 123.

- 8123 a. Erw. u. jung. **St. Thomas**. Gesch. 1881 von Karl Knoblauch, hier.
8123 b. 3 erw. **Ebendaher**. Gesch. 1882 von demselben.

3. *Dromicus rufiventris* D. B.

Boulenger, Cat. II pag. 124.

- 8124 a. Erw. (Rüppell, Cat. III P 8 a als *Herpetodryas* sp.). **Westindien**.
Alte Sammlung 1845.

4. *Dromicus anomalus* (Pts.).

Boulenger, Cat. II pag. 125.

- 8125 a. Halbw. Cap Haytien, **Haiti**. Gek. 1888 vom Naturh. Institut Linnaea.
Berlin.

Genus LIV. Liophis Wgl.

1. *Liophis taeniurus* Tschudi.

Boulenger, Cat. II pag. 130.

- 8130 a. Erw. Altaquer bei Barbacoas, **Südwest-U. S. Columbia**. Gesch. 1885
von Konsul F. C. Lehmann, Popayán.

2. *Liophis albiventris* Jan.

Boulenger, Cat. II pag. 130.

- 8130,1 a. Jung. **Peru**. Gesch. 1863 von Feldmarschall Philipp Braun, Lima.
8130,1 b. Erw. **Ecuador**. Gek. 1877 von Hamburg.

3. *Liophis poecilogyrus* (Wied).

Boulenger, Cat. II pag. 131.

- 8132 a. 3 erw. (Rüppell, Cat. III G 6 c—e als *Coronella merremi*). **Buenos Aires**.
Gesch. 1840 von W. A. Bernus, hier.
8132 b. 3 erw., 6 jung. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gesch. 1872—
1886 von Oberlehrer Dr. Finger, hier. und Prof. Dr. H. von Ihering,
daselbst.
8132 c. 2 erw., 2 jung. **São Paulo**, Brasilien. Gek. 1881 von Josef
Duschaneck, hier.
8132 d. 2 Junge. **Buenos Aires**. Gesch. 1886 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
8132 e. Halbw. **Süd-Amerika**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.
8132 f. 2 Junge (Rüppell, Cat. III G 5 a—b als *C. doliata*). **Brasilien**. Gesch.
1840 von Schöff Dr. Carl von Heyden, hier.
8132 g. 3 halbw. (Rüppell, Cat. III G 5 c—e als *C. doliata*). **Süd-Brasilien**.
Gesch. 1828 vom Herzog von Leuchtenberg.

- 8132h. 3 erw. (Rüppell, Cat. III G 5f—h als *C. dolia*). **Süd-Brasilien.**
Gesch. 1838 von Schöff Dr. Carl von Heyden, hier.
8132i. Jung. **São Paulo,** Brasilien. Gek. 1876 von Prof. Carlos Müller,
daselbst.
8132k. Erw. **Ebendaher.** Gesch. 1890 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
8132l. Erw. **Central-Brasilien.** Gesch. 1896 von Konsul Guido von Schröter,
San José (Costa Rica).

4. *Liophis melanotus* (Shaw).

Boulenger, Cat. II pag. 134.

- 8134a. Erw. **Trinidad.** Gesch. 1893 von F. W. Ulrich und R. R. Mole. Port
of Spain.
8134b. Erw. u. 3 jung. **Carácas, Venezuela.** Gek. 1897 von Ingen. Müller,
hier.

5. *Liophis almadensis* (Wgl.).

Boulenger, Cat. II pag. 134; Boettger, Zeitschr. f. d. ges.
Naturw. Bd. 58. 1885 pag. 228.

- 8135a. 6 Ste. **São Paulo,** Brasilien. Gek. 1876—81 von Prof. Carlos Müller
und Josef Duschaneck, daselbst.
8135b. 3 erw. **Rio Grande do Sul,** Süd-Brasilien. Gek. 1888 von Prof. Dr.
H. von Ihering, daselbst.
8135c. Erw. **Matogrosso,** Brasilien. Gesch. 1893 von Dir. Dr. Carlos Berg,
Buenos Aires.
8135d. Erw. Stadt **Rio Grande do Sul.** Gek. 1886 von Prof. Dr. H. von
Ihering, daselbst.
8135e. 2 erw. **Central-Brasilien.** Gesch. 1896 von Konsul Guido von
Schröter, San José (Costa Rica).

6. *Liophis typhlus* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 136; RenÉ. Mus. Senck. Bd. 1. 1834
pag. 144 (*Coluber albiventris*); Boettger, Zeitschr. f. d. ges.
Naturw. Bd. 58. 1885 pag. 229.

- 8136a. Jung (Rüppell, Cat. III O 16a als *C. albiventris* Rss.). **Brasilien.**
Alte Sammlung 1845.
8136b. Erw. **Brasilien.** Gek. 1877 von Hamburg.
8136c. Erw. **Central-Brasilien.** Gesch. 1896 von Konsul G. von Schröter,
San José (Costa Rica).

7. *Liophis epinephelus* Cope.

Boulenger, Cat. II pag. 137.

- 8136.1a. Erw. **Cuenca, Ecuador.** Gesch. 1896 von Konsul F. C. Lehmann,
Popayán.

8. *Liophis reginae* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 137.

- 8137 a. Erw. Puerto Cabello, **Venezuela**. Gesch. 1893 von Konsul F. Mauß, daselbst.
- 8137 b. Erw. Valencia, **Venezuela**. Gesch. 1894 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.
- 8137 c. Erw. **Trinidad**. Gesch. 1893 von denselben.
- 8137 d. Jung (Rüppell, Cat. III G 3 f als *Coronella*). **Surinam**. Gesch. 1832 von Dr. med. Sichel, hier.
- 8137 e. Jung. **Trinidad**. Gesch. 1894 von F. W. Urich und R. R. Mole.
- 8137 f. Erw. (Rüppell, Cat. III G 3 a als *Coronella*). **Surinam**. Gesch. 1832 von Dr. med. Sichel, hier.
- 8137 g. 4 erw. (Rüppell, Cat. III G 3 b—c als *Coronella*). **Brasilien**. Alte Sammlung 1845.

9. *Liophis juliae* (Cope).

Boulenger, Cat. II pag. 139.

- 8139 a. Erw. Insel **Dominica**, Westindien. Get. 1893 vom British Museum (N. H.), London.

10. *Liophis parvifrons* (Cope).

Boulenger, Cat. II pag. 141.

- 8141 a. Erw. u. halb. Cap Haytien, **Haiti**. Gek. 1888 vom Naturh. Institut Linnaea, Berlin.

11. *Liophis melanostigma* (Wgl.).

Boulenger, Cat. II pag. 142.

- 8142 a. Kopf. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gek. 1886 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.

Genus LV. Xenodon Boie.

1. *Xenodon colubrinus* Gthr.

Boulenger, Cat. II pag. 146.

- 8146 a. Halb. (Rüppell, Cat. III H 2 a als *Ophis rhabdocephalus*). **Brasilien**. Alte Sammlung 1845.

2. *Xenodon newwiedi* Gthr.

Boulenger, Cat. II pag. 148.

- 8148 a. Erw. **Rio de Janeiro**. Gesch. 1897 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

3. *Xenodon severus* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 149.

- 8149 a. Halbw. Puerto Cabello, **Venezuela**. Gesch. 1894 von Konsul F. Mauß, daselbst.
8149 b. Jung. Sorata, **Bolivia**. Gesch. 1894 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.
8149 c. Erw. **Surinam**. Gek. 1846 von Stuttgart.
8149 d. Jung. **Puerto Cabello**. Gesch. 1893 von Konsul F. Mauß, daselbst.
8149 e. Erw. (Rüppell, Cat. III H 1a als *Ophis*). **Surinam**. Gesch. 1839 von Dr. med. Sichel, hier.
8149 f. Erw. Carácas, **Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller, hier.

4. *Xenodon merremi* (Wgl.).

Boulenger, Cat. II pag. 150; Boettger, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. 58, 1885 pag. 232 (*severus*).

- 8150 a. Halbw. **São Paulo**, Brasilien. Gesch. 1890 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
8150 b. 3 erw., 1 jung. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gek. 1886—88 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.
8150 c. 2 erw. **São Paulo**. Gek. 1876 von Prof. Carlos Müller, daselbst.
8150 d. 2 halbw. **Ebendaher**. Gek. 1881 von Josef Duschaneck, hier.
8150 e. Erw. **Corrientes**, Rep. Argentina. Gesch. 1893 von Dir. Dr. Carlos Berg, Buenos Aires.
8150 f. Halbw. **Central-Brasilien**. Gesch. 1896 von Konsul Guido von Schröter, San José (Costa Rica).

Genus LVI. Lystrophis Cope.

1. *Lystrophis dorbignyi* (D. B.).

Boulenger, Cat. II pag. 151; Boettger, Zeitschrift f. d. ges. Naturw. Bd. 58, 1885 pag. 233 (*Heterodon*).

- 8151 a. Erw. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gesch. 1873 von Oberlehrer Dr. Finger, hier.

2. *Lystrophis histricus* (Jan).

Boulenger, Cat. II pag. 152.

- 8152 a. Erw. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gesch. 1873 von Oberlehrer Dr. Finger, hier.

Genus LVII. Heterodon Latr.

1. *Heterodon platyrrhinus* Latr.

Boulenger, Cat. II pag. 155.

- 8155 a. 4 Ste. (Rüppell, Cat. III J 1 b—e). **Verein. Staaten.** Gesch. 1836 von Dr. med. Reuß und W. Engelmann, St. Louis.
8155 b. 3 halb. **Verein. Staaten.** Gesch. 1874 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.
8155 c. Erw. ♀. **Texas.** Gesch. 1897 von Dr. med. Arthur Hanau, St. Gallen.

2. *Heterodon simus* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 156.

- 8156 a. Erw. (Rüppell, Cat. III J 1 a als *platyrrhinus*). **Verein. Staaten.** Gesch. 1840 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.

Genus LVIII. Aporophis Cope.

1. *Aporophis lineatus* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 158.

- 8158 a. 3 Ste. (Rüppell, Cat. III P 5 a—c als *Herpetodryas*). **Brasilien.** Alte Sammlung 1845.
8158 b. Erw. (Rüppell, Cat. III P 5 d als *Herpetodryas*). **Surinam.** Gesch. 1836 von Dr. med. Siebel, hier.
8158 c. Halb. **Rio Branco.** Gek. 1897 von Georg Hübner, Dresden.
8158 d. 2 halb. Baranquilla im Magdalenathal. **U.S. Columbia.** Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel, Jena.

2. *Aporophis flavifrenatus* (Cope).

Boulenger, Cat. II pag. 158.

- 8158.1 a. Erw. **Rio Grande do Sul,** Süd-Brasilien. Gek. 1886 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.

Genus LIX. Rhadinaea Cope.

1. *Rhadinaea breviceps* (Cope).

Boulenger, Cat. II pag. 164.

- 8164 a. Erw. Inirida am Alto Orenoco. **Süd-Venezuela.** Gek. 1895 von Georg Hübner, Dresden.

2. *Rhadinaea anomala* (Gthr.).

Boulenger, Cat. II pag. 165.

- 8165 a. Erw. ♂. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gesch. 1873 von Oberlehrer Dr. Finger, hier.
8165 b. Erw. La Plata, Rep. **Argentina**. Gesch. 1894 von Dr. Jean Valentin, Buenos Aires.

3. *Rhadinaea sagittifera* (Jan).

Boulenger, Cat. II pag. 165.

- 8165.1 a. Erw. Buenos Aires, Rep. **Argentina**. Get. 1891 vom Naturh. Mus. Offenbach.

4. *Rhadinaea cobella* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 166.

- 8166 a. Erw. **Trinidad**. Gesch. 1895 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.
8166 b. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1893 von denselben.
8166 c. 3 Junge (Rüppell, Cat. III G 4 d—f als *Coronella*). **Surinam**. Gesch. 1838 von Dr. med. Sichel, hier.
8166 d. 3 erw. (Rüppell, Cat. III G 4 a—c als *Coronella*). **Surinam**. Gesch. 1838 von demselben.
8166 e. 3 erw. (Rüppell, Cat. III G 4 g—i als *Coronella*). **Surinam**. Gesch. 1838 von demselben.

var. *taeniogastra* Jan.

Boulenger, l. c. pag. 167.

- 8167 a. 2 Junge. **U. S. Columbia**. Gesch. 1894 von Konsul F. C. Lehmann, Popayán.

5. *Rhadinaea merremi* (Wied).

Boulenger, Cat. II pag. 168; Reuß, Mus. Senck. Bd. 1. 1834 pag. 145 Taf. 8, Fig. 1 (*Coluber bicolor*).

- 8168 a. 2 erw. (Rüppell, Cat. III G 6 a—b als *Coronella*). **Brasilien**. Get. 1838 von Graf Jenison, Heidelberg.
8168 b. Erw. **Brasilien**. Gesch. 1877 von Prof. Dr. Ferdinand Richters, hier.
8168 c. 4 Ste. **São Paulo**, Brasilien. Gek. 1876 und 1881 von Prof. Carlos Müller, daselbst, und Josef Duschaneck, hier.
8168 d. 2 erw. (Originale von *Coluber bicolor* Rss.; Rüppell, Cat. III G 5* a—b als *Coronella doliata* var.). Ilheos, **Brasilien**. Gesch. 1830 von Gebr. Koch, hier.

6. *Rhadinaea fusca* (Cope).

Boulenger, Cat. II pag. 169.

- 8169 a. Erw., halbw. n. 2 Junge. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gek. 1886 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.

7. *Rhadinaea jaegeri* (Gthr.).

Boulenger, Cat. II pag. 170, Taf. 7, Fig. 3.

- 8170 a. 2 erw. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gek. 1888 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.
8170 b. 2 erw. **Ebendaher**. Gek. 1886—87 von demselben.
8170 c. 2 erw. **São Paulo**, Brasilien. Gek. 1881 von Josef Duschaneck, hier.

8. *Rhadinaea affinis* (Gthr.).

Boulenger, Cat. II pag. 172.

- 8172.1 a. Kopf u. halbw. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gek. 1886 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.

9. *Rhadinaea undulata* (Wied).

Boulenger, Cat. II pag. 174; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 195 (*Coronella taeniolata*).

- 8174.1 a. Erw. Mapiri, Nebenfluß des oberen Beni. **Bolivia**. Gesch. 1888 von Ferdinand Emmel, Arequipa.

10. *Rhadinaea occipitalis* (Jan).

Boulenger, Cat. II pag. 175; Boettger, Zool. Anzeiger 1891 pag. 395 (*Dromicus miolepis*).

- 8175.1 a Erw. **Santos**, Nord-Brasilien. Gek. 1884 vom Naturh. Museum in Hamburg.
8175.1 b. Erw. **Central-Brasilien**. Gesch. 1896 von Konsul Guido von Schröter, San José (Costa Rica).
8175.1 c. Erw. Sorata, **Bolivia**. Gesch. 1897 von Prof. Dr. Oskar Boettger, hier.

11. *Rhadinaea vittata* (Jan).

Boulenger, Cat. II pag. 178.

- 8178 a. Halbw. Vera Cruz, **Mexiko**. Gek. 1877 von Hamburg.

12. *Rhadinaea kinkelini* n. sp. *)

8178,1a. Erw. Matagalpa, Nicaragua. Gesch. 1897 von Apotheker Adolf Kinkelin, Nürnberg.

Genus LX. *Urotheca* Bibr

1. *Urotheca bicincta* (Herm.).

Boulenger, Cat. II pag. 184.

8184a. Erw. ♂. Weg von Guaramaco nach San Fernando, Alto Orenoco, Süd-Venezuela. Gek. 1895 von Georg Hübner, Dresden.

*) Nächstverwandt der mexikanischen *Rh. vittata* (Jan), aber mit kürzerem Schwanz und anderer Färbung. Außerdem sind die vorderen Kinn schilder viel länger als die hinteren, was bei *Rh. vittata* umgekehrt ist. Färbung ähnlich der *Rh. godmani* (Gthr.) aus Guatemala. — Oberkieferzähne 16, nach hinten allmählich größer werdend, die hinteren nicht zusammengedrückt. Auge ziemlich klein. Schnauze nicht hervorragend; Rostrale anderthalbmal so breit wie hoch, von oben eben noch sichtbar. Internasalsutur kurz, kaum halb so lang wie die Praefrontalsutur; Frontale so lang wie sein Abstand vom Schmanzenende, etwa zwei Drittel so lang wie die Parietalen. Frenale etwas länger als hoch; ein Praeoculare, das das Frontale nicht erreicht; 2 Postocularen; Temporalen 1 + 2. Acht Supralabialen, das vierte und fünfte ans Auge tretend, das sechste am höchsten. Von den Infralabialen treten vier an die vorderen Kinn schilder, die sehr erheblich länger sind als die hinteren.

Schuppenformel: Squ. 17; G. ³ a. V. 146. A. ¹ 1. Sc. ⁷² 72 + 1.

Braun mit dunklerer, eine Schuppenreihe breiter, an der Schnauze beginnender Rückenlinie und je zwei schmalen, ebenfalls dunkeln Seitenlinien. Die obere Seitenlinie wird nach oben von einem hellen, eine halbe Schuppenreihe breiten Längsstreifen begrenzt. Ein schmales gelbliches Querband, das nur in der Mitte durch den dunkeln Spinalstreifen unterbrochen ist, liegt quer über dem Nacken. Das Rostrale ist weißgelb mit einer \wedge -förmigen schwarzen Makel; die Lippenschilder sind, mit Ausnahme des letzten, ganz dunkeln, weißgelb mit breiten schwarzen Säumen. Auf den Parietalen zeigen sich zwei dicht bei einander stehende weiße Fleckchen. Die Unterseite ist scharf abgesetzt lehmgelb, nur die Schuppen der Kopfunterseite zeigen grauliche Schuppenränder; die seitlichen Säume der Ventralen sind mit einer feinen graulichen Längslinie, wie eine solche auch zwischen den beiden dunkeln Seitenstreifen zu beobachten ist, gezeichnet.

Maße: Totallänge 358, Schwanzlänge 102 mm.

Fundort: Matagalpa, Nicaragua, nur in dem schön erhaltenen Stück bekannt, das wir von Herrn Apotheker Adolf Kinkelin in Nürnberg, dem zu Ehren die Art benannt wurde, zum Geschenk erhalten haben.

Genus LXI. Fleischmannia nov.

Oberkiefer mit 12 schlanken, bis zum letzten in gleichen Abständen stehenden Zähnen, die letzten zwei etwas größer, cylindrisch, ungefurcht. Unterkiefer mit 17 Zähnen, die vordersten drei etwas kleiner, die mittleren allmählich größer werdend, die der zweiten Kieferhälfte am kleinsten, merklich an Größe abnehmend. — Kopf breiter als der Hals, in der Wangengegend deutlich angeschwollen. Auge ziemlich groß, mit runder Pupille. Obere Kopfschilder regelmäßig: Nasenloch seitlich, in der Vorderhälfte eines großen, einfachen Nasale. Ein Frenale fehlt. Körper mäßig verlängert, walzenförmig; Schuppen glatt, ohne Endporen, in 17 Reihen; Ventralen verrundet. Schwanz lang; Subcaudalen in zwei Reihen. — Central-Amerika.

Verwandt den Gattungen *Trimetopon* Cope und *Hydromorphus* Pts., aber mit doppeltem Praefrontale. Ihre Physiognomie erinnert, abgesehen von der runden Pupille, etwas an die von *Psammodynastes*.

Hierher als einzige Art:

1. *Fleischmannia obscura* n. sp. *)

8185 a. Erw. San José, **Costa Rica**. Gesch. 1893 von Carl Fleischmann, Guatemala.

*) Kopf oben flach, zwischen den Augen leicht ausgehöhlt. Schnauze sehr kurz, nicht ganz anderthalbmal so lang wie das Auge, kegelförmig verrundet, etwas vorgezogen und schief abgestutzt, mit deutlichem Canthus rostralis. Auge etwas größer als sein Abstand von der Maulspalte. Rostrale etwas breiter als hoch, von oben kaum sichtbar; Internasalen $\frac{2}{3}$ so lang wie die Praefrontalen; Frontale doppelt so lang wie in der Mitte breit, länger als sein Abstand von der Schnauzenspitze, kürzer als die Parietalen. Ein Frenale fehlt; ein Praeoculare, das die Oberseite des Kopfes nicht oder kaum erreicht; Temporalen 1 + 2. 7 Supralabialen, von denen das dritte und vierte ans Auge stoßen. 4 Infralabialen in Berührung mit den vorderen Kinnschildern, die wesentlich kürzer sind als die hinteren.

Schuppenformel: Squ. 17; G. 2_1 , V. 123, A. 1_1 , Sc. $^{79}_{79} + 1$.

Oberseits dunkler, unterseits heller lederbraun, die Bauch- und Schwanzschilder mit dunkleren Vordersäumen und Kehle und Halsgegend außerdem noch mit undeutlichen, dunkleren Längszeichnungen. Hintere Kopfhälfte heller, ledergelb, gegen das Braun des Nackens ziemlich scharf \wedge -förmig abgegrenzt. Vom Auge zieht gegen die Temporalgegend ein breiter, dunkelbrauner, beiderseits hell eingefasster, schiefer Streifen.

Maße: Totallänge 302, Schwanzlänge 99 mm.

Fundort: San José, Rep. **Costa Rica**, nur in einem tadellosen Stücke von Herrn Carlos Fleischmann in Guatemala, dem zu Ehren ich die Gattung benannt habe, gesammelt und eingesandt.

Genus LXII. Hydrops Wgl.

1. *Hydrops triangularis* (Wgl.).

Boulenger, Cat. II pag. 187.

- 8187 a. Jung (schlecht gehalten). Ciudad Bolivar, **Venezuela**. Gesch. 1894 von Apotheker Theod. Lüning daselbst durch Apotheker Dr. Aug. Jassoy, hier.
- 8187 b. Erw. u. halbw. (Rüppell, Cat. III X 5 a—b als *Homalopsis martii*). **Brasilien**. Alte Sammlung 1845.
- 8187 c. Erw. **Surinam**. Gesch. 1893 von F. W. Ulrich und R. R. Mole, Port of Spain.

Genus LXIII. Coronella Laur.

1. *Coronella austriaca* Laur.

Boulenger, Cat. II pag. 191; Boettger, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. 49. 1877 pag. 286 und in Radde's Faun. u. Flora Casp.-Geb. 1886 pag. 67.

- 8191 a. Erw. **Jugenheim** an der Bergstraße. Gesch. 1894 von Kaufm. Herrn. Wichmann, hier.
- 8191 b. Erw. **Soden** im Taunus. Gesch. 1844 von Geh. Hofrat Dr. med. Sal. Stiebel, hier.
- 8191 c. Erw. u. halbw. **Altkönig** im Taunus. Gesch. 1876 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
- 8191 d. Erw. **Prov. Sachsen**. Gesch. 1890 von demselben.
- 8191 e. Halbw. **Thüringen**. Gesch. 1871 von Dir. Dr. Theod. Geyler, hier.
- 8191 f. Erw. **Orb**, Kr. Gehlhäusen, Hessen-Nassau. Gesch. 1891 von Oberlehrer J. Blum, hier.
- 8191 g. Erw. Rüsseburg bei **Thiengen**, Kr. Waldshut, Baden. Gesch. 1891 von demselben.
- 8191 h. Erw. **Kobylno**, Oberschlesien. Gesch. 1880 von Otto Goldfuß, Halle (Saale).
- 8191 i. 2 erw., 3 jung (Rüppell, Cat. III X 1 a—c). **Tannus**. Gesch. 1835 von Schöff Dr. Carl von Heyden, hier.
- 8191 k. Erw. **Weinheim** a. d. Bergstraße. Gesch. 1886 von Albrecht Weis, hier.
- 8191 l. Erw. **Jüterbogk**, Prov. Brandenburg. Gesch. 1891 von Oberlehrer J. Blum, hier.
- 8191 m. 2 erw. Richisan im **Klönthal**, Cr. Glarus, Schweiz. Gesch. 1891 von demselben.
- 8191 n. Erw. ♀, 3 Eier, 2 Junge. **Frankfurter Wald**. Gesch. 1849 von G. Koch III, hier.
- 8191 o. Erw. **Falkenstein** im Taunus. Gesch. 1893 von Karl Henrich, hier.
- 8191 p. Halbw. Brand. **Sächsische Schweiz**. Gesch. 1886 von Albr. Weis.
- 8191 q. Halbw. Geltschberg bei Leitmeritz. **Nord-Böhmen**. Gesch. 1886 von demselben.

- 8191 r. Jung. Geierkogel in 800 m bei Graz, **Steiermark**. Gesch. 1886 von Hauptmann-Auditor Hipp. Tschapeck, Wien.
- 8191 s. Erw. Sudak, **Krim**. Gesch. 1883 von Staatsrat Otto Retowski, Theodosia.
- 8191 t. Erw. Coruña, **Nordwest-Spanien**. Gesch. 1880 von V. Lopez Seoane, daselbst.
- 8191 u. Erw. (var. *jitzingeri* Bonap.). Mte. Rosso bei Syrakus, **Sicilien**. Gesch. 1886 von Chefinspektor Carl Hirsch, Palermo.
- 8191 v. Erw. (dieselbe Varietät). Caltanissetta auf **Sicilien**. Gesch. 1886 von demselben.

2. *Coronella amaliae* (Bttgr.).

Boulenger, Cat. II pag. 193; Boettger, Zool. Anzeiger 1881 pag. 570 und Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 13, 1883 pag. 98. Taf. 1, Fig. 1 (*Rhinechis*).

- 8193 a. Erw. **Marokko**. Erh. 1881 von der IV. Ruppellreise Dr. med. W. Kobelt's, Schwanheim (Main).

3. *Coronella girondica* (Daud.).

Boulenger, Cat. II pag. 194; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 9, 1873 pag. 150 und 10. Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1869 pag. 55 (*laeris* var. *hispanica*).

- 8194 a. Erw. Alpujaras, **Süd-Spanien**. Gesch. 1868 von Major Dr. L. von Heyden, hier.
- 8194 b. Erw. Stadt **Marokko**. Gesch. 1872 von den Proff. Dr. Freih. C. von Fritsch und J. J. Rein.
- 8194 c. Erw. Tlemçen, **Algerien**. Erh. 1881 von der IV. Ruppellreise Dr. med. W. Kobelt's, Schwanheim (Main).
- 8194 d. Halbw. Montpellier, Dép. **Hérault**. Gesch. 1887 von Joh. von Fischer, daselbst.

4. *Coronella semiornata* Pts.

Boulenger, Cat. II pag. 195; Boettger, Zool. Anzeiger 1893 pag. 117 (*plumbiceps*).

- 8195 a. Erw. Moschi bei Tanga, **Kilima-Njaro**. Gesch. 1897 von Ingenieur Karl Nolte, daselbst.

5. *Coronella getula* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 197.

var. *sayi* Holbr.

Boulenger, l. c. pag. 198; Jan, Icon. Ophid. Lief. 14, Taf. 5, Fig. 2.

- 8198 a. Erw. **Südliche Verein. Staaten**. Gek. 1877 von Hamburg.

8198 b. Erw. **Ebendaher.** Gesch. 1891 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

8198 c. 2 erw. (Rüppell, Cat. III P 9 a—b als *Herpetodryas*?; Originale zu Jan's oben citierter Abbildung). **Ebendaher.** Gesch. 1838 von Dr. med. Reuß und W. Engelmann, St. Louis.

6. *Coronella triangulum* (Daud.).

Boulenger, Cat. II pag. 200.

8200 a. Halbw. Milwaukee. **Wisconsin.** Gesch. 1893 von Bierbrauer Rudolf Henrich, hier.

var. *collaris* Cope.

Boulenger, l. c. pag. 201; Jan, Icon. Ophid. Lief. 17, Taf. 1, Fig. 3 (*C. erimia*).

8201 a. Erw. **Südwestliche Verein. Staaten.** Gesch. 1891 von Dr. A. Zipperlen, Cincinnati (Ohio).

8201 b. 5 Ste. (Rüppell, Cat. III O 9 a—c als *Coluber guttatus*; Originale zu Jan's oben citierter Abbildung). **Verein. Staaten.** Gesch. 1838 von Dr. med. Reuß und W. Engelmann, St. Louis.

7. *Coronella micropholis* (Cope).

Boulenger, Cat. II pag. 203.

8203 a. Erw. (var. A). **Mexiko.** Gesch. 1877 von Prof. Dr. Ferdinand Richters, hier.

8. *Coronella punctata* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 206.

8206, 1 a. 3 erw. Milwaukee. **Wisconsin.** Gesch. 1893 von Bierbrauer Rudolf Henrich, hier.

Genus LXIV. *Drepanodon* Peracca.

1. *Drepanodon anomalus* (Jan).

Boulenger, Cat. III pag. 639; Boettger, Zool. Anzeiger 1891 pag. 347 (*Oxyrrhopus*).

8212 a. Jung. Sorata. **Bolivia.** Gesch. 1891 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.

8212 b. Halbw. **Ebendaher.** Gesch. 1895 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

Genus LXV. Cemophora Cope.

1. *Cemophora coccinea* (Blumenb.).

Boulenger, Cat. II pag. 214.

8214 a. Halbw. **Südliche Verein. Staaten.** Get. 1873 vom Naturh. Museum in Offenbach a. M.

8214 b. Erw. **Florida.** Gesch. 1896 von Dr. A. Zipperlen, Cincinnati (Ohio).

Genus LXVI. Simotes D. B.

1. *Simotes purpurascens* (Schlg.).

Boulenger, Cat. II pag. 218.

8218 a. Erw. Tenggergebirge in 1200 m. **Ost-Java.** Gek. 1891 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

var. *labuanensis* Gthr.

Boulenger, l. c. pag. 219.

8219 a. Erw. Klang in Selangor. **Malayische Halbinsel.** Gesch. 1895 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

8219 b. Erw. Atschin. **Nord-Sumatra.** Gek. 1880 von Konrad Kläsi, Zürich.

var. *trinotata* D. B.

Boulenger, l. c. pag. 219.

8219.1a. Erw. Sultanat Deli. **Nordost-Sumatra.** Gesch. 1879 von W. von Schouler, Wiesbaden.

2. *Simotes albocinctus* (Cant.).

Boulenger, Cat. II pag. 220.

8221 a. 2 erw. (var. C). Darjeeling. **Ost-Himalaya.** Get. 1891 vom British Museum (N. H.), London.

3. *Simotes formosanus* Gthr.

Boulenger, Cat. II pag. 222, Taf. 8, Fig. 2; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1894 pag. 133, Taf. 3, Fig. 2 (*hainanensis*).

8222 a. Erw. Insel **Hainan**, Süd-China. Gesch. 1894 von Bernh. Schmacker, Shanghai.

4. *Simotes octolineatus* (Schud.).

Boulenger, Cat. II pag. 224.

8224 a. Jung. Baramfluß in **Nord-Borneo.** Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

- 8224 b. Erw. Insel **Bangka**. Gek. 1881 von Konrad Kläsi. Zürich.
8224 c. Erw. (var. B). Sultanat Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1887 von Prof. Dr. Hans Schinz. Zürich.
8224 d. 3 erw. Buitenzorg. **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.
8224 e. Erw. (var. B). Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1891 von Dr. med. O. Benecke, daselbst.
8224 f. Erw. (var. B). **Ebendaher**. Gesch. 1894 von Wwe. H. Krämer, hier.
8224 g. Erw. (var. *meyerinki* Stöckh.). **Sulu-Inseln**. Get. 1897 vom Naturhist. Hofmuseum, Wien.

5. *Simotes phaenochalinus* Cope.

Boulenger, Cat. II pag. 225.

- 8225 a. Halbw. Prov. Nueva Ecija. **Luzon**. Gesch. 1880 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
8225 b. Erw. u. jung. Manila, **Luzon**. Get. 1891 von demselben.
8225 c. Halbw. Insel **Samar**. Gesch. 1897 von demselben.

6. *Simotes signatus* Gthr.

Boulenger, Cat. II pag. 226.

- 8226 a. Halbw. (schlecht gehalten). Sultanat Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1891 von Fritz Beyschlag, daselbst.

7. *Simotes arnensis* (Shaw).

Boulenger, Cat. II pag. 229.

- 8229.1 a. Halbw. **Ceylon**. Gek. 1889 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

Genus LXVII. Oligodon Boie.

1. *Oligodon bitorquatus* Boie.

Boulenger, Cat. II pag. 237.

- 8237 a. Halbw. (Varietät mit vier dunklen Rückenstreifen). Gunung Penglengan. **West-Java**. Gek. 1895 von Hans Fruhstorfer, Berlin.
8237 b. Erw. (Rüppell, Cat. III C 1 a als *Calamaria*). **Java**. Get. 1835 vom Rijksmuseum in Leiden.
8237 c. Halbw. **Java**. Gesch. 1876 von Major Dr. L. von Heyden, hier.
8237 d. Erw. Reich Jolo. **Java**. Gesch. 1868 von E. Lörsch, hier.
8237 e. Erw. Tenggergebirge in **Ost-Java**. Gek. 1891 von Hans Fruhstorfer, Berlin.
8237 f. Erw. (gestreifte Varietät). Gunung Tjisurupan, **West-Java**. Gek. 1893 von demselben.

2. *Oligodon everetti* Blgr.

Boulenger, Cat. II pag. 239, Taf. 11, Fig. 1.

8239.1a. Erw. Banjarmasin, **Südost-Borneo**. Gek. 1894 von Wwe. H. Krieb. hier.

3. *Oligodon templetoni* Gthr.

Boulenger, Cat. II pag. 241.

8241.1a. Erw. **Ceylon**. Gesch. 1846 von H. Worms. hier.

4. *Oligodon sublineatus* D. B.

Boulenger, Cat. II pag. 242.

8242a. Erw. **Ceylon**. Gek. 1889 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

8242b. 6 Ste. **Ebendaher**. Gesch. 1846 von H. Worms, hier.

8242c. Jung. Kandy, **Ceylon**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

5. *Oligodon subgriseus* D. B.

Boulenger, Cat. II pag. 243.

8243a. Erw. **Süd-Ceylon**. Gek. 1889 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

6. *Oligodon taeniurus* F. Müll.

Boulenger, Cat. II pag. 360.

8245.1a. Erw. Rurukan, **Celebes**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

8245.1b. Halbw. Minahassa, **Celebes**. Erh. 1895 von derselben.

7. *Oligodon melanocephalus* (Jan).

Boulenger, Cat. II pag. 246; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1878—79 pag. 60 (*Homalosoma*) und 1879—80 pag. 139 (*Rhynchocalamus*).

8246a. Erw. u. 3 Junge. Jaffa, **Syrien**. Gesch. 1879 von Major Dr. L. von Heyden, hier.

8246b. Jung. Haiffa, **Syrien**. Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.

Genus LXVIII. Leptocalamus Gthr.

1. *Leptocalamus torquatus* Gthr.

Boulenger, Cat. II pag. 250.

8250a. Erw. Baranquilla, **U. S. Columbia**. Gesch. 1894 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

Genus LXIX. Simophis Pts.

1. *Simophis rhinostoma* (Schlg.).

Boulenger, Cat. II pag. 253.

- 8253 a. Erw. (Supralabialen 8—8, das 4. und 5. ans Auge tretend). **Lagoa Santa**, Brasilien. Gesch. 1886 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
8253 b. Erw. (Rüppell. Cat. III K 1 a als *Rhinostoma proboscideum*). **Brasilien**.
Get. 1830 vom Naturh. Hofmuseum in Wien.

Genus LXX. Contia B. Gir.

1. *Contia aestiva* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 258.

- 8258 a. 2 erw. (Rüppell. Cat. III P 2 a—b als *Herpetodryas*). **Verein. Staaten**.
Gesch. 1838 von Dr. med. Reuß und W. Engelmann, St. Louis.

2. *Contia vernalis* (Harl.).

Boulenger, Cat. II pag. 258.

- 8258, 1 a. Erw. **Baltimore**. Get. 1873 vom Naturh. Museum in Offenbach (Main).
8258, 1 b. Erw. u. jung. Milwaukee. **Wisconsin**. Gesch. 1893 von Bierbrauer
Rudolf Henrich, hier.

3. *Contia decemlineata* (D. B.).

Boulenger, Cat. II pag. 260; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges.
1879—80 pag. 144 (*Ablabes modestus* vars.).

- 8260 a. 3 Ste. **Jerusalem**. Gesch. 1880 von Hans Simon, Stuttgart.
8260 b. 4 Ste. (var. *inornata* Jan). **Ebendaher**. Gesch. 1880 von demselben.
8260 c. 4 Ste. (2 typ., 2 var. *inornata* Jan). **Ebendaher**. Gesch. 1881 von
demselben.

4. *Contia collaris* (Ménétr.).

Boulenger, Cat. II pag. 260; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges.
1890 pag. 294 (*Ablabes modestus*) und Sitz.-Ber. Akad. Berlin 1888
pag. 171 und Ber. Senck. Nat. Ges. 1892 pag. 147 (*Cyclophis
modestus*).

- 8260, 1 a. Erw. u. halbw. Brumána im **Libanon**. Gesch. 1881 von Hans Simon,
Stuttgart.
8260, 1 b. Erw. Südost-Karabagh, **Russisch-Armenien**. Erh. 1890 von Dr.
Jean Valentin's Reise.
8260, 1 c. Halbw. Kodshory bei Tiflis, **Transkaukasien**. Erh. 1890 von
derselben.

var. *semimaculata* Bttgr.

Boulenger, l. c. pag. 261; Boettger, 15./16. Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1876 pag. 58. Taf. (*Ablabes modestus* var.).

8261 a. Erw. (Original). **Chios**. Gesch. 1862 von Hofr. Dr. med. Pauli, hier.

var. *punctatolineata* Bttgr.

Boulenger, l. c. pag. 261; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1892 pag. 147 (*Cyclophis modestus* var.).

8261.1 a. Erw. (Original). **Russisch-Armenien**. Erh. 1890 von der Reise Dr. Jean Valentin's in den Karabagh.

5. *Contia rothi* (Jan).

Boulenger, Cat. II pag. 262; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1879—80 pag. 143 (*Ablabes*).

8262.2 a. Erw. u. jung. Haiffa, **Syrien**. Gesch. 1880 von Hans Simon, Stuttgart.

8262.2 b. Erw. u. jung. **Jerusalem**. Gesch. 1881 von demselben.

6. *Contia coronella* (Schlg.).

Boulenger, Cat. II pag. 264; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1879—80 pag. 140 (*Ablabes*).

8264 a. Jung. **Damaskus**, Syrien. Gesch. 1884 von Hans Simon, Stuttgart.

8264 b. 3 erw., 1 jung. Haiffa, **Syrien**. Gesch. 1881 von demselben.

8264 c. Erw. u. jung. **Beirut**, Syrien. Gek. 1878 von W. Schlüter, Halle (Saale).

8264 d. Halbw. **Syrien**. Get. 1897 vom Naturhist. Hofmuseum, Wien.

7. *Contia nasus* (Gthr.).

Boulenger, Cat. II pag. 268.

8269 a. Erw. Jalisco in 8500'. **Mexiko**. Get. 1893 vom British Museum (N. H.), London.

Genus LXXI. Homalosoma Wgl.

1. *Homalosoma lutrix* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 274.

8274 a. Erw. **Kapland**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.

8274 b. 4 erw. (Rüppell, Cat. III C 2 a—c als *Calamaria arctiventris*). **Kapland**. Get. 1835 vom Rijksmuseum, Leiden.

Genus LXXII. Ablabes D. B.

1. *Ablabes herminae* Bttgr.

Boulenger, Cat. III pag. 643; Boettger, Zool. Anzeiger 1895 pag. 277 und Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1895 pag. 110.

8277 a. Erw. Yaeyama auf Mijakoshima. **Südliche Liukiu-Inseln.** Gesch. 1895 von Bernhard Schmacker, Shanghai.

2. *Ablabes semicarinatus* (Hallow.).

Boulenger, Cat. II pag. 278.

8278 a. 2 erw. Yaeyama auf Mijakoshima. **Südliche Liukiu-Inseln.** Gesch. 1895 von Bernhard Schmacker, Shanghai.

3. *Ablabes major* (Gthr.).

Boulenger, Cat. II pag. 279.

8279 a. 3 erw. Lüshan-Gebirge bei Kiukiang. **Ost-China.** Get. 1889 von Bernhard Schmacker, Shanghai.

4. *Ablabes tricolor* (Schlg.).

Boulenger, Cat. II pag. 281.

8281.1a. Erw. Tenggergebirge in 1200 m. **Ost-Java.** Gek. 1891 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

8281.1b. Erw. Pontianak, **West-Borneo.** Gesch. 1893 von Baron Albert von Reinach, hier.

5. *Ablabes philippinus* Bttgr.

Boettger, Zoolog. Anzeiger 1897 pag. 164.

8281.2a. Erw. Insel Culion, **Calamianes,** Philippinen. Gesch. 1897 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila, und Otto Koch, Cebu.

8281.2b. Erw. Insel **Samar,** Philippinen. Gesch. 1897 von denselben.

6. *Ablabes rappi* Gthr.

Boulenger, Cat. II pag. 282.

8282.1a. Erw. Darjeeling, **Ost-Himalaya.** Get. 1891 vom British Museum (N. H.), London.

7. *Ablabes baliodirus* (Boie).

Boulenger, Cat. II pag. 283.

8283 a. Erw. Buitenzorg. **West-Java.** Gesch. 1890 von Dr. A. Strubell, Bonn.

8283 b. Erw. ♂. Tenggergebirge in 1200 m. **Ost-Java.** Gek. 1891 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

- 8283 c. Erw. **West-Java**. Gek. 1893 von demselben.
8283 d. Erw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1891 von Fritz Bey-
schlag, daselbst.

8. *Ablabes longicauda* Pts.

Boulenger, Cat. II pag. 284.

- 8284.1 a. Erw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1894 von Wwe. H.
Krämer, hier.

Genus LXXIII. Grayia Gthr.

1. *Grayia smythi* (Leach).

Boulenger, Cat. II pag. 287, Taf. 13, Fig. 3; Boettger, Ber.
Senck. Nat. Ges. 1887—88 pag. 51 (*triangularis*).

- 8286 a. Jung. Boma, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.
8286 b. Erw. Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von demselben.

Genus LXXIV. Abastor Gray.

1. *Abastor erythrogrammus* (Daud.).

Boulenger, Cat. II pag. 290.

- 8290 a. Erw. **Verein. Staaten**. Gesch. 1874 von der Neuen Zoolog. Gesell-
schaft, hier.

Genus LXXV. Petalognathus D. B.

1. *Petalognathus nebulata* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 293; Jan. Icon. Ophid. Lief. 37, Taf. 5.
Fig. 3 (*Leptognathus*).

- 8293 a. 4 Ste. (Rüppell, Cat. III V 7 a—d als *Dipsas*; Originale zu Jan's oben
citiert. Abbildung). **Surinam**. Alte Sammlung 1845.
8293 b. Erw. **Nord-Brasilien**. Gesch. 1896 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
8293 c. Erw. **Trinidad**. Gesch. 1893 von F. W. Urich und R. R. Mole. Port
of Spain.
8293 d. Erw. **Tropisches Mexiko**. Gek. 1846 von H. Finck, Ludwigsburg.

Genus LXXVI. Atractus Wgl.

1. *Atractus badius* (Boie).

Boulenger, Cat. II pag. 308; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges.
1888 pag. 192 (*Geophis*).

- 8308 a. Erw. Sorata, **Bolivia**. Gesch. 1891 von Dr. Heinr. Lenz, Lübeck.
8308 b. Erw. Mapiri, Nebenfluß des oberen Beni, **Bolivia**. Gesch. 1888 von
Ferdinand Emmel, Arequipa.

2. *Atractus torquatus* (D. B.).

Boulenger, Cat. II pag. 309.

8309 a. Erw. (Rüppell, Cat. III X 5 c als *Homalopsis martii*). **Surinam**. Alte Sammlung 1845.

3. *Atractus lehmanni* n. sp.*)

8310 a. 4 erw., 2 jung. Cuenca, **Ecuador**. Gesch. 1894—96 von Konsul F. C. Lehmann, Popayán.

4. *Atractus reticulatus* Blgr.

Boulenger, Cat. II pag. 311. Taf. 15, Fig. 3.

8311 a. Erw. ♂. **Central-Brasilien**. Gesch. 1896 von Konsul Guido von Schröter, San José (Costa Rica).**)

*) Verschieden von dem nahe verwandten *A. crassicaudatus* (D. B.) durch das Frontale, das breiter ist als lang und viel kürzer als sein Abstand vom Schnauzenende, durch den Kontakt von jederseits 4 oder 5 Infralabialen mit dem Kinnschilderpaar und durch einfarbig schwarze, nicht gelblich gefleckte Oberseite und helle Schwanzunterseite. — Schnauze ziemlich stumpf. Rostrale klein, fast so hoch wie breit, von oben gerade noch sichtbar. Internasalen sehr klein; Praefrontalen so lang wie breit; Frontale breiter als lang, viel kürzer als sein Abstand von der Schnauzenspitze, nur etwa halb so lang wie die Parietalen. Frenale nicht mehr als zweimal so lang wie hoch; 2 Postocularen; Temporalen 1 + 2. Sieben Supralabialen, von denen das dritte und vierte das Auge berühren; vier oder fünf Infralabialen in Berührung mit dem einzigen Paar Kinnschilder, die mäßig groß und von dem Symphysale getrennt sind.

Schuppenformeln: ♂ Squ. 17; G. 3, V. 142, A. 1, Sc. $\frac{27}{27} + 1$.
 " " 17; " 4, " 143, " 1, " $\frac{26}{26} + 1$.
 " " 17; " 5, " 144, " 1, " $\frac{25}{25} + 1$.
 ♀ " 17; " 4, " 148, " 1, " $\frac{20}{20} + 1$.
 " " 17; " 6, " 148, " 1, " $\frac{21}{21} + 1$.
 " " 17; " 5, " 153, " 1, " $\frac{20}{20} + 1$.

Oberseits einfarbig dunkel schwarzbraun, äußerste Seitenschuppenreihe rötlichweiß. Unterseits größtenteils schwarz mit rötlichweißen, meist quadratischen Flecken; Kinn- und Schwanzunterseite größtenteils rötlichweiß. Junge Stücke zeigen ein in der Mitte unterbrochenes rötlichweißes Halsband und je einen hellen Flecken auf den Internasalen.

Maße: ♂ Totallänge 295, Schwanzlänge 33 mm.

♀ " " 328, " " 32 " "

Fundort: Bei Cuenca in **Ecuador** von Herrn F. C. Lehmann, Konsul des Deutschen Reiches, gesammelt und in 6 Exemplaren dem Senckenbergischen Museum zum Geschenk überwiesen.

**1 Das vorliegende ♂ hat die Schuppenformel: Squ. 15; G. 2, V. 141, A. 1, Sc. $\frac{31}{31} + 1$ und unterscheidet sich auch durch Pholidose und Färbung

5. *Atractus emmeli* (Bttgr.).

Boulenger, Cat. II pag. 311; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges.
1888 pag. 192, Fig. (*Geophis*).

8311.1a. 2 erw. (Originale). Mapiri, Nebenfluß des oberen Beni, **Bolivia**.
Gesch. 1888 von Ferdinand Emmel, Arequipa.

8311.1b. Erw. Sorata, **Bolivia**. Gesch. 1891 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.

6. *Atractus trilineatus* Wgl.

Boulenger, Cat. II pag. 312.

8312a. Jung. **Trinidad**. Gesch. 1894 von F. W. Ulrich und R. R. Mole,
Port of Spain.

8312b. Erw. (Rüppell, Cat. III C 3a als *Calamaria terlineata*). **Surinam**.
Get. 1838 vom Rijksmuseum in Leiden.

8312c. 3 erw. **Trinidad**. Gesch. 1893 von F. W. Ulrich und R. R. Mole.

7. *Atractus favae* (Fil.).

Boulenger, Cat. II pag. 313.

8313a. Erw. (Rüppell, Cat. III C 5a als *Calamaria*). **Tropisches Amerika**.
Alte Sammlung 1845.

Genus LXXVII. Geophis Wgl.

1. *Geophis semidoliatus* (D. B.).

Boulenger, Cat. II pag. 316

8316.1a. Erw. **Mexiko**. Gesch. 1846 von W. Rössing, hier.

8316.1b. Erw. Jalapa, **Mexiko**. Get. 1893 vom British Museum (N. H.),
London.

Genus LXXVIII. Rhabdophidium Blgr.

1. *Rhabdophidium forsteni* (D. B.).

Boulenger, Cat. II pag. 328.

8328a. ♂, 3 ♀. Rurukan, **Celebes**. Erh. 1894 von der Rüppellreise Prof.
Dr. W. Kükenthals, Jena.

in einigen untergeordneten Punkten von dem durch Boulenger beschriebenen
einzigem ♀ dieser Art. Die Praefrontalen sind etwas länger als breit, das
Frontale deutlich kürzer als sein Abstand von der Schnauzenspitze; auf der
rechten Seite zeigt sich die Andeutung eines kleinen Praeoculare. — Oben
braungrau, jede Schuppe mit breitem dunkelbraunem Rande; eine Spinalreihe
schwarzbrauner Punktstellen, die dadurch entsteht, daß die Schuppen der
mittelsten Rückenreihe in ihrer Hinterhälfte dunkel gefärbt sind; Kopf-
oberseite bis zu dem unentlichen, noch dunkleren Halsbande schwärzlichbraun.
Unterseite einfarbig gelbbraunlich, die Hinterränder der Schilder kaum etwas
dunkler. — Maße: Totallänge des ♂ 330, Schwanzlänge 43 mm.

Genus LXXIX. *Pseudorhabdium* Jan.

1. *Pseudorhabdium longiceps* (Cant.).

Boulenger, Cat. II pag. 329.

8329a. Erw. Pontianak, **West-Borneo**. Gesch. 1893 von Baron Albert von Reinach. hier.

Genus LXXX. *Calamorhabdium* nov.

Verwandt der Gattung *Macrocalamus* Grhr., aber mit 13 Maxillarzähnen, ohne Praeoculare und ohne vordere Temporalen. Abweichend von *Rhadophididium* Blgr. und *Pseudorhabdium* Jan durch Fehlen der Internasalen, von *Calamaria* L. durch die Stellung des Nasenlochs, die größere Zahl der Maxillarzähne und die Zahl der Schuppenreihen. — 13 nahezu gleichgroße Oberkieferzähne; Unterkieferzähne ebenfalls von ziemlich gleicher Größe. Kopf nicht vom Halse abgesetzt; Auge klein, mit runder Papille. Nasenloch zwischen dem Nasale und dem ersten Supralabiale eingestochen. Internasalen, Frenale, Praeoculare und Temporalen fehlen. Körper walzenförmig, Schuppen glatt, ohne Endgrübchen, in 15 Reihen; Bauchschilder gerundet. Schwanz kurz, mit stumpfer Spitze; Schwanzschilder zweireihig. — Hierher als einzige Art:

1. *Calamorhabdium kuekenthali* n. sp. *)

8330a. 2 erw. Insel **Batjan**. Erh. 1895 von der Ruppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

*) Kopf klein, Schnauze zugespitzt, Rostrale fast doppelt so hoch wie breit, auf der Oberseite der Schnauze sichtbar, die Nasalen von einander trennend und durch diese an den Seiten bogenförmig etwas ausgerandet. Frontale länger als breit, so lang wie sein Abstand von der Schnauzenspitze, kürzer als die Parietalen. Internasalen fehlen; kein Praeoculare; ein kleines Postoculare. Temporalen fehlen. 5 Supralabialen, von denen das dritte und vierte in den Augenkreis treten. Mentale in Berührung mit den vorderen Kinnschildern, die länger sind als die hinteren und mit je 3 Infralabialen in Berührung stehen. Hintere Kinnschilder vorn in der Mitte in Kontakt mit einander.

Schuppenformel: ♂ Squ. 15; G. 3. V. 125. A. 1. Sc. ¹⁷ 17 + 1.

♀ " 15; " 4. " 140. " 1. " ¹⁰ 10 + 1.

Oben schwarzgrau, lebhaft irisierend, die seitlichen Schuppen mit hellem, weißlichem Mittelflecken; Lippen weißlich; hinter den Parietalen ein breites, aber undeutlich begrenztes, in der Nackenmitte unterbrochenes weißliches Halsband. Ventralen und Subcaudalen weißlich mit schwarzen Hinterrändern und in unregelmäßigen Längsreihen stehenden schwärzlichen Würfelfleckchen. Mittellinie der Schwanzunterseite schwarz.

Maße: ♂ Totallänge 184, Schwanzlänge 17 mm.

♀ " " 205, " " 10 "

Fundort: Insel **Batjan** (Molukken), zwei an der Schnauzenspitze etwas verstoßene Stücke.

Genus LXXXI. Calamaria Boie.

1. *Calamaria lumbricoidea* Boie.

Boulenger, Cat. II pag. 333.

- 8333 a. Erw. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell.
Bonn.
8333 b. Erw. ♂. Vulkan Tjisurupan, **West-Java**. Gek. 1893 von Hans
Fruhstorfer, Berlin.

2. *Calamaria vermiformis* D. B.

Boulenger, Cat. II pag. 333.

- 8334 a. Erw. (var. *alkeni* Bleek.). Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch.
1892 von Dr. med. O. Benecke. daselbst.
8334 b. Erw. (var. *dimidiata* Bleek.). Vulkan Tjisurupan, **West-Java**. Gek.
1893 von Hans Fruhstorfer, Berlin.
8334 c. Erw. (var. *sumatrana* Lidth de Jende). Deli, **Nordost-Sumatra**.
Gesch. 1891 von Fritz Beyschlag, daselbst.

3. *Calamaria gervaisi* D. B.

Boulenger, Cat. II pag. 338.

- 8338.2 a. Erw., 3 halbw., 1 jung. **Mittel-Luzon**. Gesch. 1890 von Konsul
Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
8338.2 b. Jung. Insel **Cebu**, Philippinen. Gesch. 1890 von Otto Koch, daselbst.

4. *Calamaria sumatrana* Edel.

Boulenger, Cat. II pag. 339.

- 8339 a. Erw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1891 von Fritz
Beyschlag, daselbst.

5. *Calamaria virgulata* Boie.

Boulenger, Cat. II pag. 340; Boettger in Semons Zool. Forsch.
Hft. 5. 1894 pag. 125 (*modesta* var. *bogorensis*).

- 8340.1 a. Erw. ♀ (var. A). Gunung Pengalengan, **West-Java**. Gek. 1895 von
Hans Fruhstorfer, Berlin.
8340.1 b. Erw. ♂ (var. C). **Ebendaher**. Gek. 1895 von demselben.
8340.1 c. Erw. ♀ (var. *monochrous* Bleek.). **Ebendaher**. Gek. 1895 von
demselben.
8340.1 d. Erw. ♂ und ♀ (var. C). Vulkan Tjisurupan, **West-Java**. Gek. 1893
von demselben.
8340.1 e. 2 erw. (var. C). Tjibodas, **West-Java**. Gesch. 1894 von Prof. Dr.
R. W. Semon, Jena.

6. *Calamaria collaris* Blgr.

Boulenger. Proc. Zool. Soc. London 1897 pag. 225, Taf. 14, Fig. 4.
8341 a. Erw. Rurukan in 4000'. Nord-Celebes. Erh. 1895 von der Rüppell-
reise Prof. Dr. W. Kükenthals. Jena.

7. *Calamaria agamensis* Bleek.

Boulenger. Cat. II pag. 343.
8344 a. Erw. Java. Gef. 1891 vom Zoolog. Institut der Techn. Hochschule.
Karlsruhe.

8. *Calamaria leucocephala* D. B.

Boulenger, Cat. III pag. 344; Boettger. Ber. Offenbach. Ver.
f. Naturk. 1873 pag. 38. Taf. 1 (*iris*).
8344, 1 a. Halbw. (schlecht gehalten, ganz schwarz). Sultanat Deli. Nordost-
Sumatra. Gesch. 1891 von Fritz Beyschlag, daselbst.

9. *Calamaria semiannulata* n. sp. *)

8345 a. Erw. Borneo. Gesch. 1886 von Prof. Dr. Oskar Boettger, hier.

*) Ausgezeichnet nicht bloß durch auffallende Färbung, sondern auch durch das Rostrale, das — abweichend von allen beschriebenen Arten der Gattung — deutlich tiefer ist als an seiner Basis breit. Am nächsten wahrscheinlich der *C. brookei* Blgr., die sich aber durch andere Verhältnisse des Rostrale und Frontale, das größere Auge und die sehr abweichende Färbung und Zeichnung unterscheidet. — Rostrale tiefer als breit, von oben gut sichtbar, sein Abstand von der Schnauzenspitze halb so lang wie die Praefrontalnaht; Frontale so lang wie breit, etwa dreimal so breit wie das Supraoculare, viel kürzer als die Parietalen; ein Prae- und ein Postoculare; Augendurchmesser viel kleiner als sein Abstand von der Maulspalte. Fünf Supralabialen, wovon das dritte und das vierte das Auge berühren; das erste Paar Infralabialen hinter dem Symphysale in Berührung mit einander; 2 Paar Kinnschilder, die hinteren in ihrer Vorderhälfte in Kontakt mit einander. Schwanz in eine stumpfe Spitze ausgezogen.

Schuppenformel: Squ. 13; G. 3, V. 140, A. 1. Sc. $\frac{27}{27} + 1$.

Oberseits rötlichgelb mit 26 dunkelbraunen Querbinden oder breiten Querflecken, die etwa so breit sind wie die hellen Zwischenräume; der dunkelbraune Nackenflecken am breitesten; die Schuppen der äußersten Seitenreihe zeigen je einen braunen Punktflecken und erzeugen infolgedessen bis zum After einen sehr markierten, ununterbrochenen Punktstreifen. Die Kopfoberseite ist bräunlich; ein schief vom Auge nach hinten und unten ziehender, etwas verschwommener Streifen und ein zweiter, ihm paralleler, hinter der Rachenkommissur nach hinten und unten verlaufender, ähnlicher.

10. *Calamaria linnei* Boie.

Boulenger, Cat. II pag. 345.

- 8346 a. 2 halbw. (var. *rhomboidea* Jan). Gunung Pengalengan. **West-Java**. Gek. 1895 von Hans Fruhstorfer. Berlin.
- 8346 b. 3 erw. (var. *transversalis* Jan). Buitenzorg. **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell. Bonn.
- 8346 c. Erw. ♀ (dieselbe Varietät). Vulkan Tjisurupan, **West-Java**. Gek. 1893 von Hans Fruhstorfer.
- 8346 d. Erw. u. 2 Junge (var. *tessellata* Jan). Buitenzorg. **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell.
- 8346 e. Erw. ♂ und ♀ (var. *bilineata* Fitz.). Vulkan Tjisurupan. **West-Java**. Gek. 1893 von Hans Fruhstorfer.
- 8346 f. 3 erw. (var. *versicolor* Ranz.). Tenggergebirge in 1200 m. **Ost-Java**. Gek. 1891 von demselben.
- 8346 g. Erw. (var. *tessellata* Jan). Vulkan Tjisurupan. **West-Java**. Gek. 1893 von demselben.
- 8346 h. Erw. (var. *contaminata* Jan). **Ebendaher**. Gek. 1893 von demselben.
- 8346 i. 3 erw. (var. *bilineata* Fitz.). Buitenzorg. **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell.

11. *Calamaria borneensis* Bleek.

Boulenger, Cat. II pag. 347. Taf. 19, Fig. 1.

- 8347 a. Erw. Baramfluß in **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals. Jena.

12. *Calamaria pavimentata* D. B.

Boulenger, Cat. II pag. 348.

8348. 1 a. Halbw. **Kanton**, Süd-China. Gesch. 1885 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

13. *Calamaria lowi* Blgr.

Boulenger, Cat. II pag. 350. Taf. 19, Fig. 4.

- 8350 a. Erw. Baramfluß, **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

aber längerer und breiterer Streifen dunkelbraun. Körper- und Schwanzunterseite einfarbig hell rötlichgelb.

Maße: Totallänge 200. Schwanzlänge 25 mm.

Fundort: **Borneo**, leider ohne jede nähere Angabe, ein gut gehaltenes Stück.

14. *Calamaria acutirostris* Blgr.

Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 17. 1896 pag. 394.

8351.a. Erw. Bua Praeng, **Süd-Celebes**. Gek. 1897 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

15. *Calamaria gracilis* Blgr.

Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 18. 1896 pag. 63.

8351.1a. Erw. Bua Praeng, **Süd-Celebes**. Gek. 1897 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

16. *Calamaria muelleri* Blgr.*)

Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 17. 1896 pag. 394.

8351.2a. Erw. ♂ und ♀. Bua Praeng, **Süd-Celebes**. Gek. 1897 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

Subfamilie 3. Rhachiodontinae.

Genus I. Dasypeltis Wgl.

1. *Dasypeltis scabra* (L.).

Boulenger, Cat. II pag. 354; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1885 pag. 14 (*fasciolata*). Ber. Senck. Nat. Ges. 1887 pag. 163 und 1888 pag. 75 (typ.), 1888 pag. 76 (var. *fasciata*) und pag. 77 (var. *palmarum*).

8354.a. Erw. Akkra, **Goldküste**. Gesch. 1887 von Major Dr. L. von Heyden, hier.

8354.b. Erw. Kinshassa am Stanley Pool, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.

var. *medicini* Bianc. (*fasciata* Smith).

Boulenger, l. c. pag. 356.

8355.a. 7 Ste. Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1886 von Paul Hesse, Venedig.

8355.b. 2 erw. Povo Netonna bei Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.

*) Nach sieben von mir untersuchten Stücken aus Bua Praeng variiert die Schuppenformel beim

♂ Squ. 13; G. 3, V. 141—145, A. 1. Sc. $^{17}_{17}-^{18}_{18} + 1$.

♀ „ 13; „ 3. „ 159—166, „ 1. „ $^{11}_{11}-^{13}_{13} + 1$.

var. *palmarum* Leach.

Boulenger, l. c. pag. 356.

8356 a. Erw. u. halbw. **Banana, Unter-Congo.** Gek. 1885 von Paul Hesse, Venedig.

Subfamilie 4. Homalopsinae.

Genus I. Hypsirhina Wgl.

1. *Hypsirhina alternans* (Rss.).

Boulenger, Cat. Snak. Brit. Mus. Bd. III. 1896 pag. 4: Reuß, Mus. Senck. Bd. 1. 1834 pag. 155. Taf. 9. Fig. 3 (*Brachyorrhos*); Jan. Icon. Oph. Lief. 30, Taf. 6. Fig. 2; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1892 pag. 133.

9004.1 a. 4 Junge (Rüppell, Cat. III C 4 a—c als *Eurostus*: Originale zu Jans oben citierter Abbildung). **Java.** Gesch. 1827 von Dr. med. Peitsch. Batavia.

2. *Hypsirhina plumbea* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 5; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1885 pag. 123 und 1888 pag. 83.

9005 a. Halbw. Samarang auf **Java.** Gesch. 1876 von Major Dr. L. von Heyden, hier.

9005 b. Jung. Atschin, **Nord-Sumatra.** Gek. 1882 von Konrad Kläsi. Zürich.

9005 c. Jung. Pinang, **Malayische Halbinsel.** Gesch. 1893 von Dr. Heinrich Lenz. Lübeck.

9005 d. Erw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra.** Gesch. 1894 von Wwe. H. Krämer, hier.

9005 e. 2 erw. **Kanton,** Süd-China. Gesch. 1886 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila, und Otto Herz, St.-Petersburg.

9005 f. Erw. **Hongkong,** Süd-China. Get. 1889 von Bernhard Schmacker. Shanghai.

9005 g. Halbw. Nyen-hong-li bei **Hongkong.** Gesch. 1880 von Hans Simon. Stuttgart.

9005 h. Erw. Insel **Hainan.** Gek. 1886 von Otto Herz.

9005 i. Erw. (gestopft). **Ostindien.** Gek. 1846 von Boissoneau.

3. *Hypsirhina enhydris* (Schnd.).

Boulenger, Cat. III pag. 6.

9007 a. Halbw. **Siam.** Gesch. 1885 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

- 9007 b. Halbw. (var. *bilineata* Gray). Herbert River, **Queensland**. Get. 1893 vom British Museum (N. H.). London.
9007 c. 2 erw. (var. *bilineata* Gray). **Java**. Gesch. 1880 von Oberlehrer J. Blum. hier.

4. *Hypsirhina bennetti* Gray.

Boulenger. Cat. III pag. 8.

- 9008 a. Erw. Insel **Hainan**, Süd-China. Gek. 1886 von Otto Herz, St.-Petersburg.

5. *Hypsirhina chinensis* Gray.

Boulenger. Cat. III pag. 8. Taf. 1, Fig. 2; Boettger. Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1885 pag. 123.

- 9008.1a. Erw. Insel **Hainan**, Süd-China. Gek. 1886 von Otto Herz, St.-Petersburg.
9008.1b. Halbw. **Ebendaher**. Gesch. 1894 von Bernh. Schmacker, Shanghai.
9008.1c. 4 erw., 2 jung. **Kanton**, Süd-China. Gesch. 1885 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila, und Otto Herz, St.-Petersburg.

Genus II. Homalopsis Kuhl.

1. *Homalopsis buccata* (L.).

Boulenger. Cat. III pag. 14.

- 9014 a. Halbw. Surabaya, **Ost-Java**. Gesch. 1889 von Dr. med. Stratz, Haag
9014 b. Halbw. Pinang, **Malayische Halbinsel**. Gesch. 1893 von Dr. Heimir Lenz, Lübeck.
9014 c. 3 Ste. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.
9014 d. 2 Junge. Insel **Bangka**. Gek. 1881 von Konrad Kläsi, Zürich.
9014 e. Erw. Stabat Estate, Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1893 von Fritz Beyschlag, daselbst.
9014 f. 6 Ste. (Rüppell. Cat. III X 1a—f). **Java**. Gesch. 1836—38 von Dr. med. Peitsch, Batavia, und Dr. W. von Siebold, Leiden.

Genus III. Cerberus Cuv.

1. *Cerberus rhynchops* (Schnd.).

Boulenger. Cat. III pag. 16.

- 9016 a. Erw. **Singapore**. Gesch. 1891 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
9016 b. Erw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1894 von Wwe. H. Krämer, hier.
9016 c. Zahlr. Ste. **Mittel-Luzon**, Philippinen. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
9016 d. 4 Ste. Bai von **Manila**, Luzon. Gesch. 1891 von demselben.

- 9016 e. 3 erw. Patani auf **Halmahera**. Erh. 1895 von der Ruppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.
- 9016 f. Erw. Insel **Ternate**. Erh. 1895 von derselben.
- 9016 g. Erw. **Java**. Gesch. 1880 von Oberlehrer J. Blum, hier.
- 9016 h. Erw. **Ebendaher** (Ruppell, Cat. III X 2 a als *Homalopsis schneideri*). Gesch. 1838 von Dr. W. von Siebold, Leiden.
- 9016 i. Erw. **Madras**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.
- 9016 k. Erw. (gestopft). **Ostindien**. Gek. 1846 von Boissonneau.
- 9016 l. Erw. **Philippinen**. Gesch. 1897 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff und Otto Koch, Cebú.

Genus IV. Fordonia Gray.

1. *Fordonia leucobalia* (Schlg.).

Boulenger, Cat. III pag. 21.

- 9021 a. Erw. (var. *micolor* Gray). Insel **Mindanao**, Philippinen. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
- 9021 b. Erw. (dieselbe Varietät). Pontianak, **West-Borneo**. Gesch. 1893 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.

Subfamilie 5. Dipsadomorphinae.

Genus I. Geodipsas Blyr.

1. *Geodipsas infralineata* (Gthr.).

Boulenger, Cat. III pag. 32, Taf. 3, Fig. 1.

- 9032 a. Erw. ♀. Moramanga, **Ost-Madagaskar**. Gesch. 1892 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.

Genus II. Ityocyphus Gthr.

1. *Ityocyphus miniatus* (Schlg.).

Boulenger, Cat. III pag. 35; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 11, 1877 pag. 13, 1879 pag. 464 und Bd. 12, 1881 pag. 444 (*Philodryas*).

- 9035 a. Erw. **Nossibé**. Gesch. 1876 von Konsul Carl Ebenau, Loucombé.
- 9035 b. 2 erw. Majunga, **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.
- 9035 c. 4 erw. **Nossibé**. Gesch. 1879—83 von Konsul Carl Ebenau und A. Stumpff, daselbst.

Genus III. Langaha Brug.

1. *Langaha nasuta* Shaw.

- Boulenger, Cat. III pag. 36; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 11. 1878 pag. 270, 1879 pag. 467 und Bd. 12. 1881 pag. 447.
9036 a. 4 erw. **Nossibé**. Gesch. 1881—83 von Konsul Anton Stumpff, Loucoubé.

2. *Langaha intermedia* Blgr.

- Boulenger, Cat. III pag. 37; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 11. 1879 pag. 465 (*crisagalli*).
9037.1a. 4 erw. **Nossibé**. Gesch. 1881—85 von Konsul Anton Stumpff, Loucoubé.
9037.1b. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1897 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.

Genus IV. Eteirodipsas Jan.

1. *Eteirodipsas colubrina* (Schlg.).

- Boulenger, Cat. III pag. 39; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 12. 1881 pag. 448 (*Dipsas*) und Bd. 11. 1877 pag. 16, 1878 pag. 271 und 1879 pag. 467.
9039 a. Jung (var. *citrina* Bttgr.). **Nossibé**. Gesch. 1876 von Konsul Carl Ebenau, Loucoubé.
9039 b. 3 erw. (dieselbe Varietät). **Ebendaher**. Gesch. 1876 von demselben.
9039 c. 6 Stc. (Typus). **Ebendaher**. Gesch. 1876—85 von Konsul Carl Ebenau und Anton Stumpff, Loucoubé.
9039 d. 2 erw. (davon ein Stück mit zahlreichen schwärzlichen Punkteflecken auf den Ventralen). Majunga, **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.
9039 e. 2 erw. Kandani, Süd-Bembatokabai. **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von demselben.

Genus V. Stenophis Blgr.

1. *Stenophis granuliceps* (Bttgr.).

- Boulenger, Cat. III pag. 41; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 11. 1877 pag. 14, Taf. 1, Fig. 3 und Bd. 12. 1881 pag. 448 (*Dipsas gaimardi* var.).
9041 a. 2 erw., 4 jung. **Nossibé**. Gesch. 1877—83 von Konsul Anton Stumpff, Loucoubé.
9041 b. Erw. Soalala, **West-Madagaskar**. Gesch. 1897 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.

Genus VI. Tarbophis Fleischm.

1. *Tarbophis savignyi* Blgr.

Boulenger, Cat. III pag. 48; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1878—79 pag. 67 und 1879—80 pag. 33 (*vivax*) und 1879—80 pag. 166 (*vivar f. syriaca*).

- 9047 a. Erw. Jaffa, **Syrien**. Gesch. 1879 von Major Dr. L. von Heyden, hier.
9047 b. Kopf. Haiffa, **Syrien**. Gesch. 1880 von Hans Simon, Stuttgart.
9047 c. 3 erw. **Jernsalem**, **Syrien**. Gesch. 1880 von demselben.
9047 d. 3 erw., 1 jung. Sarona bei Jaffa, **Syrien**. Gesch. 1881 von demselben.

2. *Tarbophis fallax* Fleischm.

Boulenger, Cat. III pag. 48; Boettger, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. 49. 1877 pag. 287 und Sitz.-Ber. Berlin. Akad. 1888 pag. 178 (*vivar*).

- 9048 a. Halbw. Burbulitsa bei Volo, **Thessalien**. Gesch. 1888 von Josef Stussiner, Laibach.
9048 b. Halbw. Xenochóri, **Nord-Euböa**. Gesch. 1891 von Fr. de Mimont, daselbst.
9048 c. Erw. (Rüppell, Cat. III W 1 a als *Alurophis vivax*). **Ost-Europa**. Get. 1838 von Michaelles, München.
9048 d. Erw. u. 2 Junge (Rüppell, Cat. III W 1 b—d als *A. vivax*). **Klein-asien**. Gesch. 1846 von W. Schneider, hier.
9048 e. 2 erw. **Dalmatien**. Gek. 1876 von Bauditsch & Co., Triest.

3. *Tarbophis iberus* (Eichw.).

Boulenger, Cat. III pag. 49; Boettger in Raddes Fann. Flor. Casp.-Geb. 1886 pag. 72 (*vivar*).

- 9049 a. Erw. Mtzchet, **Transkaukasien**. Gek. 1880 von Hans Leder, Jauernig (Österr.-Schlesien).

4. *Tarbophis semiannulatus* (Smith).

Boulenger, Cat. III pag. 51; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1887 pag. 162 (*Leptodira*).

- 9051, 1 a. Erw. Route l'Aus-Keetmanshoop, **Groß-Namaland**. Gesch. 1887 von Prof. Dr. Hans Schinz, Zürich.

5. *Tarbophis obtusus* (Rss.).

Boulenger, Cat. III pag. 52; Reuß, Mus. Senck. Bd. 1. 1834 pag. 137 (*Coluber*).

- 9053 a. Erw. u. jung. (Rüppell, Cat. III V 10 a—b als *Dipsas aegyptiaca*). **Ägypten**. Gesch. 1832 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.

Genus VII. Dipsadomorphus Fitz.

1. *Dipsadomorphus trigonatus* (Schnd.).

Boulenger, Cat. III pag. 62.

9062 a. Halbw. **Madras**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.

2. *Dipsadomorphus multimaculatus* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 63; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1885 pag. 124 (*Dipsas*).

9063 a. Halbw. **Kanton**, Süd-China. Gesch. 1885 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

9063 b. 2 erw. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

9063 c. Erw. (Rüppell, Cat. III V 3 a als *Dipsas*). **Java**. Get. 1838 vom Rijksmuseum in Leiden.

3. *Dipsadomorphus ceylonensis* Gthr.

Boulenger, Cat. III pag. 66.

9066 a. 2 erw. **Ceylon**. Gesch. 1846 von Gebr. H. und W. Worms, hier.

4. *Dipsadomorphus fuscus* (Gray).

Boulenger, Cat. III pag. 67; Boettger in Semons Zool. Forsch. Hft. 5. 1894 pag. 118 (*Dipsas*).

9067 a. Jung. Barnett River, **Queensland**. Gesch. 1894 von Prof. Dr. R. W. Semon, Jena.

5. *Dipsadomorphus dendrophilus* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 70.

9070 a. Erw. **Java** (Rüppell, Cat. III V 1 a als *Dipsas*). Gesch. 1838 von Dr. W. von Siebold, Leiden.

9070 b. Erw. **Ebendaher** (Rüppell, Cat. III V 1 b als *Dipsas*). Gesch. 1842 von demselben.

var. *melanotus* Bleek.

Boulenger, l. c. pag. 71.

9071 a. Erw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1891 von Dr. med. O. Benecke, daselbst.

9071 b. Erw. Stabat Estate, Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1893 von Fritz Beyschlag, daselbst.

var. *multicincta* Blgr.

Boulenger, l. c. pag. 71.

- 9071.3a. Erw. Dingalan, Prov. Nueva Ecija, **Luzon**. Gesch. 1893 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
9071.3b. Erw. ♂. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1897 von Dr. med. C. Flach, Aschaffenburg.

var. *latifasciata* Blgr.

Boulenger, l. c. pag. 71.

- 9071.5a. Erw. **Mindanao**. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
9071.5b. Erw. Insel **Samar**, Philippinen. Gesch. 1897 von demselben.

6. *Dipsadomorphus drapiezii* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 74.

- 9074a. Erw. (Rüppell, Cat. III V 8a als *Dipsas*). **Java**. Gesch. 1838 von Dr. W. von Siebold, Leiden.

7. *Dipsadomorphus angulatus* (Pis.).

Boulenger, Cat. III pag. 75.

- 9075a. Erw. **Catanduanes**, Philippinen. Gesch. 1891 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

8. *Dipsadomorphus irregularis* (Merr.).

Boulenger, Cat. III pag. 75; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1885 pag. 153 (*Dipsas*).

- 9076a. Erw. **Ambonia** (Rüppell, Cat. III V 2b als *Dipsas*). Alte Sammlung 1845.
9076b. Erw. u. halbw. Insel **Batjan**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.
9076c. Erw. Faro. **Salomonsinseln**. Get. 1887 vom British Museum (N. H.). London.
9076d. 2 erw. Ema auf Leitimor. **Süd-Ambonia**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.
9076e. Erw. Insel Duke of York. **Neubritannien**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.
9076f. Erw. **Ambonia** (Rüppell, Cat. III V 2a als *Dipsas*). Get. 1836 vom Rijksmuseum, Leiden.
9076g. 2 erw., 2 jung. Insel **Ternate**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals.
9076h. Erw. u. jung. Minahassa. **Celebes**. Erh. 1895 von derselben.
9076i. 6 Ste. Soah Komorah auf **Halmahera**. Erh. 1895 von derselben.

9. *Dipsadomorphus blandingi* (Hallow.).

Boulenger, Cat. III pag. 77; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 74 (*Dipsas*).

9077.2 a. Erw. Povo Noulao bei Banana. **Unter-Congo**. Gek. 1886 von Paul Hesse, Venedig.

10. *Dipsadomorphus cynodon* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 78; Boettger, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, No. 7, pag. 4 (*Dipsas*).

9078 a. Erw. ♀ (var. A). Culion. **Calamianes**, Philippinen. Gesch. 1893 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

9078 b. Erw. (var. C). Majajjay bei Manila. **Luzon**. Gesch. 1890 von demselben.

9078 c. Erw. (var. A). Insel **Bangka**. Gesch. 1886 von Mijningenieur M. Koperberg, Pontianak (Borneo).

Genus VIII. Himantodes D. B.

1. *Himantodes cenchoa* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 84.

9084 a. Erw. (Typus). Mapiiri, Nebenfluß des oberen Beni. **Bolivia**. Gesch. 1888 von Ferdinand Emmel, Arequipa.

9084 b. Jung (Typus). Sorata. **Bolivia**. Gesch. 1891 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.

9084 c. Jung (Typus). **Trinidad**. Gesch. 1895 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.

9084 d. Erw. (var. *leucomelas* Cope). Caucathal in 500 m. **U. S. Columbia**. Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel, Jena.

2. *Himantodes elegans* Jan.

Boulenger, Cat. III pag. 85.

9085 a. Erw. u. jung. Retalhuleu. **Guatemala**. Gesch. 1894 von Carl Fleischmann, daselbst.

Genus IX. Leptodira Gthr.

1. *Leptodira hotamboeia* (Laur.).

Boulenger, Cat. III pag. 89; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 12, 1881 pag. 398 (*Crotaphopeltis rufescens*) und Ber. Senck. Nat. Ges. 1887 pag. 162 und 1888 pag. 72 (*rufescens*).

9089 a. 2 Junge. Boma. **Unter-Congo**. Gek. 1886 von Paul Hesse, Venedig.

9089 b. 2 halbw. Akkra, **Goldküste**. Gesch. 1887 von Major Dr. L. von Heyden, hier.

- 9089 c. Jung. **Kapland**. Gesch. 1892 von Oberlehrer J. Blum, hier.
9089 d. 2 erw. **Banana, Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.
9089 e. Erw. (einen *Bufo regularis* Rss. verschlingend). Povo Nemlao bei
Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1886 von demselben.
9089 f. Erw. **Süd-Afrika**. Gesch. 1873 von Dr. Löwenthal, hier.
9089 g. Halbw. Insel **Sansibar**. Gesch. 1897 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.
9089 h. Halbw. Peccetoni, **Wituland**, Ost-Afrika. Gesch. 1897 von demselben.

2. *Leptodira personata* Cope.

Boulenger, Cat. III pag. 93.

- 9093.1 a. Erw. **Tropisches Mexiko**. Gek. 1846 von H. Finckh, Ludwigsburg.
9093.1 b. 3 Junge. **Mexiko**. Get. 1895 vom British Museum (N. H.), London.
9093.1 c. Erw. ♀. **Mexiko**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.

3. *Leptodira albofusca* (Lacép.).

Boulenger, Cat. III pag. 95.

- 9095 a. Erw. Carácas, **Venezuela**. Gek. 1877 von Hübner & Schlesinger,
Leipzig.
9095 b. Erw. u. halbw. Cairo bei Limon, Ostseite von **Costa Rica**. Gesch.
1892—93 von Carl Fleischmann, Guatemala.
9095 c. Erw. u. halbw. Südküste von **Trinidad**. Gesch. 1888 von Ingenieur
G. Gerold und 1893 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.
9075 d. Erw. **Yucatan**. Lebend mit Blaubholz hierher gekommen. Gesch.
1891 von Beyerbach jun., hier.
9095 e. 2 erw. Retalhuleu, **Guatemala**. Gesch. 1894 von Carl Fleischmann,
Guatemala.
9095 f. Erw. (Rüppell, Cat. III V 13 a als *Dipsas*). **Tropisches Mexiko**.
Alte Sammlung 1845.
9095 g. Erw. ♀ (Rüppell, Cat. III V 6 e als *D. annulata*). **Surinam**. Gesch.
1838 von Dr. med. Sichel, hier.
9095 h. 2 erw. Pacasmayo, **Nord-Peru**. Gesch. 1889 von Max Bamberger, hier.
9095 i. 4 erw., 2 jung. Carácas, **Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller,
hier.

4. *Leptodira annulata* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 97.

- 9097 a. Halbw. Puerto Cabello, **Venezuela**. Gesch. 1894 von Konsul F. Mauß,
dasselbst.
9097 b. Erw. Mapiri, Nebenfluß des oberen Beni, **Bolivia**. Gesch. 1888 von
Ferdinand Emmel, Arequipa.
9097 c. 2 erw., 1 jung (Rüppell, Cat. III V 6 b—d als *Dipsas*). **Surinam**.
Alte Sammlung 1845.
9097 d. Erw. (Rüppell, Cat. III V 6 a als *Dipsas*). **Ebendaher**. Get. 1838
von Graf Jenison, Heidelberg.

Genus X. Oxyrrhopus Wgl.

1. *Oxyrrhopus petolarius* (L.).

- Boulenger. Cat. III pag. 101: Renß. Mus. Senck. Bd. 1. 1834 pag. 148. Taf. 9. Fig. 1 (*Coluber digitalis*): Jan. Icon. Ophid. Lief. 36. Taf. 1. Fig. 1.
- 9101 a. Erw. (Rüppell. Cat. III L 4 a als *Lycodon*). **Tropisches Mexiko.** Gek. 1846 von H. Finckh. Ludwigsburg.
- 9101 b. Erw. (var. *immaculata* D. B.). Mapiri, Nebenfuß des oberen Beni. **Bolivia.** Gesch. 1888 von Ferdinand Emmel. Arequipa
- 9101 c. Erw. (dieselbe Varietät). Sorata. **Bolivia.** Gesch. 1891 von Dr. Heinr. Lenz. Lübeck.
- 9101 d. Erw. Cujapa, Staat **Matogrosso**, Brasilien. Gesch. 1886 von Jacob Schumacher. hier.
- 9101 e. 2 erw. (var. B bei Boulenger = *digitalis* Rss.: Originale zu Jans oben citierter Abbildung). Ilheos, **Brasilien** (Rüppell. Cat. III L 2* a—b als *Lycodon*). Gesch. 1836 von Gebr. Koch. hier.
- 9101 f. Erw. u. jung. Sorata. **Bolivia.** Gesch. 1891 von Dr. Heinr. Lenz.
- 9101 g. 3 Ste. (Rüppell. Cat. III L 2 a—b als *Lycodon*). **Brasilien.** Alte Sammlung 1845.
- 9101 h. Jung (var. *digitalis* Rss.). Mapiri, **Bolivia.** Gesch. 1888 von Ferd. Emmel.
- 9101 i. Jung (Typus). Medellin. **U. S. Columbia.** Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel. Jena.
- 9101 k. Erw. (var. D). Carácas. **Venezuela.** Gek. 1897 von Ing. Müller. hier.

2. *Oxyrrhopus rhombifer* D. B.

- Boulenger. Cat. III pag. 103.
- 9103 a. Erw. u. jung. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gesch. 1873 von Oberlehrer Dr. Finger. hier.
- 9103 b. Erw. **Ebendaher.** Gek. 1888 von Prof. Dr. H. von Hering. daselbst.
- 9103 c. Erw. **Central-Brasilien.** Gesch. 1896 von Konsul Guido von Schröter. San José (Costa Rica).

3. *Oxyrrhopus trigeminus* D. B.

- Boulenger. Cat. III pag. 104.
- 9103.1 a. Halb. São Paulo. **Brasilien.** Gek. 1881 von Josef Duschanek. hier.
- 9103.1 b. Erw. (Rüppell. Cat. III L 3 a als *Lycodon formosus*). **Brasilien.** Gek. 1836 vom Naturh. Hofmusem. Wien.

4. *Oxyrrhopus bitorquatus* (Gthr.).

- Boulenger. Cat. III pag. 104. Taf. 6. Fig. 1.
- 9104 a. Halb. Sorata. **Bolivia.** Gesch. 1891 von Dr. Heinr. Lenz. Lübeck.
- 9104 b. 2 halb. Sta. Ana, Prov. Cuzco. **Peru.** Gesch. 1890 von Friedrich Emmel. Gelnhausen.

5. *Oxyrrhopus doliatus* D. B.

Boulenger, Cat. III pag. 106.

- 9106 a. 2 erw. Sta. Ana, Prov. Cuzco, **Peru**. Gesch. 1890 von Friedrich Emmel, Gelnhausen.

6. *Oxyrrhopus fitzingeri* (Tschudi).

Boulenger, Cat. III pag. 108.

- 9108 a. Jung (ohne Kopf). Pacasmayo, **Nord-Peru**. Gesch. 1887 von Max Bamberger, hier.
- 9108 b. Halb. **Peru**. Get. 1888 von der Naturhist. Gesellschaft Nürnberg.

7. *Oxyrrhopus cloelia* (Daud.).

Boulenger, Cat. III pag. 108.

- 9109 a. Erw. (Rüppell, Cat. III M 1 a als *Coloelia occipitalis*). Ilheos, **Brasilien**. Gesch. 1838 von Gebr. Koch, hier.
- 9109 b. Halb. São Paulo, **Brasilien**. Gesch. 1890 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
- 9109 c. Halb. (var. *occipitalis* Jan). **Brasilien**. Get. 1893 vom Naturhist. Museum in Augsburg.
- 9109 d. Erw. (Rüppell, Cat. III O 10 a als *Coluber plumbeus*). **Brasilien**. Get. 1840 vom Naturh. Hofmuseum, Wien.
- 9109 e. Erw. (gestopft). **Brasilien** (Rüppell, Cat. III O 10 b als *C. plumbeus*). Gesch. 1840 von Baron A. von Rothschild durch Prof. Freyreiß.
- 9109 f. Kopf und Schwanz. Caparo auf **Trinidad**. Gesch. 1894 von F. W. Ulrich und R. R. Mole. Port of Spain.

8. *Oxyrrhopus maculatus* Blgr.

Jan, Elenco sist. Ofidi pag. 92 (*Brachyrhynchum plumbeum* var.);
Boulenger, Cat. III pag. 110. Taf. 6. Fig. 2.

- 9110 a. Erw. **Buenos Aires**, Argentina (Rüppell, Cat. III O 8 a als *Collopeltis* sp.). Gesch. 1842 von W. A. Bernus, hier.

9. *Oxyrrhopus rusticus* Cope.

Boulenger, Cat. III pag. 111.

- 9111 a. Erw. **Buenos Aires**. Get. 1895 vom British Museum (N. H.), London.
- 9111 b. Halb. Stadt Rio Grande do Sul, **Süd-Brasilien**. Gek. 1886 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.

10. *Oxyrrhopus neuwiedi* (D. B.).

Boulenger, Cat. III pag. 112.

- 9112 a. Erw. Insel **Tobago**, Westindien. Gesch. 1896 von Albrecht Seitz, Hamburg.

- 9112 b. Erw. **Trinidad**. Gesch. 1893 von F. W. Frich und R. R. Mole. Port of Spain.
9112 c. Halb. **Venezuela**. Gek. 1877 von Hamburg.
9112 d. Erw. **Medellin, U. S. Columbia**. Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel. Jena.
9112 e. Erw. u. halb. **Carácas, Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller. hier.

Genus XI. Rhinostoma D. B.

1. *Rhinostoma guianense* (Trosch.).

Boulenger, Cat. III pag. 114.

- 9114 a. Halb. **Venezuela**. Gek. 1877 von Hamburg.
9114 b. Erw. **Carácas, Venezuela**. Gek. 1897 von Oberlehrer Dr. W. Schauf hier.
9114 c. Halb. Baranquilla im Magdalenathal. **U. S. Columbia**. Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel. Jena.
9114 d. Erw. u. 2 halb. **Carácas, Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller. hier.

Genus XII. Thamnodynastes Wgl.

1. *Thamnodynastes nattereri* (Mik.).

Boulenger, Cat. III pag. 116; Boettger, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. 58. 1885 pag. 236.

- 9116 a. Halb. São Paulo. **Brasilien**. Gek. 1881 von Josef Duschanek. hier.
9116 b. Erw. Stadt Rio Grande do Sul. **Süd-Brasilien**. Gek. 1886 von Prof. Dr. H. von Ihering. daselbst.
9116 c. Erw. **Corrientes**, Rep. Argentina. Gesch. 1893 von Dir. Dr. Carlos Berg. Buenos Aires.
9116 d. Erw., 2 halb. Rio Grande do Sul. **Süd-Brasilien**. Gek. 1886—88 von Prof. Dr. H. von Ihering. daselbst.
9116 e. 2 erw. (Rüppell, Cat. III V 12 b—c als *Dipsas punctatissima*). **Ilheos, Brasilien**. Gesch. 1838 von Gebr. Koch. hier.

2. *Thamnodynastes punctatissimus* (Wgl.).

Boulenger, Cat. III pag. 117.

- 9117 a. Erw. (Rüppell, Cat. III V 12 a als *Dipsas*). **Ilheos, Brasilien**. Gesch. 1838 von Gebr. Koch. hier.

Genus XIII. Tachymenis Wgm.

1. *Tachymenis peruviana* Wgm.

Boulenger, Cat. III pag. 118.

- 9118 a. Erw. **Chile**. Gek. 1882 von Amtsrichter Müller. Lauterbach (Oberhessen).

Genus XIV. Hemirhagerrihis Bttgr.

1. *Hemirhagerrihis kelleri* Bttgr.

Boulenger, Cat. III pag. 119; Boettger, Zool. Anzeiger 1893 pag. 129.

9119.1a. Erw. Abdallah, südlich vom Webitfluße. **Somaliland**. Gek. 1893 von Prof. Dr. Konrad Keller, Zürich.

Genus XV. Tomodon D. B.

1. *Tomodon dorsatus* D. B.

Boulenger, Cat. III pag. 121.

9121a. 2 erw. Stadt Rio Grande do Sul, **Süd-Brasilien**. Gek. 1886 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.

Genus XVI. Amplorhinus Smith.

1. *Amplorhinus multimaculatus* Smith.

Boulenger, Cat. III pag. 125; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1887 pag. 157 (*Psammophylax*).

9125.1a. Erw. Tafelberg bei **Kapstadt**. Gesch. 1887 von Prof. Dr. Hans Schinz, Zürich.

2. *Amplorhinus nototaenia* (Gthr.).

Boulenger, Cat. III pag. 125.

9125a. Erw. Boroma am **Sambesi**. Gesch. 1894 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

Genus XVII. Pseudablables Blgr.

1. *Pseudablables agassizi* (Jan).

Boulenger, Cat. II pag. 259 (*Contia*) und III pag. 126.

9126a. 2 erw., 1 halbw. Rio Grande do Sul, **Süd-Brasilien**. Get. 1886—88 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.

Genus XVIII. Philodryas Wgl.

1. *Philodryas aestivus* (Schlg.).

Boulenger, Cat. III pag. 128.

9127a. Jung. Stadt Rio Grande do Sul, **Süd-Brasilien**. Gek. 1886 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.

2. *Philodryas viridissimus* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 129.

- 9128 a. Erw. (Rüppell, Cat. III P 6 a als *Herpetodryas*). **Surinam**. Gesch. 1836 von Dr. med. W. Siebel, hier.
9128 b. Jung. Sorata. **Bolivia**. Gesch. 1894 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.

3. *Philodryas olfersi* (Licht.).

Boulenger, Cat. III pag. 129; Boettger, Zeitschrift f. d. ges. Naturw. Bd. 58. 1885 pag. 234.

- 9129 a. Erw. (var. *latirostris* Cope). **Paraguay**. Get. 1886 vom Naturhist. Institut Linnaea, Berlin.
9129 b. 2 erw. (Typus). Stadt Rio Grande do Sul. **Süd-Brasilien**. Gek. 1887 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.
9129 c. 2 erw. (var. *reinhardti* Gthr.). Sorata. **Bolivia**. Gesch. 1891—94 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.
9129 d. Erw. (var. *latirostris* Cope). Ilheos, **Brasilien** (Rüppell, Cat. III P 6 b als *Herpetodryas viridissimus*). Gesch. 1836 von Gebr. Koch, hier.
9129 e. Erw. (dieselbe Varietät). **Süd-Amerika**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.
9129 f. Jung (Typus). **Corrientes**, Rep. Argentina. Gesch. 1893 von Prof. Dr. Carlos Berg, Buenos Aires.
9129 g. 2 erw. (Typus). **Brasilien** Rüppell, Cat. III P 3 a als *Herpetodryas*. Get. 1840 von Graf Jenison, Heidelberg.
9129 h. Erw. (Typus). **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Get. 1888 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.
9129 i. Erw. (Typus). **Ebendaher**. Gesch. 1873 von Oberlehrer Dr. Finger, hier.

4. *Philodryas schotti* (Schlg.).

Boulenger, Cat. III pag. 130; Boettger, Zeitschrift f. d. ges. Naturw. Bd. 58. 1885 pag. 235.

- 9130 a. 2 erw. **Corrientes**, Rep. Argentina. Gesch. 1893 von Direktor Dr. Carlos Berg, Buenos Aires.
9130 b. Erw. São Paulo. **Brasilien**. Gek. 1881 von Josef Duschanek, hier.
9130 c. 2 erw. **Central-Brasilien**. Gesch. 1886 von Konsul G. von Schröter, San José (Costa Rica).
9130 d. Erw. **Uruguay**. Get. 1884 vom Naturhist. Institut Linnaea, Berlin.

5. *Philodryas bolivianus* Blgr.

Boulenger, Cat. III pag. 132, Taf. 9, Fig. 1.

- 9131 a. Erw. Sorata. **Bolivia**. Gesch. 1891 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.

6. *Philodryas elegans* (Tschudi).

Boulenger, Cat. III pag. 133: Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1889 pag. 312 (*Tachymenis*).

9133.1a. Erw. und 2 Junge. Pacasmayo, **Nord-Peru**. Gesch. 1889 von Max Bamberger, hier.

Genus XIX. Trimerorhinus Smith.

1. *Trimerorhinus rhombeatus* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 138: Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1883 pag. 156 (*Psammodromus rhombeatus* var. *trilineatus*).

9138a. 3 erw. (Rüppell, Cat. III G 10a—c als *Coronella*). **Kapland**. Alte Sammlung 1845.

9138b. Erw. (var. *trilineata* Bttgr.). Smithfield, **Transvaal**. Gesch. 1882 von Hans Simon, Stuttgart.

9138c. Halbw. **Kapland**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.

Genus XX. Coelopeltis Wgl.

1. *Coelopeltis monspessulana* (Herm.).

Boulenger, Cat. III pag. 141: Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 9, 1874 pag. 161 (*insignitus*), Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. 49, 1877 pag. 287. Ber. Senck. Nat. Ges. 1879—80 pag. 162 und Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 13, 1883 pag. 103 (*lacertina*) und Sitz.-Ber. Berlin. Akad. 1888 pag. 177.

9141a. Erw. Landschaft Sus. **Süd-Marokko**. Gesch. 1872 von den Proff. Dr. Freih. C. von Fritsch, Halle (Saale), und J. J. Rein, Bonn.

9141b. Halbw. Sierra Nevada in 3—4000' bei Granada. **Süd-Spanien**. Erh. 1881 von der IV. Rüppellreise Dr. med. W. Kobelt's, Schwannheim (Main).

9141c. Erw. u. 2 Junge. Sarona bei Jaffa. **Syrien**. Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.

9141d. Erw. u. jung. Casablanca. **Marokko**. Gesch. 1881 von demselben.

9141e. Kopf u. jung. Prevesa. **Epirus**. Gesch. 1889 von César Conéménos, daselbst.

9141f. 2 halbw., 3 jung. Casablanca. **Marokko**. Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.

9141g. Erw. **Tunis**. Gesch. 1888 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

9141h. Erw. Tanger. **Marokko**. Erh. 1881 von der IV. Rüppellreise Dr. med. W. Kobelt's.

9141i. Erw. **Süd-Europa**. Gesch. 1886 von Hans Simon, Stuttgart.

9141k. Erw. u. 2 Junge. Biscra, **Algerien**. Erh. 1884 von der V. Rüppellreise durch Dr. med. W. Kobelt, Schwannheim (Main).

- 9141 l. Halbw. Xenochóri, **Nord-Euböa**. Gesch. 1891 von Fr. de Mimont. daselbst.
- 9141 m. Jung. **Süd-Europa**. Gesch. 1862 von Adam Becker. Sydney.
- 9141 n. Jung. Burbulitsa bei Volo. **Thessalien**. Gesch. 1888 von Josef Stussiner. Laibach.
- 9141 o. 2 Köpfe. Casablanca, **Marokko**. Gesch. 1889 von Dr. med. H. Schädle. Tanger.
- 9141 p. Jung. **Jerusalem**. Gesch. 1880 von Hans Simon. Stuttgart.
- 9141 q. 2 erw. Sarona bei Jaffa. **Syrien**. Gesch. 1881 von demselben.
- 9141 r. Erw. Landschaft Sus. **Süd-Marokko**. Gesch. 1872 von den Proff. Dr. C. v. Fritsch und J. J. Rein.
- 9141 s. Erw. (Rüppell, Cat. III R 1 a als *lacertina* var.). **Süd-Europa**. Alte Sammlung 1845.

2. *Coelopeltis moilensis* (Reuß).

Boulenger. Cat. III pag. 143: Reuß. Mus. Senck. Bd. 1. 1834 pag. 142. Taf. 7. Fig. 1 (*Coluber*).

- 9143 a. Erw. **Tunesien**. Gesch. 1896 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft. hier.
- 9143 b. Erw. Küstenreise ab Wargla. **Algerien**. Gesch. 1893 von Prof. Dr. A. König. Bonn.
- 9143 c. Erw. (Rüppell, Cat. III R 1 a als *lacertina* var.). **Arabien**. Gesch. 1834 von Dr. med. Eduard Rüppell. hier.
- 9143 d. 2 erw. **Süd-Tunis**. Gesch. 1897 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft. hier.

Genus XXI. Rhamphiophis Pts.

1. *Rhamphiophis multimaculatus* (Smith).

Boulenger. Cat. III pag. 148; Boettger. Ber. Senck. Nat. Ges. 1886 pag. 4 (*Dipsina*).

- 9148.1a. Erw. Route l'Aus-Angra Pequena. **Groß-Namaland**. Gesch. 1887 von Prof. Dr. Hans Schinz. Zürich.
- 9148.1b. Erw. Angra Pequena. **Groß-Namaland**. Gesch. 1886 von Prof. Dr. Oskar Schneider. Dresden.

Genus XXII. Dromophis Pts.

1. *Dromophis praeornatus* (Schlg.).

Boulenger. Cat. III pag. 150.

- 9150 a. Halbw. Akkra. **Goldküste**. Gesch. 1887 von Major Dr. L. von Heyden. hier.

Genus XXIII. Taphrometopon Brandt.

1. *Taphrometopon lineolatum* (Brandt).

Boulenger, Cat. III pag. 151.

- 9151 a. Erw. **Transkaspien**. Gesch. 1896 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.
9151 b. Erw. Tschikischljär, **Transkaspien**. Gesch. 1888 von Staatsrat Dr. Gustav von Radde, Excz., Tiflis.
9151 c. Erw. Tschinas, **Turkestan**. Get. 1879 vom Naturhistor. Museum, St.-Petersburg.
9151 d. Erw. Bacharden, **Transkaspien**. Gesch. 1896 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.
9151 e. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1896 von derselben.

Genus XXIV. Psammophis Boie.

1. *Psammophis schokari* (Forsk.).

Boulenger, Cat. III pag. 157; Reuß, Mus. Senck, Bd. I. 1834 pag. 139 (*Coluber lacrymans*); Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1879—80 pag. 63 (*moniliger* var. *hierosolymitana*), pag. 164 (*moniliger* var. *punctata*) und in Kobelt's Reise Alg. Tunis 1885 pag. 462 (*sibitans* var. *punctata*).

- 9157 a. Erw. (Typus). Bordj Saada bei Biscra, **Algerische Sahara**. Gesch. 1893 von Prof. Dr. Alex. König, Bonn.
9157 b. Erw. (Typus). Biscra, **Algerien**. Gek. 1885 von Louis Fischer, daselbst.
9157 c. Halb. (var. C). **Ägypten** (Rüppell, Cat. III Q 15 a als *Coluber floriceps*). Gesch. 1834 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.
9157 d. 2 erw. (Typus). Jaffa, **Syrien**. Gesch. 1879 von Major Dr. L. von Heyden, hier.
9157 e. Kopf u. 2 halb. (Typus). **Ebendaher**. Gesch. 1880 von Hans Simon, Stuttgart.
9157 f. 3 erw. (var. C). Tor, **Arabien** (Rüppell, Cat. III Q 1 d—e als *moniliger*). Gesch. 1834 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.
9157 g. 3 erw. (Typus). **Ägypten** (Rüppell, Cat. III Q 1 a—c als *moniliger*). Gesch. 1834 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.
9157 h. Erw. (Typus). **Süd-Tunis**. Gesch. 1896 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.
9157 i. 2 erw. (Typus u. var. C). **Ebendaher**. Gesch. 1897 von derselben.

2. *Psammophis punctulatus* D. B.

Boulenger, Cat. III pag. 159; Boettger, Zool. Anzeiger 1893 pag. 119.

- 9159 a. Erw. Rüppell, Cat. III Q 4 a. **Arabien**. Gesch. 1845 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.

3. *Psammophis sibilans* (L.).

- Boulenger, Cat. III pag. 161; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 12, 1881 pag. 395 und Ber. Senck. Nat. Ges. 1877—88 pag. 53.
- 9162 a. Erw. (var. D). **Abessinien**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.
- 9162 b. Erw. (var. F). **West-Afrika**. Get. 1875 von Oberlehrer J. Blum, hier.
- 9162 c. Erw. (var. F). Povo Netonna bei Banana. **Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.
- 9162 d. Erw. (Typus). Angra Pequena. **Groß-Namaland**. Gesch. 1886 von Prof. Dr. Oskar Schneider, Dresden.
- 9162 e. Erw. (Typus). Route l'Ans-Angra Pequena. **Groß-Namaland**. Gesch. 1887 von Prof. Dr. Hans Schinz, Zürich.
- 9162 f. Erw. (var. F). Odumase. **Ost-Goldküste**. Gesch. 1892 von Hans Simon, Stuttgart.
- 9162 g. Erw. (var. F). Banana. **Unter-Congo**. Gek. 1885 von Paul Hesse.
- 9162 h. Halbw. (var. F). **Kapland?** Rüppell, Cat. III Q 2 a als *crucifer?*. Alte Sammlung 1845.
- 9162 i. 2 erw., 1 jung (var. F). Banana. **Unter-Congo**. Gek. 1886 von Paul Hesse.
- 9162 k. 2 erw. **Ebendaher**. Gek. 1886 von demselben.
- 9162 l. 2 erw. (var. E und F). Peccetoni, **Wituland**, Ost-Afrika. Gesch. 1897 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.
- 9162 m. Erw. (Typus). **Ägypten**. Gesch. 1897 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

4. *Psammophis elegans* (Shaw).

- Boulenger, Cat. III pag. 167; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 12, 1881 pag. 395.
- 9167 a. Erw. Odumase. **Ost-Goldküste**. Gesch. 1892 von Hans Simon, Stuttgart.
- 9167 b. Erw. **Lagos**, West-Afrika. Gek. 1877 von Hamburg.

5. *Psammophis crucifer* (Daud.).

- Boulenger, Cat. III pag. 169; Boettger, 22./23. Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1883 pag. 156.
- 9169 a. Erw. **Kapland**. Get. 1882 von Oberlehrer J. Blum, hier.
- 9169 b. Erw. (Varietät ohne Querbinden auf dem Nacken). Smithfield, **Transvaal**. Gesch. 1882 von Hans Simon, Stuttgart.

6. *Psammophis angolensis* (Boc.).

- Boulenger, Cat. III pag. 170; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 55 (*Dromophis*).
- 9170 a. Erw. Ambrizette. **Angola**. Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.

Genus XXV. Mimophis Gthr.

1. *Mimophis mahfalensis* (Grand.).

Boulenger, Cat. III pag. 171; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 12, 1881 pag. 445 (*madagascariensis*).

- 9171 a. 2 erw. Insel **Nossibé**. Gesch. 1880—85 von Konsul Carl Ebenau und Anton Stumpff, Loucoubé.
9171 b. 2 halbw. **Ebendaher**. Gesch. 1897 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.
9171 c. Halbw. Soalala. **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von demselben.
9171 d. 4 erw. Majunga. **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von demselben.
9171 e. 3 erw. Kandani, Süd-Bembatokabai, **West-Madagaskar**. Gesch. 1892 von demselben.

Genus XXVI. Psammodynastes Boie.

1. *Psammodynastes pulverulentus* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 172.

- 9172 a. Erw. Vulkan Pengalengan, **West-Java**. Gek. 1895 von Hans Fruhstorfer, Berlin.
9172 b. Erw. Baramfluß in **Nord-Borneo**. Erb. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.
9172 c. Erw. **West-Java**. Gek. 1893 von Hans Fruhstorfer.
9172 d. 2 halbw. Insel **Leyte**, Philippinen. Gesch. 1893 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
9172 e. 2 Ste. **Mittel-Luzon**, Philippinen. Gesch. 1890 von demselben.
9172 f. Erw. Tenggergebirge in 1200 m. **Ost-Java**. Gek. 1891 von Hans Fruhstorfer.
9172 g. Erw. (Rüppell, Cat. III Q 3a als *Psammophilis*). **Java**. Gesch. 1840 von Dr. W. von Siebold, Leiden.
9172 h. 2 halbw. Insel **Mindanao**, Philippinen. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff.
9172 i. Erw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1892 von Dr. med. O. Benecke, daselbst.
9172 k. Halbw. **Ebendaher**. Gesch. 1879 von W. von Schouler, Wiesbaden.
9172 l. Halbw. Bindjey in Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1890 von Theodor und Egbert Engelhard, daselbst.
9172 m. Erw. Insel **Samar**, Philippinen. Gesch. 1897 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff.

2. *Psammodynastes pictus* Gthr.

Boulenger, Cat. III pag. 171.

- 9174 a. Erw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1894 von Wwe. H. Krämer, hier.
9174 b. Halbw. Insel **Bangka**. Gesch. 1886 von Prof. Dr. Oskar Boettger, hier.

Genus XXVII. Macroprotodon Guich.

1. *Macroprotodon cucullatus* (Geoffr.).

Boulenger, Cat. III pag. 175; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 12, 1880 pag. 374 und pag. 387, Bd. 13. 1883 pag. 96 und in Kobelt's Reise Alg. Tunis. 1885 pag. 457 (*Coronella*).

- 9175 a. Halb. Zeuatta (Stuatta), 8 Stunden von Casablanca. **Marokko**.
Gesch. 1893 von Dr. med. H. Schädle, Tanger.
- 9175 b. Erw. Tisi Tacherat, **Marokko**. Gesch. 1873 von den Prof. Dr. C. von Fritsch, Halle (Saale), und J. J. Rein, Bonn.
- 9175 c. 2 erw. Palma auf Mallorca. **Balearen**. Gek. 1880 von Prem.-Lieut. Dr. Friedr. Will, Erlangen.
- 9175 d. 2 erw. Algeciras, **Süd-Spanien**. Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.
- 9175 e. Erw. Casablanca, **Marokko**. Gesch. 1889 von Dr. med. H. Schädle.
- 9175 f. Erw. u. 4 halb. **Ebendaher**. Erh. 1881 von Hans Simon und von der IV. Ruppellreise Dr. med. W. Kobelt's, Schwanheim (Main).
- 9175 g. Zahlr. Ste. Tanger, **Marokko**. Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.
- 9175 h. 3 erw., 3 jung. Stadt **Marokko**. Gesch. 1881 von demselben.
- 9175 i. Erw. Biscra. Prov. Constantine. **Algerien**. Erh. 1885 von der V. Ruppellreise Dr. med. W. Kobelt's, Schwanheim (Main).

Genus XXVIII. Dryophis Dalm.

1. *Dryophis dispar* (Gthr.).

Boulenger, Cat. III pag. 179.

- 9179 a. 4 Ste. Kodaikanal, Palni Hills, **Süd-Indien**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb, Madras.

2. *Dryophis fronticinctus* Gthr.

Boulenger, Cat. III pag. 179.

- 9179.1 a. Erw. **Pegu**, Hinterindien. Gesch. 1887 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

3. *Dryophis prasinus* Boie.

Boulenger, Cat. III pag. 180.

- 9181 a. Erw. Minalassa auf **Celebes**. Erh. 1895 von der Ruppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.
- 9181 b. 4 Ste. Baramfluß in **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von derselben.
- 9181 c. Halb. (var. *lacta* Cope). Umgebung von Manila. **Luzon**. Gesch. 1891 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
- 9181 d. Erw. (Ruppell. Cat. III U 1 a als *Dryinus sasutus*). **Java**. Gesch. 1838 von Dr. med. Peitsch, Batavia.
- 9181 e. Halb. Atschin. **Nord-Sumatra**. Gek. 1882 von Konrad Kläsi, Zürich.

- 9181 f. Halbw. (var. *laeta* Cope). Insel **Cebu**, Philippinen. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff.
- 9181 g. Erw. Pontianak, **West-Borneo**. Gesch. 1893 von Baron Albert von Reinach, hier.
- 9181 h. 3 halbw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens Hohwiesner, hier.
- 9181 i. Erw. **Ostindien**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.
- 9181 k. 2 erw. Bindjey in Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1890 von Theodor und Egbert Engelhard, hier.
- 9181 l. Halbw. (Rüppell, Cat. III U 2 c als *Dryinus*). **Java**. Get. 1838 vom Rijksmuseum in Leiden.
- 9181 m. 2 Ste. Insel **Bangka**. Gek. 1881 von Konrad Kläsi, Zürich.
- 9181 n. 2 Ste. Insel Culion, **Calamianes**, Philippinen. Gesch. 1893 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff.
- 9181 o. 2 halbw. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.
- 9181 p. 2 erw. (Rüppell, Cat. III U 2 a—b als *Dryinus*). **Java**. Gesch. 1838 von Dr. W. von Siebold, Leiden.
- 9181 q. Zahlr. Ste. (var. *laeta* Cope). **Mittel-Luzon**. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff.
- 9181 r. Erw. Banjarmasin, **Südost-Borneo**. Gek. 1894 von Wwe. H. Krieb, hier.
- 9181 s. Erw. Dongala Kabonga, **West-Celebes**. Erh. 1894 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

4. *Dryophis fasciolatus* (Fisch.).

Boulenger, Cat. III pag. 182.

- 9182 a. Jung. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens Hohwiesner, hier.

5. *Dryophis mycterizaus* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 182.

- 9183 a. 2 erw. **Ceylon**. Gesch. 1846 von H. Worms, hier.
- 9183 b. Erw. (Rüppell, Cat. III U 1 b als *Dryinus nasutus*). **Bengalen**. Gesch. 1838 von Dr. med. Peitsch, Batavia.
- 9183 c. 4 Ste. **Madras**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.
- 9183 d. Erw. **Siam**. Gesch. 1885 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

Genus XXIX. *Thelotornis* Smith.

1. *Thelotornis kirtlandi* (Hallow.).

Boulenger, Cat. III pag. 185; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 65 (*Dryiophis*).

- 9185 a. Erw. **Gabun**. Gek. 1877 von Hamburg.

- 9185 b. 2 erw. Povo Netonna bei Banana. **Unter-Congo.** Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.
9185 c. Erw. ♀ mit Eiern. Povo Nemlao bei Banana. **Unter-Congo.** Gek. 1886 von demselben.
9185 d. Erw. **Kamerun.** Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz. Berlin.

Genus XXX. Dispholidus Duvern.

1. *Dispholidus typus* (Smith).

Boulenger, Cat. III pag. 187: Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 12, 1881 pag. 397 (*Bucephalus capensis*).

- 9187 a. 2 erw. (var. *belli* Smith). **Süd-Afrika.** Gesch. 1873 von Dr. Löwenthal, hier.
9187 b. Erw. (Typus). **Ebendaher.** Gesch. 1873 von demselben.

Genus XXXI. Oxybelis Wyl.

1. *Oxybelis acuminatus* (Wied).

Boulenger, Cat. III pag. 192: Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1889 pag. 314 (*Dryiophis*).

- 9192 a. Erw. Insel **Tobago**, Westindien. Gesch. 1894 von Albrecht Seitz, Hamburg.
9192 b. Erw. Retalhuleu. **Guatemala.** Gesch. 1895 von Carl Fleischmann, daselbst.
9192 c. Jung **Trinidad.** Gesch. 1893 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.
9192 d. Erw. Pacasmayo, **Nord-Peru.** Gesch. 1889 von Max Bamberger, hier.
9192 e. 2 erw. (Rüppell, Cat. III U 3a—b als *Dryinus aeneus*). **Ilheos, Brasilien.** Gesch. 1837 von Gebr. Kech, hier.
9192 f. Erw. Carácas. **Venezuela.** Gek. 1897 von Ingenieur Müller, hier.

Genus XXXII. Chrysopelea Boie.

1. *Chrysopelea rhodopleuron* Boie.

Boulenger, Cat. III pag. 195.

- 9195 1a. Erw. Wai auf Hitu. **Nord-Amboina.** Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

2. *Chrysopelea ornata* (Shaw).

Boulenger, Cat. III pag. 196: Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1888 pag. 84.

- 9196 a. 2 halbw. (var. A.). Atschin, **Nord-Sumatra.** Gek. 1882 von Konrad Kläsi, Zürich.

- 9196 b. Erw. (var. A). Stabat Estate in Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1893 von Fritz Beyschlag, daselbst.
- 9196 c. Halbw. (var. B). Baramfluß in **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.
- 9196 d. Erw. (var. B). Insel **Samar**, Philippinen. Gesch. 1897 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
- 9196 e. 5 Ste. (var. B u. H). **Mittel-Luzon**. Gesch. 1890 von demselben.
- 9196 f. 2 erw. (var. D). **Siam**. Gesch. 1885 von demselben.

3. *Chrysopelea chrysochlora* (Schlg.).

Boulenger, Cat. III pag. 198.

- 9198 a. Erw. Insel **Bangka**. Gek. 1881 von Konrad Kläsi, Zürich.
- 9198 b. Erw. Sultanat Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens Hohwiesner, hier.

Genus XXXIII. Erythrolamprus Wgl.

1. *Erythrolamprus aesculapii* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 200.

- 9200 a. Erw. (var. *venustissima* Wied). San José. **Costa Rica**. Gesch. 1894 von Konsul Guido von Schröter, daselbst.
- 9200 b. Erw. (dieselbe Varietät). **Ebendaher**. Gesch. 1892 von Carl Fleischmann, daselbst.
- 9200 c. Erw. (var. *agilis* L.). **Surinam**. Alte Sammlung 1845.
- 9200 d. 2 erw. (typ.). **Brasilien** (Rüppell, Cat. III G 1 b—c als *venustissimus*). Gesch. 1828 von Cordier.
- 9200 e. Jung (var. *tetrazona* Jan). Sorata. **Bolivia**. Gesch. 1891 von Dr. Heinr. Lenz, Lübeck.
- 9200 f. Erw. (var. *monozona* Jan). Ilheos, **Brasilien** (Rüppell, Cat. III G 1 a als *venustissimus*). Gesch. 1828 von Gebr. Koch, hier.
- 9200 g. 4 Ste. (var. *tetrazona* Jan). Mapiri, Nebenfluß des oberen Beni. **Bolivia**. Gesch. 1888 von Ferdinand Emmel, Arequipa.
- 9200 h. 2 erw. (var. *guentheri* Garm.). **Surinam** (Rüppell, Cat. III G 2 b—c als *agilis*). Get. 1830 vom Rijksmuseum in Leiden.
- 9200 i. 3 erw. (var. *agilis* L.). **Surinam** (Rüppell, Cat. III G 2 d—f als *agilis*). Alte Sammlung 1845.
- 9200 k. Erw. u. 2 Junge (var. *venustissima* Wied). **Central-Brasilien**. Gesch. 1896 von Konsul Guido von Schröter, San José (Costa Rica).
- 9200 l. Erw. (var. *monozona* Jan). Medellin. **U. S. Columbia**. Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel, Jena.
- 9200 m. Erw. (var. *venustissima* Wied). Amalfi. **U. S. Columbia**. Gek. 1897 von demselben.
- 9200 n. Erw. (dieselbe Varietät). Carácas. **Venezuela**. Gek. 1897 von Ingen. Müller, hier.

2. *Erythrolamprus fissidens* (Gthr.).

Boulenger, Cat. III pag. 207.

9207 a. 3 erw. Retalhuleu, **Guatemala**. Gesch. 1895 von Carl Fleischmann, daselbst.

3. *Erythrolamprus bipunctatus* (Gthr.).

Boulenger, Cat. III pag. 208.

9208 a. Halbw. **Nicaragua**. Gesch. 1892 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

Genus XXXIV. Homalocranium D. B.

1. *Homalocranium melanocephalum* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 215.

9215 a. Halbw. **Trinidad**. Gesch. 1895 von F. W. Urich und R. R. Mole. Port of Spain.

9215 b. Halbw. (var. *pallida* Cope). **U. S. Columbia**. Gesch. 1894 von Konsul F. C. Lehmann, Popayán.

9215 c. Halbw. **Trinidad**. Gesch. 1893 von F. W. Urich und R. R. Mole.

9215 d. Erw. (Rüppell, Cat. III G 9 a als *Coronella*). **Surinam**. Alte Sammlung 1845.

9215 e. Erw. (var. *pallida* Cope). **Central-Brasilien**. Gesch. 1896 von Konsul Guido von Schröter, San José (Costa Rica).

2. *Homalocranium semicinatum* D. B.

Boulenger, Cat. III pag. 219.

9219.1 a. Erw. Baranquilla im Magdalenathal. **U. S. Columbia**. Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel, Jena.

3. *Homalocranium schistosum* Boet.

Boulenger, Cat. III pag. 221.

9221.1 a. Erw. Matagalpa, **Nicaragua**. Gesch. 1897 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

4. *Homalocranium planiceps* (Blainv.).

Boulenger, Cat. III pag. 226.

9226.1 a. Halbw. **Florida**. Gesch. 1896 von Dr. med. A. Zipperlen, Cincinnati (Ohio).

Genus XXXV. Stenorhina D. B.

1. *Stenorhina degenhardti* (Berth.).

Boulenger, Cat. III pag. 229.

- 9230 a. 2 erw. (var. Bc). **Mexiko**. Gek. 1846 von H. Finckh, Ludwigsburg.
9230 b. Erw. (var. A). **Caracas, Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller.
hier.

Genus XXXVI. Apostolepis Cope.

1. *Apostolepis assimilis* (Reinh.).

Boulenger, Cat. III pag. 234.

- 9234 a. 3 erw. **Central-Brasilien**. Gesch. 1896 von Konsul Guido von Schröter.
San José (Costa Rica).

Genus XXXVII. Elapomorphus D. B.

1. *Elapomorphus lemniscatus* D. B.

Boulenger, Cat. III pag. 242.

- 9242 a. Erw. u. 2 Junge **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Get. 1888 von
Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.
9242 b. Erw. **Ebendaher**. Gesch. 1873 von Oberlehrer Dr. Finger, hier.

Genus XXXVIII. Xenocalamus Gthr.

1. *Xenocalamus mechowi* Pts.

Boulenger, Cat. III pag. 248; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges.
1888 pag. 47

- 9248.1 a. Erw. Kinshassa am Stanley Pool, **Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse.
Venedig.

Genus XXXIX. Micrelaps Bttgr.

1. *Micrelaps muelleri* Bttgr.

Boulenger, Cat. III pag. 249; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges.
1879—80 pag. 137, Taf. 3, Fig. 2.

- 9249 a. 3 erw. **Jerusalem**. Gesch. 1879—84 von Hans Simon, Stuttgart.

Genus XL. Aparallactus Smith.

1. *Aparallactus weneri* Blgr.

Boulenger, Cat. III pag. 257, Taf. 11, Fig. 1.

- 9257 a. Erw. **Usambara, Ost-Afrika**. Get. 1896 vom Naturh. Museum in
Berlin.

Genus XLI. Elapops Gthr.

1. *Elapops modestus* Gthr.

Boulenger, Cat. III pag. 262.

- 9263 a. Erw. **Groß-Popo**, West-Afrika. Gesch. 1894 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
9263 b. Erw. **Kamerun**. Gesch. 1896 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.
9263 c. 3 Ste. **Ebendaher**. Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz, Berlin.

Subfamilie 6. Hydrophiinae.

Genus I. Hydrus Schnl.

1. *Hydrus platurus* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 267; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1892 pag. 88.

- 9267 a. Jung (Typus: Monstrosität mit vier Nasalen und vier Nasenlöchern). **Ceylon**. Gek. 1889 von Hans Fruhstorfer, Berlin.
9267 b. Halbw. (Typus: Manila, **Luzon**. Gesch. 1830 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, daselbst.
9267 c. Halbw. (var. *ornata* Gray). **Südsee**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.
9267 d. Erw. (Typus). **Südsee**. Gek. 1879 von demselben.
9267 e. 2 erw. (var. *ornata* Gray). **Indischer Ocean** (Rüppell, Cat. III Y 2 a—b als *Hydrophis pelamis*). Gesch. 1838 von Dr. W. von Siebold, Leiden.
9267 f. Halbw. (Typus). **Java** (Rüppell, Cat. III Y 3 a als *Hydrophis bicolor*). Gesch. 1836 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.
9267 g. Erw. (Übergang vom Typus zur var. *maculata* Jan). **Ceylon**. Gesch. 1881 von Gustav Herath, hier.
9267 h. Erw. u. jung (Typus). Bai von Manila. **Luzon**. Gesch. 1891 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff.
9267 i. Halbw. **Java**. Gesch. 1896 von Direktor August Siebert, hier.

Genus II. Hydrophis Daud.

1. *Hydrophis caeruleus* (Shaw).

Boulenger, Cat. III pag. 275.

- 9275.1a. Halbw. **Madras**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.

2. *Hydrophis gracilis* (Shaw).

Boulenger, Cat. III pag. 280; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1892 pag. 89.

- 9280 a. Halbw. **Madras**. Gesch. 1890 von Theodor Kolb, daselbst
9280 b. Erw. Insel **Hainan**, Süd-China. Gek. 1886 von Otto Herz, St.-Petersburg.

3. *Hydrophis cantoris* Gthr.

Boulenger. Cat. III pag. 281. Taf. 14: Boettger, Ber. Senck.
Nat. Ges. 1889 pag. 304.

9281 a. Erw. u. halbw. **Madras**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb. daselbst.

4. *Hydrophis fasciatus* (Schnd.).

Boulenger. Cat. III pag. 281: Boettger. Ber. Offenbach. Ver. f.
Naturk. 1892 pag. 89 und 155.

9281.1 a. Jung. Bai von Manila. **Luzon**. Gesch. 1891 von Konsul Dr. O. Fr.
von Moellendorff, Manila.

9281.1 b. Erw. ♂. Yaeyama auf Mijakoshima. **Südliche Liukiu-Inseln**. Gesch.
1895 von Bernhard Schmacker. Shanghai.

Genus III. Distira Lacép.

1. *Distira ornata* (Gray).

Boulenger. Cat. III pag. 290: Boettger. Zool. Anzeiger 1888
pag. 397 (*Hydrophis*).

9290 a. 2 halbw. **Süd-Luzon**, Philippinen. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O.
Fr. von Moellendorff, Manila.

9290 b. 2 erw., 3 jung. **Mittel-Luzon**. Gesch. 1890 von demselben.

9290 c. Zahlr. Ste. Bai von Manila. **Luzon**. Gesch. 1891 von demselben.

2. *Distira brugmansi* (Boie).

Boulenger. Cat. III pag. 292.

9292.2 a. Erw. ♂. **Madras**. Gesch. 1890 von Theodor Kolb, daselbst.

9292.2 b. Erw. ♀. **Ebendaher**. Gesch. 1890 von demselben.

3. *Distira cyanocincta* (Daud.).

Boulenger. Cat. III pag. 294: Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f.
Naturk. 1892 pag. 90.

9295 a. Erw. (var. A). **Bombay**. Gesch. 1888 von Prof. Dr. Ferdinand Richters.
hier.

9295 b. Halbw. (var. D). Batavia, **West-Java**. Gesch. 1894 von Prof. Dr. R.
W. Semon. Jena.

9295 c. Erw. ♂ (var. B). Bai von Manila, **Luzon**. Gesch. 1891 von Konsul
Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

9295 d. Erw. ♀ (var. D). Insel **Hainan**, Süd-China. Gek. 1885 von Otto Herz,
St.-Petersburg.

9295 e. 6 halbw. Ste. (var. B). Bai von Manila, **Luzon**. Gesch. 1888 von
Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff.

9295 f. Erw. u. 4 Junge (var. A). See Taal, **Luzon**. Gesch. 1897 von dem-
selben.

4. *Distira viperina* (Schmidt).

Boulenger, Cat. III pag. 298; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1888 pag. 91 (*Hydrophis*).

9298 a. Erw. ♀. Insel **Hainan**, Süd-China. Gek. 1886 von Otto Herz, St.-Petersburg.

5. *Distira jerdoni* (Gray).

Boulenger, Cat. III pag. 299; Boettger, Mitth. Geogr. Ges. u. Nat. Mus. Lübeck (2) Bd. 5, 1893 p.

9299 a. Erw. **Ceylon**. Gek. 1889 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

Genus IV. Enhydris Merr.

1. *Enhydris hardwickei* (Gray).

Boulenger, Cat. III pag. 301; Boettger, Zool. Anzeiger 1888 pag. 396 (*Hydrophis loreatus*).

9301 a. 6 Ste. Bai von Manila. **Luzon**. Gesch. 1891 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

Genus V. Enhydrina Gray.

1. *Enhydrina valakadien* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 302.

9302 a. Erw. (Rüppell, Cat. III Y 1 a als *Hydrophis schistosus*). **Indischer Ocean**. Gesch. 1836 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.

9302 b. 2 erw. **Madras**. Gesch. 1890 von Theodor Kolb, daselbst.

Genus VI. Aepysurus Lacép.

2. *Aepysurus eydouxi* (Gray).

Boulenger, Cat. III pag. 304; Boettger, Zool. Anzeiger 1892 pag. 420 (*anguilliformis*).

9304 a. Erw. **Java**. Gesch. 1896 von Direktor August Siebert, hier.

9304 b. Jung. **Singapore**. Gesch. 1892 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

Genus VII. Platurus Daud.

1. *Platurus laticaudatus* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 307.

9307 a. Halb. Patani auf **Halmahera**, Molukken. Erh. 1895 von der Rüppell-reise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

9307 b. Halb. Insel **Ternate**. Erh. 1895 von derselben.

9307 c. Halb. Atschin, **Nord-Sumatra**. Gesch. 1891 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

2. *Platurus colubrinus* (Schnd.).

Boulenger, Cat. III pag. 308.

- 9308 a. Halb. Insel **Ternate**. Erh. 1895 von der Ruppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.
- 9308 b. 2 halb. Manila auf **Luzon**. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, daselbst.
- 9308 c. Halb. **Neuholland**. Gesch. 1862 von Adam Becker, Sydney.
- 9308 d. Erw. **Südsee**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.
- 9308 e. Halb. Tonga-Tabu, **Tonga-Inseln**. Gek. 1877 von Hamburg.
- 9308 f. 2 ♂, 4 ♀. Insel **Cebú**, Philippinen. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff.

Subfamilie 7. Elapinae.

Genus I. Ogmodon Pts.

1. *Ogmodon vitianus* Pts.

Boulenger, Cat. III pag. 313.

- 9313 a. Erw. u. jung. Viti Levu, **Fidji-Inseln**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.

Genus II. Pseudelaps D. B.

1. *Pseudelaps muelleri* (Schlg.).

Boulenger, Cat. III pag. 316; Boettger in Semon's Zool. Forsch. Heft 5. 1894 pag. 121 (*Diemenia*).

- 9316 a. Erw. **Südost-Neuguinea**. Gesch. 1894 von Prof. Dr. R. W. Semon, Jena.

2. *Pseudelaps harriettae* (Kreffl.).

Boulenger, Cat. III pag. 318.

- 9318.2 a. Erw. **Queensland**. Gesch. 1872 von Konservator Adam Koch, hier.

3. *Pseudelaps diadema* (Schlg.).

Boulenger, Cat. III pag. 319.

- 9319 a. Halb. Port Bowen, **Nord-Australien**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.

Genus III. Diemenia Gray.

1. *Diemenia maculiceps* n. sp.*)

Boettger in Semon's Zool. Forsch. in Austr. Heft 5. Schlangen.
1894 pag. 118 (*olivacea*, non Gray).

9321 a. Erw. Burnett River. **Queensland.** Gesch. 1894 von Prof. Dr. R. W. Semon. Jena.

2. *Diemenia psammophis* (Schlg.).

Boulenger. Cat. III pag. 322: Jan. Icon. Oph. Lief. 43. Taf. 3.
Fig. 3 (*Pseudelaps*).

9322 a. 2 halbw. (Typus). Sydney. **Neusüdwaless.** Gesch. 1862 von Adam Becker. daselbst.

*1) Nächstverwandte der *D. psammophis* (Schlg.), aber mit nur 66—69 Subcaudalen, auf der Schnauzenspitze weiter nach hinten übergebogenem und hier zugespitztem Rostrale, relativ kleineren Internasalen und wesentlich anderer Kopfzeichnung. — Auge groß, Rostrale so hoch wie breit, sein oberer Teil so lang wie die Internasalsatur; Internasalen halb so lang wie die großen Praefrontalen; Frontale nicht breiter als das einzelne Supraoculare, $2\frac{1}{4}$ mal so lang wie vorne breit, so lang wie sein Abstand von der Schnauzenspitze und so lang wie die Parietalen. Nasale geteilt, praenasaler Teil vorn doppelt so hoch wie die höchste Erhebung des postnasalen Teiles, in Berührung mit dem einzigen Praeoculare; zwei Postocularen, Temporalen 2 + 2, das untere vordere zwischen dem fünften und sechsten Supralabiale eingeschoben. Sechs Supralabialen, von denen das dritte und das vierte das Auge berühren; drei Infralabialen in Berührung mit den vorderen Kinnschildern, die wesentlich kürzer sind als die hinteren.

Schuppenformel: Squ. 15; G. 4, V. 175—176, A. $1\frac{1}{2}$, Sc. $6\frac{6}{66}$ — 69 + 1.

Oben olivengrün, jede Schuppe mit schwarzer Spitze und mit schmalen schwarzen Säumen, viele mit weißen Außenrändern, was der Zeichnung ein engmaschiges Aussehen giebt. Kopfschilder mit schmalen schwarzen Säumen und je einem schwarzen Rundflecken auf den Praefrontalen und je zweien auf den Supraocularen; Rostrale ohne dunkle Querlinie; Auge von einem gelblichen Kreis umgeben, der von einem geschlossenen schwarzen Kreise umrahmt wird; sechstes Supralabiale und vorderes unteres Temporale mit je einem runden schwarzen Mittelflecken. Unterseite graugrün, die Ventralen an den Hinterrändern seitlich leicht angedunkelt; Kopf- und Halsunterseite und die letzte Hälfte des Schwanzes unten chrongelb. — Die Schwarzfleckung im Umkreis des Auges läßt sich in keiner Weise auf die so charakteristische Zeichnung bei *D. psammophis* (Schlg.) zurückführen, was mich in erster Linie bestimmt hat, die Art von ihr abzutrennen.

Maße: Totallänge 820, Schwanzlänge 172 mm.

9322 b. Halbw. (var. *reticulata* Gray). **Queensland.** Gek. 1887 von C. A. Pöhl. Hamburg.

9322 c. Erw. (Typus). **Neusüdwales** (Original von Jan's oben citierter Abbildung). Alte Sammlung 1845.

3. *Diemenia textilis* (D. B.).

Boulenger, Cat. III pag. 325.

9325 a. Erw. u. jung. Sydney. **Neusüdwales.** Gesch. 1844 von Konsul Kirchner. Wiesbaden, und 1862 von Adam Becker, Sydney.

Genus IV. Pseudechis Wgl.

1. *Pseudechis porphyriacus* (Shaw).

Boulenger, Cat. III pag. 328.

9328 a. Erw. (Rüppell, Cat. III 0 18 a als *Coluber porphyreus*). **Neuholland.** Get. 1838 vom Naturh. Hofmuseum. Wien.

Genus V. Denisonia Krefft.

1. *Denisonia coronata* (Schlg.).

Boulenger, Cat. III pag. 335; Jan, Icon. Ophid. Lief. 44, Taf. 1, Fig. 3 (*Alecto*).

9335 a. Erw. **West-Australien** (Original zu Jan's oben citierter Abbildung). Gesch. 1862 von Adam Becker, Sydney.

2. *Denisonia signata* (Jan).

Boulenger, Cat. III pag. 338.

9338.2 a. Erw. u. jung. Sydney. **Neusüdwales.** Gesch. 1847—62 von Konsul W. Kirchner. Wiesbaden, und Adam Becker, Sydney.

3. *Denisonia daemeli* (Gthr.).

Boulenger, Cat. III pag. 339. Taf. 18. Fig. 3.

9339 a. Erw. **Queensland.** Gek. 1887 von C. A. Pöhl. Hamburg.

4. *Denisonia maculata* (Stdchr.).

Boulenger, Cat. III pag. 341.

9341 a. Erw. **Queensland.** Gek. 1887 von C. A. Pöhl. Hamburg.

Genus VI. Micropechis Blgr.

1. *Micropechis ikaheka* (Lesson).

Boulenger, Cat. III pag. 347.

9347 a. Halbw. **Neuguinea**. Gesch. 1897 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

Genus VII. Hoplocephalus Cuv.

1. *Hoplocephalus bitorquatus* (Jan).

Boulenger, Cat. III pag. 349; Jan. Icon. Oph. Lief. 43. Taf. 6, Fig. 6 (*Alecto*).

9349 a. Erw. Sydney, **Neusüdwaies** (Originalexemplar dieser Art; vergl. Jan. Rev. et Mag. Zool. 1859 pag. 128 und l. c.). Gesch. 1848 von Konsul W. Kirchner. Wiesbaden.

Genus VIII. Acanthopphis Daud.

1. *Acanthopphis antarcticus* (Shaw).

Boulenger, Cat. III pag. 355; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1892 pag. 155.

9355 a. Erw. **Key-Inseln**. Gesch. 1887 von Prof. Dr. Max Braun, Rostock.

9355 b. Erw. Stadt Haruku, Insel **Haruku** bei Ceram. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

9355 c. Erw. (gestopft). **Neuholland** (Rüppell, Cat. III HH 1a als *cerastinus*). Get. 1832 vom British Museum (N. H.), London.

Genus IX. Elapechis Blgr.

1. *Elapechis guentheri* (Boc.).

Boulenger, Cat. III pag. 359; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 82 (*Elapsoidea*).

9358 a. 2 erw. Povo Namlao bei Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1886 von Paul Hesse, Venedig.

2. *Elapechis hessei* (Bttgr.).

Boulenger, Cat. III pag. 360; Boettger, Zool. Anzeiger 1887 pag. 651 und Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 83, Taf. 2, Fig. 6 (*Elapsoidea*).

9360 a. Halbw. Povo Netonna bei Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1886 von Paul Hesse, Venedig.

3. *Elapechis boulengeri* (Bttgr.).

Boulenger, Cat. III pag. 361; Boettger, Zool. Anzeiger 1895 pag. 92 (*Elapsoidea*).

9361 a. Halbw. Boroma am **Sambesi**. Gesch. 1895 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

Genus X. Bungarus Daud.

1. *Bungarus fasciatus* (Schnd.).

Boulenger, Cat. III pag. 366; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1885 pag. 16 und 1888 pag. 86.

9366 a. Erw. **Java**. Gek. 1879 von Hamburg.

9366 b. Erw. Baramfluß in **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

9366 c. Erw. u. jung. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

9366 d. Erw. Stabat Estate, Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1893 von Fritz Beyschlag, daselbst.

9366 e. Erw. (Rüppell, Cat. III Z 1 a als *annularis*). **Java**. Gesch. 1838 von Dr. W. von Siebold, Leiden.

9366 f. Erw. Kanton, **Süd-China**. Gesch. 1885 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

2. *Bungarus ceylonicus* Gthr.

Boulenger, Cat. III pag. 367, Taf. 19, Fig. 3.

9367 a. Erw. u. 2 Junge. **Ceylon**. Gesch. 1846 von H. Worms, hier.

3. *Bungarus candidus* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 368; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1885 pag. 16 (*semifasciatus*) und 1888 pag. 86 (*multicinctus*).

9368 a. Erw. u. jung. Reich Jolo, **Java**. Gesch. 1868—86 von E. Lörersch und Oberlehrer J. Blum, hier.

9368 b. Erw. (Rüppell, Cat. III Z 2 c als *semifasciatus*). **Java**. Gesch. 1832 von Dr. W. von Siebold, Leiden.

9368 c. Erw. **Java**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.

9368 d. 4 Ste. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

9368 e. 2 halbw. (Rüppell, Cat. III Z 2 a—b als *semifasciatus*). **Java**. Gesch. 1838 von Dr. med. Peitsch, Batavia.

var. *multicincta* Blyth.

Boulenger, l. c. pag. 369.

9369 a. 2 erw. Kanton, **Süd-China**. Gesch. 1885 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

9369 b. 2 erw. **Ebendaher**. Gesch. 1886 von demselben und Otto Herz, St.-Petersburg.

4. *Bungarus flaviceps* Reinh.

Boulenger, Cat. III pag. 371.

- 9371 a. Erw. (var. A). Sultanat Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1891 von Fritz Beyschlag, daselbst.

Genus XI. Naja Laur.

1. *Naja haje* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 374; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 13, 1883 pag. 104.

- 9374 a. Halbw. (Typus). **Ägypten**. Gesch. 1886 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
9374 b. Erw. (Typus). **Ägypten** (Rüppell, Cat. III AA 1 a). Gesch. 1828 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.
9374 c. Erw. (Typus). **Ebendaher** (Rüppell, Cat. III AA 1 b). Gesch. 1828 von demselben.
9374 d. Erw. (var. C). **Tanger, Marokko**. Erh. 1881 von der IV. Rüppellreise Dr. med. W. Kobelt's. Schwanheim (Main).
9374 e. Jung (Typus). **Ägypten** (Rüppell, Cat. III AA 1 c). Gesch. 1828 von Dr. med. Eduard Rüppell.
9374 f. Erw. (var. C). **Ebendaher**. Gesch. 1896 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.
9374 g. Erw. (Typus). **Ebendaher**. Gesch. 1896 von derselben.
9374 h. Erw. (Typus). **Ebendaher**. Gesch. 1897 von derselben.

2. *Naja melanoleuca* Hallow.

Boulenger, Cat. III pag. 376; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 80 (*haje* var.).

- 9377 a. Erw. u. jung (Typus). **Banana, Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.
9377 b. Erw. (Typus). **Massabé, Loangoküste, West-Afrika**. Gek. 1887 von demselben.
9377 c. Jung (var. B). **Cabinda, Unter-Congo**. Gek. 1885 von demselben.

3. *Naja nigricollis* Reinh.

Boulenger, Cat. III pag. 378; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 81.

- 9378 a. Kopf (Typus). **Brass-River, West-Afrika**. Gesch. 1887 von Prof. Dr. Oskar Boettger, hier.
9378 b. Kopf (Typus). **Ambrizette, Angola**. Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.
9378 c. Halbw. (var. *pallida* Blgr.). **Ober-Ägypten** Rüppell, Cat. III AA 1 d als *haje*. Gesch. 1828 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.

4. *Naja tripudians* Merr.

Boulenger, Cat. III pag. 380: Boettger, Zool. Jahrb. Bd. 3.
1888 pag. 943

- 9381 a. Erw. (Typus). **Madras**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.
9381 b. Erw. (Typus). **Bengalen** (Rüppell, Cat. III AA 2 a). Gek. 1838 vom
Nat. Rijksmuseum in Leiden.
9381 c. Erw. (Gestopft; typus). **Ostindien**. Gesch. 1871 von Phil. Friedr.
Behrends, hier.
9381 d. Erw. (Gestopft; typus). **Ebendaher**. Alte Sammlung 1845.
9381 e—f. 2 erw. (Gestopft; typus). **Ebendaher**. Gek. 1846 von Boissonneau.

var. *caeca* Gmel.

Boulenger, l. c. pag. 382.

- 9382 a. Erw. **Mittel-Luzon**, Philippinen. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr.
von Moellendorff, Manila.
9382 b. Erw. Brunnen Beschlerma am Kopet-dagh. **Transkaspien**. Gesch.
1888 von Staatsrat Dr. Gustav von Radde, Excz., Tiflis.

var. *fasciata* Gray.

Boulenger, Cat. III pag. 383.

- 9383 a. Erw. (forma b). Kanton. **Süd-China**. Gesch. 1885 von Konsul Dr.
O. Fr. von Moellendorff, Manila.
9383 b. Erw. (dieselbe Form). **Ebendaher**. Gesch. 1885 von demselben.
9383 c. Erw. (dieselbe Form). Insel **Hainan**, Süd-China. Gek. 1886 von Otto
Herz, St.-Petersburg.

var. *sputatrix* Boie.

Boulenger, Cat. III pag. 384.

- 9384 a. 2 Junge. Buitenzorg. **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell.
Bonn.
9384 b. 2 halbw. (Rüppell, Cat. III AA 3 a—b). **Java**. Gesch. 1838 von Dr. W.
von Siebold, Leiden.

var. *leucodira* Blgr.

Boulenger, l. c. pag. 384.

- 9384.1 a. Jung. **Java**. Gesch. 1896 von Direktor August Siebert, hier.
9384.1 b. Erw. Sultanat Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens
Hohwiesner, hier.
9384.1 c. Jung. **Ebendaher**. Gesch. 1892 von Dr. med. O. Benecke, daselbst.

5. *Naja samarensis* Pts.

Boulenger, Cat. III pag. 385.

9385 a. Erw. u. jung. Insel **Samar**, Philippinen. Gesch. 1897 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

6. *Naja bungarus* Schlg.

Boulenger, Cat. III pag. 386; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1888 pag. 86 (*Ophiophagus elaps*).

9386 a. Kopf u. Schwanz (var. C). **Mittel-Luzon**, Philippinen. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

9386 b. Jung (var. B). **Singapore**. Gesch. 1896 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.

Genus XII. *Hemibungarus* Pts.

1. *Hemibungarus fasciatus* (Pts.).*)

Peters. Mon.-Ber. Berlin. Akad. 1861 pag. 689 (*Hamadryas*).

9392.1a. 3 halb. Manila. **Luzon**. Gesch. 1888—90 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff. daselbst.

2. *Hemibungarus calligaster* (Wgm.).

Boulenger, Cat. III pag. 393.

9393 a. 4 erw. **Mittel-Luzon**. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff. Manila.

*) Hinter den beiden großen Giftzähnen in Oberkiefer noch ein kleines solides Zahnchen. — Rostrale etwas breiter als lang: Frontale $1\frac{1}{3}$ mal länger als breit, so lang oder etwas länger als sein Abstand von der Schnauzenspitze, viel kürzer als die Parietalen; ein Praeoculare und zwei Postocularen; Temporalen 2 + 2. Sechs Supralabialen, das dritte und das vierte in Berührung mit dem Auge; 4 Infralabialen in Kontakt mit den vorderen Kinnchildern, die viel länger sind als die hinteren.

Schuppenformeln: ♂ Squ. 15; G. 3, V. 257, A. 1. Sc. $\frac{20}{20} + 1$,

♀ " 15; " 3. " 225, " 1. " $\frac{19}{19} + 1$,

♀ " 15; " 3, " 229, " 1. " $\frac{23}{23} + 1$.

Rosa mit 26—32 schwarzen Vollringen auf Kopf und Rumpf und zwei auf dem Schwanze, die oben etwas breiter, unten schmaler sind als die hellen Zwischenräume. Der erste Ring ist ein Halbring und zieht quer über die Augengegend von Lippe zu Lippe, der zweite ist breiter als die übrigen und steht hinter den Parietalen, deren Spitze oder Naht er noch einschließt. Die schwarzen Ringe zeigen auf dem Bauche manchmal die Tendenz in Doppelringe zu zerfallen, indem sie häufig in der Mitte eine helle Querzone einschließen.

Maße: Totallänge 201, Schwanzlänge 12 mm.

var. *gemmiannulus* Pts.

Peters, Mon.-Ber. Berlin. Akad. 1872 pag. 587 (spec.).

9393.1a. Erw. **Mittel-Luzon**. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

3. *Hemibungarus japonicus* (Gthr.).

Boulenger, Cat. III pag. 395; Fritze, Zool. Jahrb. Bd. 7, 1894 pag. 861 (*Callophis boettgeri*).

9395 a. Erw. (Original von *C. boettgeri* Fritze). Okinawa, **Liukiu-Inseln**. Gek. 1896 von Naturalienhändler Gustav Schneider, Basel.

Genus XIII. Callophis Gray.

1. *Callophis gracilis* Gray.

Boulenger, Cat. III pag. 396.

9396 a. Erw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens Hohwiesner, hier.

2. *Callophis maclellandi* (Reinh.).

Boulenger, Cat. III pag. 398.

9398 a. Erw. (var. *univirgata* Gthr.). Darjeeling, **Ost-Himalaya**. Get. 1891 vom British Museum (N. H.), London.

Genus XIV. Doliophis Girard.

1. *Doliophis bivirgatus* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 400.

9400 a. Erw. (Typus). Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1894 von Dr. med. Carl Flach, Aschaffenburg.

9400 b. Erw. (var. *flaviceps* Cant.). Tenggergebirge in 1200 m. **Ost-Java**. Gek. 1891 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

9400 c. Erw. (var. *tetrataenia* Bleek.). **Borneo**. Gesch. 1886 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

9400 d. 2 erw. (var. *flaviceps* Cant.). Bindjey in Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1890 von Theodor und Egbert Engelhard, daselbst.

9400 e. Erw. (var. *tetrataenia* Bleek.). **Java** (Rüppell, Cat. III EE 3a als *Elaps*). Gesch. 1838 von Dr. W. von Siebold, Leiden.

2. *Doliophis intestinalis* (Laur.).

Boulenger, Cat. III pag. 401: Jan. Icon. Oph. Lief. 43. Taf. 1.
Fig. 3z (*Elaps furcatus*).

- 9401 a. Erw. (Rüppell, Cat. III EE 4b als *Elaps furcatus*: Original zu Jan's oben citierter Zeichnung). **Java**. Gesch. 1838 von Dr. W. von Siebold, Leiden.
- 9401 b. Erw. Samarang auf **Java**. Gesch. 1876 von Major Dr. L. von Heyden, hier.
- 9401 c. 4 Ste. Buitenzorg. **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

var. *annectens* Blgr.

Boulenger, Cat. III pag. 402.

- 9402 a. Halbw. Insel **Bangka**. Gek. 1881 von Konrad Kläsi, Zürich.

var. *lineata* Gray.

Boulenger, l. c. pag. 403.

- 9403 a. Erw. Stabat Estate in Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1893 von Fritz Beyschlag, daselbst.
- 9403 b. Erw. Atschin, **Nord-Sumatra**. Gek. 1882 von Konrad Kläsi, Zürich.

3. *Doliophis bilineatus* (Pts.).

Boulenger, Cat. III pag. 404: Boettger, Abh. Zool. Mus. Dresden 1894—95, No. 7 pag. 5 (*Aleniophis*).

- 9404 a. Erw. Insel **Palawan**, Philippinen. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
- 9404 b. Erw. Insel Culion, **Calamianes**, Philippinen. Gesch. 1897 von demselben.

4. *Doliophis philippinus* (Gthr.).

Boulenger, Cat. III pag. 404.

- 9405 a. Erw. Insel **Mindanao**, Philippinen. Gesch. 1888 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.

Genus XV. *Furina* D. B.

1. *Furina occipitalis* (D. B.).

Boulenger, Cat. III pag. 407.

- 9408 a. Erw. **Neuholland**. Gesch. 1881 von J. C. Parrot, hier.
- 9408 b. Erw. Sydney, **Neusüdwaes**. Gesch. 1848 von Konsul W. Kirchner, Wiesbaden.

Genus XVI. Homorelaps Jan.

1. *Homorelaps lacteus* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 409.

9409a. Halbw. (var. *punctata* Smith). **Süd-Afrika**. Gesch. 1897 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

Genus XVII. Elaps Schud.

1. *Elaps surinamensis* Cuv.

Boulenger, Cat. III pag. 414.

9413a. Erw. Zwischen Guaramaco und San Fernando, Alto Orenoco. **Süd-Venezuela**. Gek. 1895 von Georg Hübner, Dresden.

2. *Elaps heterozonus* Pts.

Boulenger, Cat. III pag. 417.

9417.1a. 2 halbw. Sorata. **Bolivia**. Gesch. 1891 von Dr. Heinrich Lenz, Lübeck.

3. *Elaps corallinus* Wied.

Boulenger, Cat. III pag. 420; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1889 pag. 315 (var. *gastrosticta*).

9420a. 2 erw. (Typus). Pacasmayo. **Nord-Peru**. Gesch. 1887 von Max Bamberger, hier.

9420b. 4 erw. (Typus). **Ebendaher**. Gesch. 1889 von demselben.

9420c. Jung (Typus). **Peru**. Gesch. 1863 von Feldmarschall Philipp Braun, Lima.

9420d. Erw. u. 2 Junge (Typus). **Trinidad**. Gesch. 1879 von Carl Knoblauch, hier.

9420e. Erw. (var. B). **São Paulo**, Brasilien. Gesch. 1890 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

9420f. 2 erw. (Typus). **Trinidad**. Gesch. 1893 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.

9420g. Halbw. (Typus). **Surinam** (Rüppell, Cat. III EE 2a). Gesch. 1840 von Dr. med. W. Sichel, hier.

9420h. Jung. **Tropisches Süd-Amerika**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.

9420i. Erw. ♂ (Varietät mit nur 12 schwarzen Körperringen). Baranquilla im Magdalenathal. **U. S. Columbia**. Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel, Jena.

4. *Elaps tschudii* Jan.

Boulenger, Cat. III pag. 422; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1889 pag. 316.

9422a. Halbw. Pacasmayo. **Nord-Peru**. Gesch. 1887 von Max Bamberger, hier.

5. *Elaps dissolencus* Cope.

Boulenger, Cat. III pag. 422.

- 9422.1 a. 2 halbw. Baranquilla im Magdalenathal, **U. S. Columbia**. Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel, Jena.

6. *Elaps fulvius* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 422.

- 9423 a. Erw. **Südliche Verein. Staaten**. Gesch. 1848 von Dr. med. W. Sichel, hier.
9423 b. Erw. **Florida**. Gesch. 1896 von Dr. med. A. Zipperlen, Cincinnati, O.

var. *nigrocincta* Gir.

Boulenger, l. c. pag. 424.

- 9424 a. Erw. Retalhuleu, **Guatemala**. Gesch. 1895 von Carl Fleischmann, Guatemala.
9424 b. Erw. u. jung. San José, **Costa Rica**. Gesch. 1893 von demselben.

7. *Elaps spixi* (Wgl.).

Boulenger, Cat. III pag. 427.

- 9427 a. Erw. Mapiri, Nebenfluß des oberen Beni, **Bolivia**. Gesch. 1888 von Ferdinand Emmel, Arequipa.
9427 b. Erw. Ciudad Bolivar, **Venezuela**. Gesch. 1894 von F. W. Urich und R. R. Mole, Port of Spain.
9427 c. Erw. Carácas, **Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller, hier.

8. *Elaps frontalis* D. B.

Boulenger, Cat. III pag. 427.

- 9427.1 a. Erw. (var. B). **Süd-Brasilien**. Gek. 1877 von Hamburg.

9. *Elaps marcgravii* Wied.

Boulenger, Cat. III pag. 428.

- 9428 a. 3 erw. (Rüppell, Cat. III EE 1 a—c). Ilheos, **Brasilien**. Gesch. 1838 von Gebr. Koch, hier.
9428 b. 3 halbw. (Rüppell, Cat. III EE 1 d—f). **Brasilien**. Get. 1836 vom Herzog von Leuchtenberg.
9428 c. Erw. Ilheos, **Brasilien**. Gesch. 1838 von Gebr. Koch, hier.
9428 d. Erw. **Trinidad**. Gesch. 1893 von F. W. Urich und R. R. Mole. Port of Spain.

10. *Elaps mipartitus* D. B.

Boulenger, Cat. III pag. 431.

9431 a. Erw. **Venezuela**. Gek. 1877 von Hamburg.

9431 b. Erw. Amali, **U. S. Columbia**. Gek. 1897 von Prof. Dr. Fritz Regel, Jena.

Genus XVIII. Dendraspis Schlg.

1. *Dendraspis viridis* (Hallow.).

Boulenger, Cat. III pag. 435; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1887 pag. 63 (*jamesoni*).

9435 a. Erw. Akkra, **Goldküste**. Gesch. 1887 von Major Dr. L. von Heyden, hier.

9435 b. 2 erw. Odumase, **Östl. Goldküste**. Gesch. 1892 von Hans Simon, Stuttgart.

2. *Dendraspis jamesoni* (Traill).

Boulenger, Cat. III pag. 436; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 85.

9436 a. Erw. Massabé, **Loangoküste**, West-Afrika. Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.

9436 b. Kopf. Cabinda, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von demselben.

9436 c. Erw. Povo Netonna bei Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von demselben.

Familie VIII. Amblycephalidae.

Genus I. Haplopeltura D. B.

1. *Haplopeltura boa* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 439; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1892 pag. 134.

9439 a. Erw. **West-Java**. Gek. 1893 von Hans Fruhstorfer, Berlin.

9439 b. Erw. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

Genus II. Amblycephalus Kuhl.

1. *Amblycephalus laevis* Boie.

Boulenger, Cat. III pag. 441.

9441 a. Halbw. Sultanat Deli, **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1881 von Fritz Beyschlag, daselbst.

- 9441b. Halbw. Baramfluß in **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von der Rüppellreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.
9441c. Erw. und jung. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

2. *Amblycephalus moellendorffi* (Bttgr.).

- Boulenger, Cat. III pag. 443; Boettger, Ber. Offenbach, Ver. f. Naturk. 1885 pag. 125 und 1888 pag. 84, Taf. 2, Fig. 1 (*Pareus*).
9443.1a. 2 erw. Gebirge Lo-fou-shan bei **Kanton**, Süd-China. Gesch. 1885—88 von Bernhard Schmacker, Shanghai, und Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
9443.1b. 2 erw. **Hongkong**, Süd-China. Get. 1887 von Bernh. Schmacker.
9443.1c. Erw. u. jung. Bangkok, **Siam**. Gesch. 1885 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff.

3. *Amblycephalus carinatus* Boie.

- Boulenger, Cat. III pag. 445; Boettger, Ber. Offenbach, Ver. f. Naturk. 1892 pag. 135.
9445a. Erw. (Rüppell, Cat. III V 9a als *Dipsas*). **Java**. Get. 1838 vom Naturh. Rijksmuseum in Leiden.
9445b. 2 erw., 2 jung. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

Genus III. Leptognathus D. B.

1. *Leptognathus peruana* n. sp.*)

- 9448a. Erw. Sta. Ana, Prov. Cuzco, **Pern.** Gesch. 1890 von Friedrich Emmel, Gelnhausen.

*) Ähnlich dem *L. catesbyi* (Senz.), aber mit 15 Schuppenreihen, höherem Rostrale und kürzerem Frontale. Von *L. mikani* (Schlg.) verschieden durch viel kompressere Gestalt, durch die Zahl, Form und Stellung der Infralabialen und durch die fast ganz dunkle Körperunterseite. — Kopf stark vom Halse abgesetzt. Rumpf sehr zusammengedrückt, in der Körpermitte fast doppelt so hoch wie tief. Auge groß. Rostrale fast so hoch wie breit, von oben nur wenig sichtbar; Internasalen mehr als halbmal so lang wie die ans Auge stoßenden Praefrontalen; Frontale etwas breiter als lang, kürzer als sein Abstand von der Schnauzenspitze, viel kürzer als die Parietalen. Nasale geteilt; Frenale so hoch wie lang, ans Auge stoßend; kein Praeoculare zwei Postocularen; Temporalen 2 + 3. Acht Supralabialen, von denen das dritte, vierte und fünfte ans Auge treten. 13—14 Infralabialen; das erste hinter dem Symphysale in Berührung mit dem der andern Seite; jederseits fünf Infralabialen in Kontakt mit dem ersten Paar Kinnschilder, die viel länger sind als breit. Vier Paar Kinnschilder. Die Schuppen der mittelsten

2. *Leptognathus catesbyi* (Sentz.).

Boulenger, Cat. III pag. 449.

- 9449 a. Halbw. Mapiri, Nebenfluß des oberen Beni, **Bolivia**. Gesch. 1888 von Ferdinand Emmel, Arequipa.
9449 b. Jung. Sorata, **Bolivia**. Gesch. 1891 von Dr. Heimr. Lenz, Lübeck.
9449 c. 3 erw. Sta. Ana, Prov. Cuzco, **Pern.** Gesch. 1890 von Friedrich Emmel, Gelnhausen.
9449 d. 2 erw. (Rüppell, Cat. III V 5 a—b als *Dipsas*). **Surinam**. Alte Sammlung 1845.

3. *Leptognathus pavonina* (Schlg.).

Boulenger, Cat. III pag. 450.

- 9450 a. Erw. und jung (Rüppell, Cat. III V 4 a—b als *Dipsas weigeli*). Ilheos, **Brasilien**. Gesch. 1838 von Gebr. Koch, hier.

4. *Leptognathus mikani* (Schlg.).

Boulenger, Cat. III pag. 453.

- 9453, 1 a. Erw. und jung (Typus). **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gek. 1886 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.

5. *Leptognathus ventrimaculata* Blgr.

Boulenger, Cat. III pag. 454, Taf. 24, Fig. 2.

- 9454 a. Erw. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gesch. 1873 von Oberlehrer Dr. Finger, hier.

Rückenreihe stark verbreitert, aber die breitesten Schuppen nicht doppelt so breit wie lang.

Schuppenformel: Squ. 15; G. $\frac{4}{4}$, V. 180, A. 1, Sc. $\frac{79}{79} + 1$.

Oben dunkel rotbraun mit breiten schwarzen, weiß gesäumten, opponierenden oder alternierenden Querbinden, die bis auf die Ventralen herabsteigen; diese dunkeln Binden breiter als die hellen Zwischenräume, 34 auf dem Rumpfe bis zum After. Kopf einfarbig schwarz, nur die Lippen mit weißen Flecken. Unterseite von Kopf, Hals und erstem Rumpfdrittel schwarz und milchweiß gewürfelt, die der letzten beiden Rumpfdrittel und des Schwanzes fast einfarbig schwarzgrau mit sehr undeutlichen, schmalen weißlichen Längsadern.

Maße: Totallänge 610, Schwanzlänge 155 mm.

Fundort: Sta. Ana in der peruanischen Provinz **Cuzco**, ein tadellos erhaltenes Exemplar, von Herrn Ferdinand Emmel in Arequipa gesammelt und durch dessen Bruder, Herrn Friedrich Emmel in Gelnhausen, dem Museum zum Geschenk gemacht.

Familie IX. Viperidae.

Subfamilie 1. Viperinae.

Genus I. *Causus* Wgl.

1. *Causus rhombeatus* (Licht.).

Boulenger, Cat. III pag. 467; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 12, 1881 pag. 399 (*Aspidelaps*), Ber. Senck. Nat. Ges. 1887 pag. 63 und 1888 pag. 88.

- 9467 a. Halbw. **Port Natal**. Gek. 1877 von Hamburg.
9467 b. Halbw. **Aburi, Goldküste**. Gesch. 1885 von Hans Simon, Stuttgart.
9467 c. 2 erw. **Akra, Goldküste**. Gesch. 1887 von Major Dr. L. von Heyden, hier.
9467 d. 2 erw. **Kapland**. Gesch. 1873 von Dr. Löwenthal, hier.
9467 e. Erw. **Banana, Unter-Congo**. Gek. 1885 von Paul Hesse, Venedig.
9467 f. Erw. **Kinshassa am Stanley Pool, Unter-Congo**. Gek. 1887 von demselben.
9467 g. 4 erw. **Banana, Unter-Congo**. Gek. 1885 von demselben.

Genus II. *Vipera* Laur.

1. *Vipera ursinii* Bonap.

Boulenger, Cat. III pag. 473.

- 9473 a. Erw. ♂ und ♀. **Bosnien**. Gesch. 1893 von Schulrat Dr. Egid Schreiber, Görz.
9473 b. Erw. **Laxenburg bei Wien**. Gesch. 1893 von G. A. Boulenger, F. R. S., London.
9473 c. Erw. ♀. **Ebendaher**. Gesch. 1893 von Dr. Franz Werner, Wien.

2. *Vipera renardi* Christ.

Boulenger, Cat. III pag. 475; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1892 pag. 149 (*berus*, non L.).

- 9475 a. Erw. **Stanitze Pjaetigorsk bei Maikop, Ciskaukasien**. Gek. 1891 von Paul Reibisch, Dresden.
9475 b. Halbw. **Stadt Pjaetigorsk, Ciskaukasien**. Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart.

3. *Vipera berus* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 476; Notthafft, Zool. Anzeiger 1886 pag. 450; Blum, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 15, 1888 pag. 128.

- 9476 a. Erw. ♂ und ♀. **Cibinsgebirge, Siebenbürgen (Hohe Rinne)**. Gesch. 1896 von Dr. Carl Fr. Jickeli, Hermannstadt.

- 9476 b. 2 erw. ♂. Kobyllno, **Oberschlesien**. Gesch. 1886 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
- 9476 c. Jung (Typus) und erw. (var. *prester* L.). St. Blasien, **Bad. Schwarzwald**. Gesch. 1886 von demselben.
- 9476 d. Erw. Sils-Baseglia in 1920 m. **Ober-Engadin**. Gesch. 1890 von Heinrich Flinsch, hier.
- 9476 e. 5 erw. ♂ und ♀. Wunsiedel, **Ober-Franken**. Gesch. 1891 von Oberlehrer J. Blum, hier.
- 9476 f. Erw. **Thüringer Wald**. Gesch. 1891 von Hospitalmeister Philipp Reichard, hier.
- 9476 g. Erw. (var. *prester* L.). Südabhang des Nebelhorns in 6000', Oberstdorf im **Algäu**. Gesch. 1876 von Maler Carl Dietze, Jugenheim.
- 9476 h. Erw. ♂ und ♀ (var. *prester* L.). Malborgeth, **Kärnten**. Gesch. 1893 von Schulrat Dr. Egid Schreiber, Görz.
- 9476 i. Erw. ♂. Klönthal bei Richisau, Ct. Glarus, **Schweiz**. Gesch. 1891 von Oberlehrer J. Blum, hier.
- 9476 k. 2 erw. Mahlberg, Kreis Rees, **Rheinprovinz**. Gesch. 1891 von demselben.
- 9476 l. Erw. ♀ und 2 ♂ (var. *prester* L. und 2 Typus). Karolinenhorst, Kr. Naugard, **Pommern**. Gesch. 1891 von demselben.
- 9476 m. 3 erw. Kloster Reitberg, Kr. Tölz, **Oberbayern**. Gesch. 1891 von demselben.
- 9476 n. 2 ♂ (Typus) und ♀ (var. *prester* L.). Born auf der Halbinsel Dars, Kr. Franzburg, **Pommern**. Gesch. 1891 von demselben.
- 9476 o. Erw. ♀. Orb, Kr. Gelnhausen, **Hessen-Nassau**. Gesch. 1891 von demselben.
- 9476 p. Erw. ♀. Mohrungen, **Ostpreussen**. Gesch. 1891 von demselben.
- 9476 q. ♂ und ♀ (Typus) und ♀ (var. *prester* L.). Weg zur Klubbütte des Glärnisch, Rossmatterthal, Ct. Glarus, **Schweiz**. Gesch. 1891 von demselben.
- 9476 r. Erw. ♂ (var. *prester* L.). Route Psirsk-Suchum, **West-Transkaukasien**. Erh. 1884 von der Reise Staatsrat O. Retowski's, Theodosia.
- 9476 s. Halbw. **Unter-Franken**. Gesch. 1865 von Ferdinand Knoblauch, hier.
- 9476 t. Erw. (var. *prester* L.). Westfuß des Hohen Plassen in 6200' bei Hallstadt, **Salzkammergut**. Gesch. 1876 von San.-Rat Dr. med. Ph. G. Passavant, hier.
- 9476 u. Erw. ♂ (var. *seounei* Lat.). Cabañas bei Coruña, **Nordwest-Spanien**. Gesch. 1880 von V. Lopez Seoane, daselbst.
- 9476 v. 3 erw. **Vegesack** bei Bremen. Gesch. 1886 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.
- 9476 w. 2 erw. (Rüppell, Cat. III GG 1a—b). **Hamburg**. Gesch. 1838 von Schöff Dr. Carl von Heyden, hier.
- 9476 x. Erw. ♀. Grödener Jöchel bei St. Ulrich, **Tirol**. Gesch. 1880 von Prof. Dr. Ach. Andreae, Hildesheim.
- 9476 y. Erw. (gestopft). **Norddeutschland**. Alte Sammlung 1845.
- 9476 z. Erw. (in Formol). Siebentisch bei **Augsburg**. Gesch. 1897 von Oberlehrer J. Blum.

4. *Vipera aspis* (L.).

- Boulenger, Cat. III pag. 481; Blum, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 15, 1888 pag. 128 und Zool. Garten 1892 pag. 12 und 265.
- 9481 a. Erw. Leinegg im Schwarzwald. Seitenthal des Schlüchthals, **Süd-Schwarzwald**. Gesch. 1891 von Oberlehrer J. Blum, hier.
- 9481 b. Erw. ♀ mit Embryonen. Bois de Vaux. Ars an der Mosel, **Deutsch-Lothringen**. Gesch. 1892 von Lehrer Fr. Bastier, hier.
- 9481 c. 3 erw. (var. *juggi* Schinz). Caltanisetta, **Sicilien**. Gesch. 1881—86 von Chefinspektor Carl Hirsch, Palermo.
- 9481 e. Erw. (Rüppell, Cat. III FF 4a). **Süd-Europa**. Alte Sammlung 1845.
- 9481 f. Erw. (var. *juggi* Schinz). Mte. Cuccio bei **Palermo**, **Sicilien**. Gesch. 1882 von Chefinspektor Carl Hirsch.
- 9481 g. 2 erw. ♀. Aus der Phraze zwischen Novéant und Dornot, **Deutsch-Lothringen**. Gesch. 1887 von Lehrer Fr. Bastier, hier.

5. *Vipera latastei* Boscá.

- Boulenger, Cat. III pag. 484; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 13, 1883 pag. 106.
- 9484 a. Erw. **Aragonien**, Nord-Spanien. Gesch. 1886 von Ingenieur Carl Reuleaux, München.
- 9484 b. Erw. und halb. Tanger, **Marokko**. Gesch. 1881 von Hans Simon, Stuttgart und Dr. med. W. Kobelt, Schwanheim (Main).

6. *Vipera ammodytes* (L.).

- Boulenger, Cat. III pag. 485; Boettger, Sitz.-Ber. Berlin. Akad. Wiss. 1888 pag. 179.
- 9485 a. 2 erw. Prevesa, **Epirus**. Gesch. 1889—90 von César Conéménos, daselbst.
- 9485 b. Erw. **Serbien**. Gesch. 1890 von Prof. Dr. Friedrich Kinkelin, hier.
- 9485 c. Erw. Orsova im **Banat**. Get. 1888 von Prof. Dr. August von Mojsisovics, Graz.
- 9485 d. Erw. Grenze von **Kärnten** und **Steiermark**. Get. 1889 von demselben.
- 9485 e. 2 erw., 1 jung. Xenochóri, **Nord-Euböa**. Gesch. 1891 von Fr. de Mimont, daselbst.
- 9485 f. Halb. **Süd-Tirol**. Gesch. 1882 von Prof. Dr. Ach. Andreae, Hildesheim.
- 9485 g. 3 erw. (Rüppell, Cat. III FF 3a—c). **Dalmatien**. Get. 1836 von Michahelles, München.

7. *Vipera lebetina* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 487; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1880 pag. 267 (*euphratica*). Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 13, 1883 pag. 105 (*euphratica* var. *mauritanica*). Zool. Jahrb. Bd. 3, 1888 pag. 946 (*obtusata*). Sitz.-Ber. Berlin. Akad. 1888 pag. 180 und Zool. Jahrb. Bd. 3, 1888 pag. 947 (*cauthina*) und Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. 49, 1877 pag. 288.

- 9487 a. 2 halbw. (var. *cauthina* Gray). Haiffa, **Syrien**. Gesch. 1884 von Hans Simon, Stuttgart.
- 9487 b. Erw. (var. *euphratica* Mart.). Kopet-dagh, **Transkaspien**. Gesch. 1890 von C. Eylanlt. Askhabad.
- 9487 c. Erw. (var. *mauritanica* Guich.). Tanger, **Marokko**. Erh. 1881 von der IV. Ruppellreise Dr. med. W. Kobelt's. Schwanheim (Main).
- 9487 d. Kopf (var. *euphratica* Mart.). Chodsha-kala, **Transkaspien**. Gesch. 1888 von Staatsrat Dr. Gustav von Radde, Excz., Tiflis.
- 9487 e. Erw. (var. *euphratica* Mart.). Beirut, **Nord-Syrien**. Gek. 1880 von Naturalienhändler Wilhelm Schlüter, Halle (Saale).

8. *Vipera russelli* (Shaw).

Boulenger, Cat. III pag. 490.

- 9490 a. Erw. **Madras**. Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.
- 9490 b. Jung. Kandy, **Ceylon**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.
- 9490 c. Jung. **Ceylon**. Gesch. 1846 von H. Worms, hier.
- 9490 d—e. 2 erw. (Gestopft). **Ostindien**. Gek. 1846 von Boissoneau.

Genus III. Bitis Gray.

1. *Bitis arietans* (Merr.).

Boulenger, Cat. III pag. 493; Boettger, Abh. Senck. Nat. Ges. Bd. 9, 1874 pag. 163, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 89 und Zool. Anzeiger 1893 pag. 130.

- 9493 a. Erw. u. jung. Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.
- 9493 b. Kopf. Landschaft Sus, **Süd-Marokko**. Gesch. 1872 von den Prof. Dr. Freih. C. von Fritsch, Halle (Saale), und J. J. Rein, Bonn.
- 9493 c. Erw. Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1885 von Paul Hesse.
- 9493 d. Erw. **Kapland**. Gesch. 1873 von Dr. Löwenthal, hier.
- 9493 e—f. 2 erw. (Gestopft). **Kordofan**. (Ruppell. Cat. III FF 2 a—b als *Vipera*). Gesch. 1829 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.

2. *Bitis cornuta* (Daud.).

Boulenger, Cat. III pag. 497; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1887 pag. 168 (*Vipera*).

- 9497 a. Erw. **Damaraland**. Gesch. 1887 von Prof. Dr. Hans Schinz, Zürich.
- 9497 b. Erw. (Gestopft). **Kapland**. Alte Sammlung 1845.

3. *Bitis caudalis* (Smith).

Boulenger, Cat. III pag. 498; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1886 pag. 6, 1887 pag. 167 (*Vipera*) und 1886 pag. 8, Taf. 1, Fig. 1 (*Vipera schneideri*).

- 9498 a. Erw. ♀. **Namaland.** Gesch. 1876 von Oberlehrer Müller, hier.
9498 b. Erw. ♂. Angra Pequena. **Deutsch-Südwestafrika.** Gesch. 1886 von Prof. Dr. Oskar Schneider, Dresden.
9498 c. Erw. ♀. Route Angra Pequena - | Aus, **Groß-Namaland.** Gesch. 1887 von Prof. Dr. Hans Schinz, Zürich.
9498 d. Erw. ♀ (Original von *Vipera schneideri* Btgr.). Angra Pequena. **Groß-Namaland.** Gesch. 1886 von Prof. Dr. Oskar Schneider.

4. *Bitis gabonica* (D. B.).

Boulenger, Cat. III pag. 499.

- 9499 a. Kopf. Odumase. **Ost-Goldküste.** Gesch. 1892 von Hans Simon, Stuttgart.
9499 b. Erw. Mundame. **Kamerun.** Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz, Berlin.

5. *Bitis nasicornis* (Shaw).

Boulenger, Cat. III pag. 500.

- 9500 a. Erw. **Liberia,** West-Afrika. Gek. 1891 von Gustav Schneider, Basel.
9500 b. Halbw. **Kamerun.** Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz, Berlin.

Genus IV. *Cerastes* Wgl.

1. *Cerastes cornutus* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 502; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1880—81 pag. 145 (*Vipera cerastes*).

- 9502 a. Erw. ♀. (Rüppell, Cat. III FF 1d als *Vipera cerastes*). **Ägypten.** Gesch. 1828 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.
9502 b. Erw. Wüste von **Tunis.** Gesch. 1893 von Baron C. von Erlanger, Nieder-Ingelheim.
9502 c. Erw. und halbw. Géryville. **Algerische Sahara.** Erh. 1881 von der IV. Rüppellreise Dr. med. W. Kobelt's. Schwanhcim (Main).
9502 d. 2 erw. Biscra, **Algerische Sahara.** Gek. 1885 von Louis Fischer, daselbst.
9502 e. 3 erw. (Rüppell, Cat. III FF 1a—c als *V. cerastes*). **Ägypten.** Gesch. 1828 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.
9502 f. Kopf. **Ebendaher.** Gesch. 1896 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.
9502 g. Erw. ♀ (Gestopft). **Ebendaher** (Rüppell, Cat. III FF 1h als *V. cerastes*). Gesch. 1828 von Dr. med. Eduard Rüppell.

2. *Cerastes vipera* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 503.

- 9503 a. Erw. **Süd-Tunis.** Gek. 1895 von Paul Spatz, Gabes.
9503 b. Erw. ♀ (Rüppell, Cat. III FF 1e als *Vipera cerastes*). **Ägypten.**
Gesch. 1828 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.
9503 c. Halbw. Biscra. Prov. Constantine. **Algierien.** Gek. 1885 von Louis
Fischer, daselbst.
9503 d. Erw. **Süd-Tunis.** Gesch. 1896 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft.
hier.
9503 e. Erw. **Ebendaher.** Gesch. 1896 von derselben.

Genus V. Echis Merr.

1. *Echis carinatus* (Schnd.).

Boulenger, Cat. III pag. 505; Reuß, Mus. Senck. Bd. 1, 1834
pag. 157 (*parvo*) und pag. 160, Taf. 7, Fig. 2 (*varia*); Boettger,
Zool. Jahrb. Bd. 3, 1888 pag. 949 (*arenicola*).

- 9505 a. Erw. (Rüppell, Cat. III JJ 1a als *varia*). **Nubien.** Gesch. 1828 von
Dr. med. Eduard Rüppell, hier.
9505 b. Erw. Duschak, **Transkaspien.** Gesch. 1889 von Staatsrat Dr. Gustav
von Radde, Excz., Tiflis.
9505 c. Halbw. **Madras.** Gesch. 1889 von Theodor Kolb, daselbst.
9505 d. Halbw. **Bombay.** Gesch. 1887 von Prof. Dr. Ferdinand Richters, hier.
9505 e. 3 erw. **Ägypten.** (Rüppell, Cat. III JJ 1b-d als *parvo*). Gesch.
1828 von Dr. med. Eduard Rüppell.

Genus VI. Atheris Cope.

1. *Atheris squamiger* (Hallow.).

Boulenger, Cat. III pag. 509; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges.
1888 pag. 90 (*squamigera*), Zool. Anzeiger 1887 pag. 651 und Ber.
Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 92, Taf. 2, Fig. 7 (*laeviceps*).

- 9509 a. 2 erw. (Originale von *A. laeviceps* Bttgr.). **Banana, Unter-Congo.**
Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.
9509 b. 3 Ste. **Mundame, Kamerun.** Gek. 1897 von Dr. Georg Kraatz, Berlin.

2. *Atheris ceratophorus* Wern.

Boulenger, Cat. III pag. 510.

- 9510 a. Erw. Buloa bei Tanga. **Deutsch-Ostafrika.** Get. 1896 vom Naturh.
Museum, Berlin.

Genus VII. Atractaspis Smith.

1. *Atractaspis hildebrandti* Pts.

Boulenger, Cat. III pag. 512.

9512 a. Erw. Peccetoni, **Wituland**, Ost-Afrika. Gesch. 1897 von Dr. Alfred Voeltzkow, Berlin.

2. *Atractaspis congica* Pts.

Boulenger, Cat. III pag. 513; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 87 (*irregularis* var.).

9513 a. Erw. Povo Netonna bei Banana, **Unter-Congo**. Gek. 1887 von Paul Hesse, Venedig.

3. *Atractaspis rostrata* Gthr.

Boulenger, Cat. III pag. 514.

9514.1 a. Erw. Boroma am **Sambesi**. Gesch. 1895 von Prof. Dr. O. Boettger, hier.

4. *Atractaspis bibroni* Smith.

Boulenger, Cat. III pag. 515; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1887 pag. 165 (*irregularis* var.).

9515 a. Erw. Route Aus-Angra Pequena, **Groß-Namaland**. Gesch. 1887 von Prof. Dr. Hans Schinz, Zürich.

Subfamilie 2. Crotalinae.

Genus I. Ancistrodon Palis.

1. *Ancistrodon piscivorus* (Lacép.).

Boulenger, Cat. III pag. 520.

9520 a. Erw. **Texas**. Gek. 1877 von Hamburg.

2. *Ancistrodon bilineatus* Gthr.

Boulenger, Cat. III pag. 521.

9521 a. Erw. Retalhuleu, **Guatemala**. Gesch. 1894 von Carl Fleischmann, Guatemala.

3. *Ancistrodon contortrix* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 522.

9522 a. Erw. **Verein. Staaten**. Gesch. 1896 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.

9522 b. Erw. **Ebendaler**. Gesch. 1877 von derselben.

4. *Ancistrodon halys* (Pall.).

Boulenger, Cat. III pag. 524; Boettger in Radde's Faun. Flor. Caspi-Geb. 1886 pag. 74 (*Trigonocephalus*).

9524.1a. Erw. Lyrik bei Lenkoran im Talyschgebiet, **Transkaukasien**.
Gesch. 1886 von Hans Leder, Jauernig.

5. *Ancistrodon blomhoffi* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 525.

9525 a. Halb. Yokohama, **Japan**. Get. 1889 von Bernhard Schmacker, Shanghai.

9525 b. 3 erw. **Nippon**. Gek. 1886 auf der Dr. Ahlberg'schen Auktion, hier.

9525 c. Erw. Insel **Jeso**, Nord-Japan. Get. 1889 von Bernh. Schmacker.

9525 d. Erw. **Nippon**. Gesch. 1876 von Prof. Dr. J. J. Rein, Bonn.

9525 e. 2 erw. (Rüppell, Cat. III BB 6a—b als *Trigonocephalus*). **Japan**.
Get. 1838 vom Nat. Rijksmuseum in Leiden.

6. *Ancistrodon rhodostoma* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 527; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. 1892 pag. 135.

9527 a. Erw. Reich Jolo auf **Java**. Gesch. 1868 von E. Lörsch, hier.

9527 b. Erw. (Rüppell, Cat. III BB 7 a als *Trigonocephalus*). **Java**. Get. 1838 vom Naturh. Rijksmuseum in Leiden.

9527 c. 2 erw., 2 jung. Umgebung von Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell, Bonn.

7. *Ancistrodon hypnale* (Merr.).

Boulenger, Cat. III pag. 528.

9528 a. 6 Ste. **Ceylon**. Gesch. 1846 von H. Worms, hier.

Genus II. Lachesis Daud.

1. *Lachesis muta* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 534.

9534 a. Erw. Im Innern der Insel **Trinidad**. Gesch. 1890 von Fr. W. Ulrich und R. R. Mole, Port of Spain.

9534 b. Erw. (gestopft). **Brasilien** (Rüppell, Cat. III CC 1a als *rhombata*).
Gesch. 1840 von Baron A. von Rothschild durch Prof. Freyreiß.

2. *Lachesis lanceolata* (Lacép.).

Boulenger, Cat. III pag. 535.

9535 a. 2 erw. (Rüppell, Cat. III BB 2*a—b als *Trigonocephalus atrov.*).
Brasilien. Get. 1838 vom Grafen Jenison, Heidelberg.

- 9535 b. Halbw. **Peru**. Gesch. 1884 von Wilhelm Schuermann, hier.
9535 c. Halbw. **São Paulo**, Brasilien. Gek. 1876 von Prof. Carlos Müller, daselbst.
9535 d. 2 erw. **Brasilien**. Gek. 1887 von C. A. Pöhl, Hamburg.
9535 e. Erw. u. 2 halbw. (Rüppell, Cat. III BB 2 a—c als *Tr. atrox*). **Brasilien**.
Get. 1838 vom Grafen Jenison.
9535 f. Kopf. **Trinidad**. Gesch. 1893 von Fr. W. Ulrich und R. R. Mole, Port of Spain.
9535 g. 2 erw. (Rüppell, Cat. III BB 1 a—b als *Tr. jararaca*). Ilheos, **Brasilien**.
Gesch. 1838 von Gebr. Koch, hier.
9535 h. Halbw. u. 5 Junge. Carácas, **Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller, hier.

3. *Lachesis atrox* (L.).

Boulenger, Cat. III pag. 537.

- 9537 a. Halbw. **Nicaragua**. Gesch. 1892 von Prof. Dr. Oskar Boettger, hier.
9537 b. Halbw. San José, **Costa Rica**. Gesch. 1893 von Carl Fleischmann, Guatemala.

4. *Lachesis picta* Tschudi.

Boulenger, Cat. III pag. 540; Jan, Icon. Oph. Lief. 47, Taf. 3, Fig. 3 (*Bothrops*).

- 9540,1 a. Erw. (Varietät mit meist ungeteilten Subcaudalen). Carácas, **Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller, hier.

5. *Lachesis alternata* (D. B.).

Boulenger, Cat. III pag. 541.

- 9541 a. Erw. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Get. 1888 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.
9541 b. Kopf. Stadt **Rio Grande do Sul**. Gek. 1886 von demselben.

6. *Lachesis newwiedi* (Wgl.).

Boulenger, Cat. III pag. 542; Boettger, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. 58, 1885 pag. 239 (*Bothrops diporus*).

- 9542 a. Kopf u. halbw. Stadt **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gek. 1886 von Prof. Dr. H. von Ihering, daselbst.
9542 b. Erw. **Paraguay**. Get. 1885 vom Naturhist. Institut Linnaea, Berlin.
9542 c. Halbw. **Rio Grande do Sul**. Get. 1888 von Prof. Dr. H. von Ihering.

7. *Lachesis nummifera* (Rüpp.).

Boulenger, Cat. III pag. 544; Rüppell, Verz. Senck. Mus. Amphib. 1845 pag. 21 (*Atropos*).

- 9544,1 a. Halbw. (Original). **Mexiko** (Rüppell, Cat. III KK 1 a). Gesch. 1840 von Dr. med. Eduard Rüppell, hier.

8. *Lachesis brachystoma* (Cope).

Boulenger, Cat. III pag. 547.

- 9547 a. Erw. n. 2 Junge. Cairo (La Junta) bei Limon. **Östliches Costa Rica**.
Gesch. 1893 von Carl Fleischmann, Guatemala.

9. *Lachesis monticola* (Gthr.).

Boulenger, Cat. III pag. 548.

- 9548 a. Erw. und jung. Darjeeling, **Ost-Himalaya**. Get. 1891 vom British
Museum (N. H.), London.

10. *Lachesis strigata* (Gray).

Boulenger, Cat. III pag. 549.

- 9549, 1 a. 2 erw. Nilgiris, **Süd-Indien**. Gesch. 1890 vom Naturh. Museum
in Madras.

11. *Lachesis flavoviridis* (Hallow.).

Boulenger, Cat. III pag. 550.

- 9550 a. Halb. Insel O-shima. **Liukiu-Gruppe**. Gesch. 1889 von Major H.
von Schönfeldt, Offenbach (Main).

12. *Lachesis lutea* (Bttgr.).

Boulenger, Cat. III pag. 553; Boettger, Ber. Offenbach. Ver.
f. Naturk. 1895 pag. 111 (*Trimeresurus*).

- 9553 a. 2 erw. (Originalexemplare). Yaeyama auf Mijakoshima. **Südliche
Liukiu-Inseln**. Gesch. 1895 von Bernhard Schmacker, Shanghai.

13. *Lachesis graminea* (Shaw).

Boulenger, Cat. III pag. 554; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges.
1887 pag. 50 und 1894 pag. 135 (*Trimeresurus*).

- 9554 a. Halb. Bangkok. **Siam**. Gesch. 1885 von Konsul Dr. O. Fr. von
Moellendorff, Manila.
9554 b. Halb. **Java**. Gesch. 1886 von Oberlehrer J. Blum, hier.
9554 c. Erw. **Süd-Formosa**. Get. 1888 von Bernhard Schmacker, Shanghai.
9554 d. Erw. (Rüppell. Cat. III BB 4 a als *Trigonocephalus viridis*). Insel
Timor. Get. 1838 vom Rijksmuseum in Leiden.
9554 e. Jung. Samarang auf **Java**. Gesch. 1871 von Konsul Edward Jacobson,
hier.
9554 f. 2 erw. Insel **Hainan**, Süd-China. Gesch. 1894 von Bernh. Schmacker.
9554 g. Erw. u. jung. **Ebendaher**. Gek. 1885 von Otto Herz, St.-Petersburg.

14. *Lachesis flavomaculata* (Gray).

Boulenger, Cat. III pag. 556, Taf. 25, Fig. 3.

- 9556 a. 4 erw., 1 halb. Majajjay, Prov. Laguna. **Luzon**. Gesch. 1890 von
Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
9556 b. Erw. **Philippinen**. Gesch. 1891 von demselben.
9556 c. 3 erw., 1 halb., 4 jung. Majajjay, Prov. Laguna. **Luzon**. Gesch.
1891 von demselben.

15. *Lachesis anamallensis* (Gthr.).

Boulenger, Cat. III pag. 558; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f.
Naturk. 1892 pag. 92 (*Trimeresurus*).

- 9558 a. Erw. u. halb. Nilgiris, **Süd-Indien**. Gesch. vom Naturh. Museum
in Madras.

16. *Lachesis trigonocephala* (Daud.).

Boulenger, Cat. III pag. 559; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f.
Naturk. 1892 pag. 93 (*Trimeresurus*).

- 9559 a. Halb. **Ceylon**. Gek. 1889 von Hans Frubstorfer, Berlin.
9559 b—c. 5 erw., halb. u. jung. **Ebendaher**. Gesch. 1846 von H. Worms,
hier.

17. *Lachesis macrolepis* (Bedd.).

Boulenger, Cat. III pag. 560; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f.
Naturk. 1892 pag. 93 (*Trimeresurus*).

- 9560 a. 2 erw. Kodaikanal, Palni Hills, **Süd-Indien**. Gesch. 1889 von Theodor
Kolb, Madras.

18. *Lachesis punicea* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 560; Boettger, Ber. Offenbach. Ver. f.
Naturk. 1892 pag. 136 (*Trimeresurus*).

- 9560.1 a. Jung. Buitenzorg, **West-Java**. Gesch. 1890 von Dr. Adolf Strubell,
Bonn.
9560.1 b. Erw. (Rüppell, Cat. III BB 5a als *Trigonocephalus*). **Java**. Gesch.
1838 von Dr. W. von Siebold, Leiden.

19. *Lachesis borneensis* (Pts.).

Boulenger, Cat. III pag. 561.

- 9561 a. Erw. u. jung. Baramfluß in **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von der Rüppell-
reise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.

20. *Lachesis wagleri* (Boie).

Boulenger, Cat. III pag. 562.

- 9562 a. Jung (Typus). Baramfluß in **Nord-Borneo**. Erh. 1895 von der Ruppelreise Prof. Dr. W. Kükenthals, Jena.
- 9562 b. Halbw. (Typus). Bindjey, Sultanat Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1890 von Theodor und Egbert Engelhard, daselbst.
- 9562 c. Halbw. (Typus). Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens Hohwiesner, hier.
- 9562 d. Halbw. (Typus). Insel **Mindanao**, Philippinen. Gesch. 1890 von Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff, Manila.
- 9562 e. Erw. (Typus). **Mittel-Luzon**. Gesch. 1890 von demselben.
- 9562 f. Halbw. (Typus). Insel **Leyte**, Philippinen. Gesch. 1893 von demselben.
- 9562 g. Erw. (Typus). Pontianak, **West-Borneo**. Gesch. 1893 von Dr. H. Lenz, Lübeck.
- 9562 h. Erw. (var. D). Deli. **Nordost-Sumatra**. Gesch. 1886 von Clemens Hohwiesner.

21. *Lachesis bilineata* (Wied).

Boulenger, Cat. III pag. 565; Jan, Icon. Oph. Lief. 47, Taf. 1. Fig. 2 (*Bothrops*).

- 9565 a. Halbw. (Ruppell, Cat. III BB 3 a als *Trigonocephalus*: Original zu Jan's oben citierter Abbildung). **Brasilien**. Gesch. 1836 von Schöff Dr. Carl von Heyden, hier.

22. *Lachesis schlegeli* (Berth.).

Boulenger, Cat. III pag. 567.

- 9567 a. Erw. Cuenca, **Ecuador**. Gesch. 1896 von Konsul F. C. Lehmann, Popayán.
- 9567 b. 2 halbw. Cairo (La Junta) bei Limon, **Oestliches Costa Rica**. Gesch. 1892 von Carl Fleischmann, Guatemala.

Genus III. Sistrurus Garm.

1. *Sistrurus catenatus* (Rafin.).

Boulenger, Cat. III pag. 570.

- 9570 a. Erw. Milwaukee, **Wisconsin**. Gesch. 1893 von Bierbrauer R. Henrich, hier.
- 9570 b. Erw. (Ruppell, Cat. III DD 3 a als *Crotalus miliaris*). **Verein. Staaten**. Gesch. 1838 von Dr. med. Reuß und Engelmann, St. Louis.

Genus IV. Crotalus L.

1. *Crotalus terrificus* (Laur.).

Boulenger, Cat. III pag. 573.

- 9573 a. Erw. (var. A). **Mexiko** (Rüppell, Cat. III DD 1 b als *horridus*). Gesch. 1832 von F. A. Dillenburger, daselbst.
- 9573 b. 3 Klappern, 4 Giftzähne. **Rio Grande do Sul**, Süd-Brasilien. Gesch. 1875 von Oberlehrer Dr. Finger, hier.
- 9573 c. Erw. (var. B). **Brasilien** (Rüppell, Cat. III DD 1 a als *horridus*). Get. 1840 vom Naturh. Hofmuseum, Wien.
- 9573 d. Erw. u. jung (var. B). **Carácas, Venezuela**. Gek. 1897 von Ingenieur Müller, hier.

2. *Crotalus durissus* L.


Boulenger, Cat. III pag. 578.

- 9578 a. Erw. (Gestopft). **Südöstl. Verein. Staaten** (Rüppell, Cat. III DD 2 a). Gek. 1844 von Cardua.

3. *Crotalus horridus* L.

Boulenger, Cat. III pag. 578.

- 9579 a. Erw. **Verein. Staaten**. Gesch. 1866 von der Neuen Zoolog. Gesellschaft, hier.
- 9579 b. 2 erw. **Ebendaher**. Gesch. 1892 von derselben.



Verzeichnis der Schenker.

- Herr Ahlburg, Prof. Dr., Tokyo (Japan) †.
„ Albrecht, Missionar, Honore (Ostindien).
„ Andreae, Prof. Dr. Ach., Direktor des Römer-Museums, Hildesheim.
Augsburg, Museum des Naturhistorischen Vereins.
Herr Bamberger, Max. Kaufmann, Frankfurt a. M.
Basel, Naturhistorisches Museum.
Herr Bastier, Fr., Lehrer, Frankfurt a. M.
Herren Bauditsch & Co., Naturalienhändler, Triest.
Herr Becker, Adam, Sydney (Neusüdwaes) †.
„ von Bedriaga, Dr. phil. Jacques, Zoologe, Nizza.
„ Behrends, Phil. Friedr., Frankfurt a. M.
„ Benecke, Dr. med. O., Deli (Sumatra).
„ Berg, Dr. phil. Carlos, Direktor des Naturhistorischen Museums, Buenos Aires.
Berlin, Naturhistorisches Institut Linnæa.
„ Kgl. Museum für Naturkunde.
Herr Bernus, W. A., Bankier, Frankfurt a. M. †.
„ Beyerbach jun., Frankfurt a. M.
„ Beyschlag, Fritz, Kaufmann, Deli (Sumatra).
„ Blum, Oberlehrer J., Frankfurt a. M.
„ Boettger, Prof. Dr. phil. Oskar, Frankfurt a. M.
„ Boettger, Prof. Dr. Rud. Christ., Frankfurt a. M. †.
„ Boissoneau.
„ Boulenger, G. A., F. R. S., Sektionschef a. British Museum (Nat. Hist.), London.
„ Brauer, Dr. phil. August, Privatdocent für Zoologie, Marburg (Hessen).
„ Braun, Dr. phil. Max, Prof. der Zoologie, Rostock.
„ Braun, Feldmarschall Philipp, Lima (Peru).
„ Broemme, Dr. phil. Christian, Chemiker, Wiesbaden †.
„ Bütschli, Hofrat Dr. phil. Otto, Prof. der Zoologie, Heidelberg.
„ Cardua (viell. Dr. Carove, Friedberg) †.
„ Conéménos, César, Prevesa (Epirus).
„ Cordier, K. Wilh., Hofrat, Frankfurt a. M. †.
Darmstadt, Großherzgl. Naturhistorisches Museum.
Herr Deermann, H., Menageriebesitzer, Frankfurt a. M.
„ Dietze, Karl, Kunstmaler, Jugenheim (Bergstrasse).
„ Dillenburger, F. A., Kaufmann, Mexiko †.

- Herr Döbel, Dr. med. H. L. Batavia (Java) †.
„ Duschaneck, Josef. São Paulo (Brasilien).
„ Ebenau, Karl, Konsul, Kaufmann, Hamburg.
„ Edinger, Prof. Dr. med. Ludwig. Frankfurt a. M.
„ Eich, Bergingenieur, Geisnidda (Oberhessen) †.
„ Emmel, Ferdinand, Kaufmann, Hamburg.
„ Emmel, Friedrich, Arequipa (Perú).
Herren Engelhard, Gebr. Theodor und Egbert, Deli (Sumatra).
Herr Engelmann, Dr. med. Johann Georg, St. Louis (Miss.) †.
„ von Erlanger, Baron Carlo, Nieder-Ingelheim.
„ Eylandt, C., Naturalist, Askhabad (Transkaspien) †.
„ Finger, Dr. phil., Oberlehrer, Frankfurt a. M. †.
„ Finckh, H., Ludwigsburg †.
„ von Fischer, Johann, Zoologe, Montpellier (Hérault).
„ Fischer, Louis, Biskra (Algerien).
„ Flach, Dr. med. Karl, Aschaffenburg.
„ Fleck, Dr. phil. Eduard, Azuga (Rumänien).
„ Fleischmann, Karl, Kaufmann, Guatemala.
„ Flinsch, Heinrich, Frankfurt a. M.
Frankfurt a. M., Neue Zoologische Gesellschaft.
Herr Freyriß, Georg Wilhelm, Prof. der Zoologie, Rio de Janeiro †.
„ von Fritsch, Freiherr Dr. Karl, Prof. der Mineralogie, Halle a. Saale.
„ Frommel, August, Frankfurt a. M.
„ Fruhstorfer, Hans, Naturalienhändler, Berlin.
„ Gerold, G., Ingenieur, Port of Spain (Trinidad).
„ Geyler, Dr. phil. Theodor, Direktor des Botanischen Gartens, Frankfurt a. M. †.
„ Goldfuß, Otto, Zoologe, Halle a. S.
„ Haase, Dr. phil. Erich, Direktor des Naturhistor. Museums, Bangkok (Siam) †.
Hamburg, Naturhistorisches Museum.
Herr Hanau, Dr. med. Arthur, St. Gallen.
„ Happe, Karl, Rödelheim.
„ Henrich, Karl, Brauer, Frankfurt a. M.
„ Henrich, Rudolf, Brauer, Frankfurt a. M.
„ Herath, Gustav, Frankfurt a. M.
„ Herz, Otto, Naturalist, St. Petersburg.
„ Hesse, Paul, Kaufmann, Venedig.
„ von Heyden, Schöff Dr. Karl, Frankfurt a. M. †.
„ von Heyden, Major z. D. Dr. phil. Lukas, Frankfurt a. M.
„ Hirsch, Karl, Kaufmann, Frankfurt a. M.
„ Hohwiesner, Clemens, Kaufmann, Deli (Sumatra).
„ Hollmann, Lehrer, Vegesack bei Bremen.
„ Hübner, i. F. Hübner & Schlesinger, Kaufmann, Leipzig †.
„ Hübner, Georg, Naturalist, Dresden.
„ von Jhering, Dr. phil. Hermann, Direktor des Naturhist. Museums, São Paulo (Brasilien).

- Herr Jacobson, Edward, Konsul, Frankfurt a. M. †.
„ Jassy, Dr. phil. August, Apotheker, Frankfurt a. M.
„ Jenisson, Graf, Heidelberg †.
„ Jickeli, Dr. phil. Karl Fr., Hermannstadt (Siebenbürgen).
Karlsruhe, Zoolog. Institut der Grh. Technischen Hochschule.
Herr Keller, Dr. phil. Konrad, Prof. der Zoologie, Zürich.
„ Kinkelin, Apotheker Adolf, Nüruberg.
„ Kinkelin, Prof. Dr. Friedrich, Frankfurt a. M.
„ Kirchner, Wilhelm, Deutscher Konsul, Sydney (Neusüdwaless) †.
„ Kläsi, Konrad, Zürich.
„ Knoblauch, Ferdinand, Konsul in Neukaledonien, Frankfurt a. M. †.
„ Knoblauch, Karl, Kaufmann, Frankfurt a. M.
„ Kobelt, Dr. med. Wilhelm, Schwanheim a. M.
„ Koch, Adam, Konservator, Frankfurt a. M.
„ Koch III., G., Frankfurt a. M.
„ Koch, Otto, Kaufmann, Cebu (Philippinen) †.
Herren Koch, W. und Bruder, Brasilien †.
Herr König, Dr. phil. Alex., Prof. der Zoologie, Bonn.
„ Kolb, Theodor, Kaufmann, Madras †.
„ Koperberg, M., Mijningenieur, Pontianak (Borneo).
„ Kraatz, Dr. phil. Georg, Entomologe, Berlin.
Frau Krämer, H., Wwe., Frankfurt a. M.
„ Krieb, H., Wwe., Frankfurt a. M.
Herr Kückenthal, Dr. Willy, Prof. der Zoologie, Jena.
„ Leder, Hans, Naturalist, Jauernig (Oesterr.-Schlesien).
„ Lehmann, F. C., Deutscher Konsul, Popayán (U. S. Columbia).
Leiden, Kgl. Naturhist. Rijksmuseum.
Herr Lenz, Dr. phil. Heinr., Direktor des Naturhist. Museums, Lübeck.
„ von Leuchtenberg, Herzog Max E. J. N., München †.
„ Lörseh, E., Frankfurt a. M.
„ Löwenthal, Dr. phil., Frankfurt a. M. †.
London, British Museum (Nat. Hist.).
Herr von Ludwig, Baron, Stuttgart †.
Lübeck, Naturhistorisches Museum.
Herr Lünig, Theodor, Apotheker, Ciudad Bolivar (Venezuela).
Madras, Government Central Museum, Egmore.
Herr Mauß, F., Kgl. Belgischer Konsul, Valencia (Venezuela).
„ Miceli, Francesco, Tunis.
„ Michahelles, Dr. med., Triest.
„ de Mimont, Fr., Gutsbesitzer, St. Jean bei Xenochóri auf Euböa †.
„ von Moellendorff, Dr. phil. O. Fr., Konsul des Deutschen Reiches,
Kowno (Rußland).
„ von Mojsisovics, Dr. phil. August, Prof. der Zoologie, Graz †.
„ Mole, R. R., Port of Spain (Trinidad).
„ Müller, Dr. phil. August, Naturalienhändler, Berlin.
„ Müller, Prof. Carlos, São Paulo (Brasilien).
„ Müller, Amtsrichter, Lauterbach (Oberhessen).

- Herr Müller, Ingenieur, Frankfurt a. M.
„ Müller, Oberlehrer, Frankfurt a. M.
„ Nabert, D. O. W., Kaufmann, Frankfurt a. M.
„ Nägele, G., Pfarrer, Waltersweier bei Offenburg (Baden).
„ Nolte, Karl, Ingenieur, Frankfurt a. M.
Nürnberg, Museum der Naturhistorischen Gesellschaft.
Offenbach, Naturhistorisches Museum.
Frau von Panhuijs, Frankfurt a. M. †.
Herr Parrot, J. C., Frankfurt a. M.
„ Passavant, Ph. G., Sanitätsrat Dr. med., Frankfurt a. M. †.
„ Passavant, Theodor, Kaufmann, Frankfurt a. M. †.
„ Pauli, Hofrat Dr. med., Frankfurt a. M. †.
„ Peitsch, Dr. med., Batavia (Java) †.
St. Petersburg, Naturhist. Museum der Ksl. Akademie.
Herr Pöhl, C. A., Naturalienhändler, Hamburg.
„ von Radde, Wirkl. Staatsrat Dr. Gustav, Exc., Direktor des Kaukasi-
schen Museums, Tiflis.
„ Regel, Dr. Fritz, Prof. der Geographie, Jena.
„ Reibisch, Paul, Dresden-Plauen.
„ Reichard, Philipp, Hospitalmeister, Frankfurt a. M.
„ Rein, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. J. J., Bonn.
„ von Reinach, Baron Albert, Frankfurt a. M.
„ Reitter, Edmund, Entomologe, Paskau (Mähren).
„ Retowski, Staatsrat Otto, Gymnasiallehrer, Theodosia (Krim).
„ Reuleaux, Karl, Ingenieur, München.
„ Reuß, Dr. med. Adolf, St. Louis (Miss.) †.
„ Richters, Prof. Dr. phil. Ferdinand, Frankfurt a. M.
„ Rössing, W., Frankfurt a. M. †.
„ Rosenbach, W., Frankfurt a. M. †.
„ Rosenberg, W. F. H., Naturalienhändler, London.
„ von Rothschild, Baron A. M., Frankfurt a. M. †.
„ Rüppell, Dr. med. Eduard, Frankfurt a. M. †.
„ Schädle, Dr. med. H., Tanger (Marokko).
„ Schauf, Oberlehrer Dr. phil. W., Frankfurt a. M.
„ Schenck, Dr. phil. A., Privatdozent für Geographie, Halle a. S.
„ Scheuermann, Wilhelm, Kaufmann, Frankfurt a. M.
„ Schinz, Dr. phil. Hans, Prof. der Botanik, Zürich.
„ Schlesinger, i. F. Hübner & Schlesinger, Kaufmann, Leipzig.
„ Schlüter, Wilhelm, Naturalienhändler, Halle a. S.
„ Schmacker, Bernhard, Kaufmann, Shanghai †.
„ Schneider, G. D., Konstantinopel †.
„ Schneider, Gustav, Naturalienhändler, Basel.
„ Schneider, Prof. Dr. phil. Oskar, Dresden.
„ Schneider, W., Frankfurt a. M. †.
„ von Schönfeldt, H., Oberstlieutenant a. D., Siegen (Westfalen).
„ von Schouler, W., Wiesbaden †.
„ Schreiber, Dr. phil. Egid, Schulrat, Görz.

- Herr von Schröter, Guido, Deutscher Konsul, San José (Costa Rica).
„ Schumacher, Jakob, Frankfurt a. M.
„ Seitz, Albrecht, Kaufmann, Hamburg.
„ Semon, Dr. phil. R. W., Prof. der Zoologie, Jena.
„ de Seoane, Dr. V. Lopez, Jefe Superior de Administracion und Comisario Regio de Agricultura, Coruña (Spanien).
„ Siebel, Dr. med. W., Frankfurt a. M. †.
„ Siebert, August, Direktor des Palmengartens, Frankfurt a. M.
„ von Siebold, Dr. phil. Phil. Fr., Leiden †.
„ Simon, Hans, Kaufmann, Stuttgart.
„ Spatz, Paul, Gabes (Tunesien).
„ Stiebel, Hofrat Dr. med. Sal., Frankfurt a. M. †.
„ Stratz, Dr. med., Haag (Holland).
„ Strubell, Dr. phil. Adolf, Privatdozent für Zoologie, Bonn.
„ Stumpff, Anton, Kaufmann, Loucombé (Nossibé) †.
„ Stussiner, Josef, K. k. Postbeamter, Laibach.
„ Textor, Albert, Eisenach.
Fräulein Thiesse, Joséphine, Chalkis (Euböa).
Herr Tschapeck, Hauptm.-Auditor Hippolyt, Wien †.
„ Urich, F. W., Kaufmann, Port of Spain (Trinidad).
„ Valentin, Dr. Jean, Geologe, Buenos Aires †.
„ Voeltzkow, Dr. phil. Alfred, Zoologe, Berlin.
„ Weis, Albrecht, Bankbeamter, Frankfurt a. M.
„ Werner, Dr. phil. Franz, Zoologe, Wien.
„ Wichmann, Hermann, Kaufmann, Frankfurt a. M.
Wien, K. k. Zoologisches Hofmuseum.
Herr Will, Premierlieutenant Dr. phil. Fr., Zoologe, Erlangen.
„ Winter, Siegmund, Lithograph, Frankfurt a. M.
Herren Worms, Gebr. Gabriel & Moritz, Colombo (Ceylon) †.
Herr Zipperlen, Dr. med. A., Cincinnati (Ohio).



Sachregister.

- A**bastor. 79.
 Ablabes, 78.
 Ablabophis, 35.
 Acanthophis, 118.
 Achalinus, 33.
 Acrochordinae, 16.
 Acrochordus, 16.
 acuminatus (Dryophis), 108.
 acuminatus (Oxybelis), 108.
 acutirostris (Calamaria), 86
 aegyptiaca (Dipsas), 91.
 aeneus (Dryinus), 84.
 Aepysurus, 114.
 aesculapii (Coluber), 52.
 aesculapii (Erythrolamprus), 109.
 aestiva (Contia), 76.
 aestivus (Herpetodryas), 76.
 aestivus (Philodryas), 99
 affinis (Rhadinaea), 67.
 agamensis (Calamaria), 84.
 agassizi (Contia), 99.
 agassizi (Pseudablabes), 99.
 agilis (Erythrolamprus), 109.
 ahaetulla (Dendrophis), 60.
 albifrons (Glauconia), 6.
 albipuncta (Glauconia), 6.
 albiventris (Coluber), 62.
 albiventris (Liophis), 61.
 albocinctus (Simotes), 73.
 albofusca (Dipsas), 95.
 albofusca (Leptodira), 95.
 albus (Brachyorrhus), 32.
 algirus (Zamenis), 45.
 alkeni (Calamaria), 83.
 almadensis (Liophis), 62.
 alternans (Brachyorrhus), 87.
 alternans (Eurostus), 87.
 alternans (Hypsirhina), 87.
 alternata (Lachesis), 138.
 amaliae (Coronella), 71.
 amaliae (Rhinechis), 71.
 Amblycephalidae, 127.
 Amblycephalus, 127.
 amethystinus (Python), 7.
 ammodytes (Vipera), 132.
 Amplorhinus, 99.
 anamallensis (Lachesis), 140.
 anamallensis (Trimeresurus), 140
 Ancistrodon, 136.
 angolensis (Dromophis), 104.
 angolensis (Psammophis), 104.
 anguilliformis (Aepysurus), 114.
 angulata (Homalopsis), 30.
 angulatus (Dipsadomorphus), 93.
 angulatus (Helicops), 30.
 annectens (Doliophis), 124.
 annularis (Bungarus), 119.
 annularis (Tropidonotus), 22, 23.
 annulata (Dipsas), 95.
 annulata (Leptodira), 95.
 anomala (Rhadinaea), 66.
 anomalus (Drepanodon), 72.
 anomalus (Dromicus), 61.
 anomalus (Oxyrrhopus), 72.
 antarcticus (Acanthophis), 118.
 antillensis (Dromicus), 61.
 Aparallactus, 111.
 Aporophis, 65.
 Apostolepis, 111.
 aretiventris (Calamaria), 77.
 arenicola (Echis), 135.
 arietans (Bitis), 133.
 arietans (Vipera), 133.
 arnensis (Simotes), 74.
 asiannus (Zamenis), 43, 44.
 asper (Engygrus), 11.
 asperrimus (Tropidonotus), 23.
 Aspidites, 9.

- Aspidura, 33.
 aspis (Vipera), 132.
 assimilis (Apostolepis), 111.
 ater (Coluber), 53.
 ater (Tropidonotus), 21.
 ater (Typhlops), 5.
 Atheris, 135.
 Atractaspis, 136.
 Atractus, 79.
 atratus (Streptophorus), 31.
 atrox (Lachesis), 138.
 atrox (Trigonocephalus), 137, 138.
 aulicus (Dipsas), 37.
 aulicus (Lycodon), 37.
 auriculatus (Tropidonotus), 28.
 aurora (Coronella), 35.
 aurora (Lamprophis), 35.
 australis (Enygrus), 11.
 anstralis (Tropidonotus), 19.
 austriaca (Coronella), 70.
- B**adius (Atractus), 79.
 badius (Geophis), 79.
 baliodirus (Ablabes), 78.
 batjanensis (Stegonotus), 39.
 belli (Dispholidus), 108.
 bennetti (Hypsirhina), 88.
 bernieri (Dromicodryas), 17.
 bernieri (Herpetodryas), 17.
 berus (Vipera), 130.
 bibroni (Atractaspis), 136.
 bibroni (Enygrus), 11.
 bicarinatus (Herpetodryas), 55.
 bicincta (Urotheca), 68.
 bicolor (Coluber), 66.
 bicolor (Gluconia), 6.
 bicolor (Hydrophis), 112.
 bifossatus (Drymobius), 47.
 bilineata (Calamaria), 85.
 bilineata (Hypsirhina), 88.
 bilineata (Lachesis), 141.
 bilineatus (Adeniophis), 124.
 bilineatus (Ancistrodon), 136.
 bilineatus (Bothrops), 141.
 bilineatus (Doliophis), 124.
 bilineatus (Drymobius), 47.
 bilineatus (Trigonocephalus), 141.
 bipunctatus (Coluber), 18.
 bipunctatus (Erythrolamprus), 110.
 bipunctatus (Tropidonotus), 18.
 bisubocularis (Typhlops), 5.
 bitaeniatus (Zamenis), 42.
 Bitis, 133.
 bitorquata (Alecto), 118.
 bitorquata (Calamaria), 74.
 bitorquatus (Hoplocephalus), 118.
 bitorquatus (Oligodon), 74.
 bitorquatus (Oxyrrhopus), 96.
 bivirgatus (Doliophis), 123.
 bivittatus (Polyodontophis), 17.
 blandingi (Dipsadomorphus), 94.
 blandingi (Dipsas), 94.
 blomhoffi (Ancistrodon), 137.
 blomhoffi (Trigonocephalus), 137.
 blythi (Rhinophis), 15.
 Boa, 12.
 boa (Haplopeltura), 127.
 boa (Nardoa), 7.
 boddaerti (Drymobius), 47.
 boddaerti (Herpetodryas), 47.
 boettgeri (Callophis), 123.
 boettgeri (Typhlops), 4.
 bogorensis (Calamaria), 83.
 Boidae, 7.
 Boinae, 9.
 bolivianus (Philodryas), 100.
 Boodon, 35.
 borneensis (Calamaria), 85.
 borneensis (Lachesis), 140.
 boulengeri (Elaphechis), 119.
 boulengeri (Elapsoidea), 119.
 Brachyorrhus, 32.
 brachystoma (Lachesis), 139.
 braminus (Typhlops), 1.
 breviceps (Rhadinaea), 65.
 brevis (Silybura), 15.
 brugmansii (Distira), 113.
 buccata (Homalopsis), 88.
 Bungarus, 119.
 bungarus (Naja), 122.
- c**aeca (Naja), 121.
 caerulescens (Hydrophis), 112.
 Calamaria, 83.

- Calamohabidium*, 82.
calligaster (*Dendrophis*), 56.
calligaster (*Hemibungarus*), 122.
callistus (*Tropidonotus*), 28.
Callopetlis, 97.
Callophis, 123.
cana (*Pseudaspis*), 40.
candidus (*Bungarus*), 119.
caninus (*Corallus*), 11.
cantoris (*Coluber*), 50.
cantoris (*Hydrophis*), 113.
canus (*Coluber*), 40.
capense (*Lycophidium*), 36.
capensis (*Bucephalus*), 108.
capucinus (*Lycodon*), 37.
carbonarius (*Zamenis*), 43.
carinata (*Dipsas*), 128.
carinatus (*Amblycephalus*), 128.
carinatus (*Echis*), 135.
carinatus (*Enygrus*), 11.
carinatus (*Herpetodryas*), 55.
carinatus (*Zaocys*), 40.
carinicauda (*Helicops*), 30.
carinicauda (*Homalopsis*), 33.
caspicus (*Coluber*), 43.
catenatus (*Sistrurus*), 141.
catesbyi (*Dipsas*), 129.
catesbyi (*Leptognathus*), 129.
catesbyi (*Uromacer*), 60.
caudalis (*Bitis*), 134.
caudalis (*Vipera*), 134.
caudolineatus (*Dendrelaphis*), 57.
Causus, 130.
Cemophora, 73.
cenchoa (*Himantodes*), 94.
cenchris (*Epicrates*), 9.
Cerastes, 134.
cerastes (*Vipera*), 134, 135.
cerastinus (*Acanthophis*), 118.
ceratophorus (*Atheris*), 135.
Cerberus, 88.
ceylonensis (*Dipsadomorphus*), 92.
ceylonensis (*Haplocercus*), 33.
ceylonicus (*Bungarus*), 119.
chaussoi (*Dromicus*), 60.
Chersydrus, 16.
childreni (*Liasis*), 7.
chinensis (*Hypsirhina*), 88.
Chlorophis, 58.
Chondropython, 9.
chrysargoides (*Tropidonotus*), 27.
chrysargus (*Tropidonotus*), 26, 27.
chrysochlora (*Chrysopelea*), 109.
Chrysopelea, 108.
citrina (*Eteirodipsas*), 90.
climacophorus (*Coluber*), 52.
cloelia (*Oxyrrhopus*), 97.
cobella (*Coronella*), 50, 66.
cobella (*Rhadinaea*), 66.
coccinea (*Cemophora*), 73.
Coelopeltis, 101.
collaris (*Calamaria*), 84.
collaris (*Contia*), 76.
collaris (*Coronella*), 72.
collaris (*Polyodontophis*), 17.
Coluber, 49.
Colubridae, 16.
colubrina (*Dipsas*), 90.
colubrina (*Eteirodipsas*), 90.
Colubrinae, 16.
colubrinus (*Platurus*), 115.
colubrinus (*Xenodon*), 63.
congica (*Atractaspis*), 136.
congius (*Typhlops*), 4.
conicus (*Eryx*), 13.
conjuncta (*Glauconia*), 6.
conspicillatus (*Coluber*), 52.
conspicillatus (*Tropidonotus*), 21.
constrictor (*Boa*), 12.
constrictor (*Zamenis*), 41.
contaminata (*Calamaria*), 85.
Contia, 76.
contortrix (*Ancistrodon*), 136.
cookei (*Corallus*), 10.
corais (*Coluber*), 49.
corallinus (*Elaps*), 125.
Corallus, 10.
cornuta (*Bitis*), 133.
cornuta (*Vipera*), 133.
cornutus (*Cerastes*), 134.
coronata (*Alecto*), 117.
coronata (*Denisonia*), 117.
Coronella, 70.
coronella (*Ablabes*), 77

coronella (Contia), 77.
 crassus (Typhlops), 3.
 cristagalli (Langaha), 90.
 Crotalinae, 136.
 Crotalus, 142.
 crucifer (Psammophis), 104.
 cucullata (Coronella), 106.
 cucullatus (Macroprotodon), 106.
 cyanocincta (Distira), 113.
 Cyclocorus, 35.
 Cylindrophis, 14.
 cynodon (Dipsadomorphus), 94.
 cynodon (Dipsas), 94.

daemeli (Denisonia), 117.
 dahli (Tyria), 44.
 dahli (Zamenis), 44.
 Dasypeltis, 86.
 davisoni (Dryocalamus), 40.
 davisoni (Urupe), 40.
 decemlineata (Contia), 76.
 degenhardti (Stenorhina), 111.
 dekayi (Ichnognathus), 31.
 delalandei (Typhlops), 5.
 Dendraspis, 127.
 Dendrelaphis, 57.
 dendrophila (Dipsas), 92.
 dendrophilus (Dipsadomorphus), 92.
 Dendrophis, 56.
 dendrophis (Drymobius), 48.
 Denisonia, 117.
 deppei (Coluber), 54.
 dhumnades (Zaoecys), 40.
 diadema (Lytorhynchus), 46.
 diadema (Pseudelaps), 115.
 diadema (Simotes), 46.
 diadema (Zamenis), 46.
 diadematus (Streptophorus), 31.
 Diemenia, 116.
 digitalis (Coluber), 96.
 digitalis (Oxyrrhopus), 96.
 dimidiata (Calamaria), 83.
 dinga (Typhlops), 5.
 Dinodon, 38.
 dione (Coluber), 51.
 diporus (Bothrops), 138.
 Dipsadomorphinae, 89.

Dipsadomorphus, 92.
 dispar (Dryophis), 106.
 Dispholidus, 108.
 dissoleucus (Elaps), 126.
 distantii (Glauconia), 6.
 Distira, 113.
 diviniloqua (Boa), 12.
 doliata (Coronella), 61, 62, 66.
 doliatus (Oxyrrhopus), 97.
 dolichoercus (Tropidonotus), 25.
 Doliophis, 123.
 dorbignyi (Heterodon), 64.
 dorbignyi (Lystrophis), 64.
 dorsalis (Philothamnus), 59.
 dorsatus (Tomodon), 99.
 drapiezi (Dipsadomorphus), 93.
 drapiezi (Dipsas), 93.
 Drepanodon, 72.
 Dromicodryas, 17.
 Dromicus, 60.
 Dromophis, 102.
 Drymobius, 47.
 Dryocalamus, 39.
 Dryophis, 106.
 dumerili (Stegonotus), 39.
 durissus (Crotalus), 142.

Echis, 135.
 Elapechis, 118.
 Elapinae, 115.
 Elapoides, 33.
 Elapomorphus, 111.
 Elapops, 112.
 Elaps, 125.
 elaps (Ophiophagus), 122.
 elegans (Eryx), 13.
 elegans (Himantodes), 94.
 elegans (Philodryas), 101.
 elegans (Psammophis), 104.
 elegans (Tachymenis), 101.
 emmeli (Atractus), 81.
 emmeli (Geophis), 81.
 Enhydrina, 114.
 Enhydris, 114.
 enhydris (Hypsirrhina), 87.
 Enygrus, 11.
 Epicrates, 9.

- epinephelus (Liophis), 62.
eques (Coluber), 18.
eques (Tropidonotus), 18.
erythrogrammus (Abastor), 79.
Erythrolamprus, 109.
erythrurus (Coluber), 54.
Eryx, 13.
eschrichti (Typhlops), 4.
Eteirodipsas, 90.
Eunectes, 12.
euhratica (Vipera), 133.
euproctus (Typhlops), 1. 2.
entropis (Phrynonax), 49.
everetti (Oligodon), 75.
eximia (Coronella), 72.
eydouxii (Aepysurus), 114.
- fallax** (Tarbophis), 91.
fasciata (Dasypeltis), 86.
fasciata (Naja), 121.
fasciatum (Lycophidium), 37.
fasciatus (Bungarus), 119.
fasciatus (Hamadryas), 122.
fasciatus (Hemibungarus), 122.
fasciatus (Hydrophis), 113.
fasciatus (Phrynonax), 49.
fasciatus (Tropidonotus), 24. 31.
fasciolata (Dasypeltis), 86.
fasciolatus (Dryophis), 107.
favae (Atractus), 81.
favae (Calamaria), 81.
fedtschenkoi (Zamenis), 45.
ferox (Hypsirhynchus), 60.
ferox (Tropidonotus), 24.
fissidens (Erythrolamprus), 110.
fitzingeri (Coronella), 71.
fitzingeri (Oxyrrhopus), 97.
flagelliformis (Zamenis), 41.
flavescens (Coluber), 52.
flavescens (Tropidonotus), 23.
flaviceps (Bungarus), 120.
flaviceps (Doliophis), 123.
flaviceps (Macropisthodon), 28.
flavifrenatus (Aporophis), 65.
flavigularis (Thrasops), 59.
flaviventer (Typhlops), 3.
flaviventris (Coluber), 41.
flaviventris (Zamenis), 41.
flavolineatus (Herpetodryas), 55.
flavomaculata (Lachesis), 140.
flavoviridis (Lachesis), 139.
Fleischmannia, 69.
floriceps (Coluber), 45, 103.
florulentus (Coluber), 44, 45.
florulentus (Zamenis), 45.
Fordonia, 89.
formosanus (Dinodon), 38.
formosanus (Simotes), 73.
formosus (Dendrophis), 57.
formosus (Lycodon), 96.
forsteni (Rhabdophidium), 81.
frontalis (Elaps), 126.
fronticinetus (Dryophis), 106.
fruhstorferi (Tetralepis), 35.
fuliginoides (Tropidonotus), 19.
fuliginosus (Boodon), 36.
fulvius (Elaps), 126.
furcatus (Elaps), 124.
Furina, 124.
fusca (Dipsas), 92.
fusca (Rhadinaea), 67.
fuscum (Trachischium), 32.
fuscus (Dipsadomorphus), 92.
fuscus (Elapoides), 33.
fuscus (Epicrates), 10.
fuscus (Zaoecys), 41.
- gabonica** (Bitis), 134.
gaimardi (Dipsas), 90.
Gastropyxis, 59.
gastrostictus (Elaps), 125.
geminatus (Polyodontophis), 17.
gemniannulis (Hemibungarus), 123.
gemonensis (Zamenis), 43.
Geodipsas, 89.
geometricus (Boodon), 35.
Geophis, 81.
gervaisi (Calamaria), 83.
getulia (Coronella), 71.
giron dica (Coronella), 71.
Glauconia, 6.
Glauconiidae, 6.
Gonionotophis, 35.
gracilis (Calamaria), 86.

- gracilis* (Callophis), 123.
gracilis (Hydrophis), 112.
graminea (Lachesis), 139.
gramineus (Trimeresurus), 139.
granulatus (Chersydrus), 16.
granuliceps (Stenophis), 90.
Grayia, 79.
guentheri (Elapechis), 118.
guentheri (Elapsoidea), 118.
guentheri (Erythrolamprus), 109.
guentheri (Trachischium), 32.
guyanense (Rhinostoma), 98.
guttatus (Coluber), 72.
- h**aje (*Naja*), 120.
hainanensis (Simotes), 73.
halmahericus (Tropidonotus), 28.
halys (Ancistrodon), 137.
halys (Trigonocephalus), 137.
Haplocercus, 33.
Haplopeltura, 127.
hardwicki (Enhydris), 114.
harriettae (Pseudelaps), 115.
heathi (Drymobius), 47.
heathi (Herpetodyras), 47.
hebe (Lycodon), 37.
Helicops, 29.
Hemibungarus, 122.
Hemirhagerrihis, 99.
herminae (Ablabes), 78.
Herpetodyras, 55.
herzi (Simotes), 50.
hessei (Elapechis), 118.
hessei (Elapsoidea), 118.
heterodermus (Chlorophis), 58.
heterodermus (Philothamnus), 58.
Heterodon, 65.
heterolepidotus (Chlorophis), 58.
heterolepidotus (Philothamnus), 58.
heterozonus (Elaps), 125.
heterurus (Stegonotus), 39.
hexagonotus (Xenelaphis), 47.
hierosolymitanus (Psammophis), 103.
hildebrandti (Atractaspis), 136.
himalayanus (Tropidonotus), 26.
Himantodes, 94.
hippocrepis (Zamenis), 46.
hippus (Coluber), 22.
hispanica (Coronella), 71.
histricus (Lystrophis), 64.
Homalocranium, 110.
Homalopsinae, 87.
Homalopsis, 88.
Homalosoma, 77.
Homorelaps, 125.
Hoplocephalus, 118.
hoplogaster (Chlorophis), 58.
Hormonotus, 37.
horridus (Crotalus), 142.
hortulanus (Corallus), 10.
hotamboeia (Leptodira), 94.
hugyi (Vipera), 132.
Hydrophiinae, 112.
Hydrophis, 112.
Hydrops, 70.
Hydrus, 112.
hypnale (Ancistrodon), 137.
Hypsirhina, 87.
Hypsirhynchus, 60.
- i**berus (Tarbophis), 91.
ikaheka (Micropechis), 118.
Ilysia, 14.
Ilysiidae, 14.
immaculatus (Oxyrrhopus), 96.
imperator (Boa), 12.
infernalis (Tropidonotus), 18.
intralineata (Geodipsas), 89.
infrataeniatus (Helicops), 30.
inornata (Cont a), 76.
inornatus (Ablabes), 76.
inornatus (Pseudoxenodon), 29.
insignitus (Coelopeltis), 101.
intermedia (Langaha), 90.
intermedius (Typhlops), 4.
intestinalis (Doliophis), 124.
iris (Calamaria), 84.
irregularis (Atractaspis), 136.
irregularis (Chlorophis), 58.
irregularis (Dipsadomorphus), 93.
irregularis (Dipsas), 93.
irregularis (Philothamnus), 58.
Ischnognathus, 31.
Itycyphus, 89.

- jaculus** (Eryx), 13.
jaegeri (Rhadinaca), 67.
jamesoni (Dendraspis), 127.
japonicus (Dinodon), 38.
japonicus (Hemibungarus), 123.
jararaca (Trigonocephalus), 138.
javanicus (Acrochordus), 16.
jerdoni (Distira), 114.
johni (Eryx), 13.
juliae (Liophis), 63.
- karelini** (Zamenis), 44.
kelleri (Hemirhagerrhis), 99.
kinkelini (Rhadinaca), 68.
kirtlandi (Dryophis), 107.
kirtlandi (Thelotornis), 107.
korros (Zamenis), 41.
kuekenthali (Calamohabdium), 82.
- labuanensis** (Simotes), 73.
lacertina (Coclopetlis), 101, 102.
Lachesis, 137.
lacrymans (Coluber), 103.
lactens (Homolepis), 125.
ladacensis (Zamenis), 44.
lactus (Dryophis), 106, 107.
laeviceps (Atheris), 135.
laevicollis (Dendrophis), 55.
laevis (Amblycephalus), 127.
laevis (Coronella), 71.
Lamprophis, 35.
lanceolata (Lachesis), 137.
Langaha, 90.
lausbergi (Streptophorus), 31.
latastei (Vipera), 132.
laterale (Lycophidium), 36.
lateralis (Tropidonotus), 25.
laticaudatus (Platurus), 114.
latifasciatus (Dipsadomorphus), 93.
latirostris (Philodryas), 100.
lebetina (Vipera), 133.
lehmanni (Atractus), 80.
lemniscatus (Elapomorphus), 111.
lenzi (Typhlops), 2.
leopardinus (Coluber), 50.
leopardinus (Helicops), 30.
Leptocalamus, 75.
Leptodira, 94.
Leptognathus, 128.
Leptophis, 59.
leucobalia (Fordonia), 89.
leucocephala (Calamaria), 84.
leucodira (Naja), 121.
leucomelas (Himantodes), 94.
Liasis, 7.
lichtensteini (Coluber), 48.
lineatus (Aporophis), 65.
lineatus (Boodon), 36.
lineatus (Cyclocorus), 35.
lineatus (Doliophis), 124.
lineatus (Herpetodryas), 65.
lineatus (Typhlops), 1.
lineolatum (Taphrometopon), 103.
lineolatus (Dendrophis), 57.
linnei (Calamaria), 85.
liocercus (Leptophis), 60.
Lioheterodon, 29.
Liophis, 61.
longicauda (Ablabes), 79.
longiceps (Pseudorhabdium), 82.
longissimus (Coluber), 52.
loreatus (Hydrophis), 114.
lowi (Calamaria), 85.
lumbicalis (Typhlops), 3.
lumbicoidea (Calamaria), 83.
lutea (Lachesis), 139.
lateus (Trimeresurus), 139.
lutrix (Homalosoma), 77.
luzonensis (Zaocys), 40.
Lycodon, 37.
Lycognathopsis, 34.
Lycophidium, 36.
Lystrophis, 64.
Lytorhynchus, 46.
- macclellandi** (Callophis), 123.
macrolepis (Glauconia), 6.
macrolepis (Lachesis), 140.
macrolepis (Trimeresurus), 140.
macrophthalmus (Herpetodryas), 55.
Macropisthodon, 28.
Macroprotodon, 106.
macrops (Pseudoxenodon), 29.
maculata (Denisonia), 117.

- maculata (Ungalia), 12.
 maculatus (Cylindrophis), 14.
 maculatus (Hydrus), 112.
 maculatus (Oxyrrhopus), 97.
 maculatus (Streptophorus), 31.
 maculatus (Tropidonotus), 27.
 maculiceps (Diemenia), 116.
 madagascariensis (Boa), 12.
 madagascariensis (Corallus), 11.
 madagascariensis (Heterodon), 29.
 madagascariensis (Lioheterodon), 29.
 madagascariensis (Mimophis), 105.
 madagascariensis (Typhlops), 2.
 madurensis (Platyplectrurus), 15.
 mahfalensis (Mimophis), 105.
 major (Ablabes), 78.
 maregravii (Elaps), 126.
 margaritiferus (Drymobius), 48.
 martii (Homalopsis), 70, 80.
 mauritanica (Vipera), 133.
 mechowii (Xenocalamus), 111.
 medicii (Dasypeltis), 86.
 melanocephala (Coronella), 110.
 melanocephalum (Homalocranium), 110.
 melanocephalum (Homalosoma), 75.
 melanocephalus (Aspidites), 9.
 melanocephalus (Oligodon), 75.
 melanocephalus (Polyodontophis), 17.
 melanocephalus (Rhynchocalamus), 75.
 melanogaster (Pararhadinaea), 33.
 melanoleuca (Naja), 120.
 melanolenus (Coluber), 54.
 melanostigma (Liophis), 63.
 melanotus (Dipsadomorphus), 92.
 melanotus (Liophis), 62.
 melanozostus (Tropidonotus), 22.
 melanurus (Coluber), 50, 53.
 mentovarius (Zamenis), 42.
 merremi (Coronella), 61, 66.
 merremi (Rhadinaea), 66.
 merremi (Xenodon), 64.
 meyerinki (Simotes), 74.
 Microelaps, 111.
 Micropechis, 118.
 micropholis (Coronella), 72.
 mikani (Leptognathus), 129.
 miliaris (Crotalus), 141.
 miliaris (Eryx), 13.
 Mimophis, 105.
 miniatus (Itycyphus), 89.
 miniatus (Philodryas), 89.
 miniatus (Tropidonotus), 27.
 miolapis (Dromicus), 67.
 mipartitus (Elaps), 127.
 modesta (Boa), 10.
 modesta (Calamaria), 83.
 modestum (Oxyrhabdium), 32.
 modestus (Ablabes), 76.
 modestus (Cyclophis), 76.
 modestus (Dendrelaphis), 58.
 modestus (Elapops), 112.
 modestus (Helicops), 30.
 modestus (Hornonotus), 37.
 modestus (Lioheterodon), 29.
 modestus (Stegonotus), 38.
 moellendorffi (Amblycephalus), 128.
 moellendorffi (Coluber), 52.
 moellendorffi (Cynophis), 52.
 moellendorffi (Pareas), 128.
 moilensis (Coelopeltis), 102.
 moilensis (Coluber), 102.
 molurus (Python), 8.
 moniliger (Pammophis), 103.
 monochrous (Calamaria), 83.
 monozonus (Erythrolamprus), 109.
 monspessulana (Coelopeltis), 101.
 monticola (Lachesis), 139.
 mucosus (Ptyas), 41.
 mucosus (Zamenis), 41.
 mucronatus (Typhlops), 4.
 mucroso (Typhlops), 5.
 muelleri (Calamaria), 86.
 muelleri (Diemenia), 115.
 muelleri (Microelaps), 111.
 muelleri (Pseudelaps), 115.
 muelleri (Stegonotus), 39.
 muelleri (Typhlops), 2.
 multicinctus (Bungarus), 119.
 multicinctus (Dipsadomorphus), 93.
 multimaculata (Dipsas), 92.
 multimaculata (Dipsina), 102.
 multimaculatum (Lycophidium), 37.
 multimaculatus (Amplorhinus), 99.
 multimaculatus (Dipsadomorphus), 92.

multimaculatus (Psammophylax), 99.
multimaculatus (Rhamphiophis), 102.
murinus (Eunectes), 12.
muta (Lachesis), 137.
mycterizans (Dryophis), 107.

Naja, 120.

najadum (Zamenis), 44.
Nardoa, 7.
nasicornis (Bitis), 134.
nasus (Contia), 77.
nasuta (Langaha), 90.
nasutus (Dryinus), 106. 107.
natrix (Tropidonotus), 19.
nattereri (Thamnodynastes), 98.
nebulata (Dipsas), 79.
nebulata (Leptognathus), 79.
nebulata (Petalognathus), 79.
neuwiedi (Lachesis), 138.
neuwiedi (Oxyrrhopus), 97.
neuwiedi (Xenodon), 63.
nigra (Silybura), 14.
nigricans (Stenostoma), 6.
nigricollis (Naja), 120.
nigrocinctus (Elaps), 126.
nigrolineatus (Typhlops), 4.
nigroluteus (Tretanorhinus), 30.
nigromarginatus (Zaocys), 40.
nototaenia (Amplorhinus), 99.
nummifer (Coluber), 45.
nummifer (Zamenis), 45.
nummifera (Atropos), 138.
nummifera (Lachesis), 138.
nympha (Clelia), 39.
nympha (Dryocalamus), 39.
obscura (Fleischmannia), 69.
obsoletus (Coluber), 52.
obtusa (Vipera), 133.
obtusus (Coluber), 91.
obtusus (Tarbophis), 91.
occidentalis (Leptophis), 59.
occipitalis (Cloelia), 97.
occipitalis (Furina), 124.
occipitalis (Oxyrrhopus), 97.
occipitalis (Rhadinaea), 67.
occipitomaclulatus (Ischnognathus), 31.
ocellatus (Tropidonotus), 24.

octolineatus (Simotes), 73.
Ogmodon, 115.
offersi (Herpetodryas), 47.
offersi (Philodryas), 100.
Oligodon, 74.
olivacea (Coronella), 22.
olivaceus (Boodon), 36.
olivaceus (Tropidonotus), 22.
Ophidia, 1.
ordinatus (Tropidonotus), 18.
ornata (Chrysopelea), 108.
ornata (Distira), 113.
ornatus (Hydrophis), 113.
ornatus (Hydrus), 112.
Oxybelis, 108.
oxycephalus (Coluber), 53.
Oxyrhabdium, 32.
Oxyrrhopus, 96.
oxyrrhynchus (Rhinophis), 15.
oxyrrhynchus (Uromacer), 60.

pallida (Naja), 120.

pallidum (Homalocranium), 110.
palmarum (Dasypeltis), 86. 87.
pammeces (Typhlops), 2.
pantherinus (Ptyas), 47.
parallelus (Coluber), 46.
Pararhadinaea, 33.
parvifrons (Liophis), 63.
paucisquamatus (Typhlops), 5.
pavimentata (Calamaria), 85.
pavo (Echis), 135.
pavonina (Leptognathus), 129.
pelamis (Hydrophis), 112.
perroteti (Xylophis), 32.
persa (Tropidonotus), 20.
personata (Leptodira), 95.
peruana (Leptognathus), 128.
peruviana (Tachymenis), 98.
Petalognathus, 79.
petolarius (Lycodon), 96.
petolarius (Oxyrrhopus), 96.
phaenochalinus (Simotes), 74.
philippinus (Ablabes), 78.
philippinus (Doliophis), 124.
Philodryas, 99.
Philothamnus, 58.

phocarum (Pseudaspis), 40.
 Phrynonax, 48.
 picta (Lachesis), 138.
 pictiventris (Helicops), 30.
 picturatus (Tropidonotus), 19, 20.
 pictus (Bothrops), 138.
 pictus (Dendrophis), 56, 57.
 pictus (Psammodynastes), 105.
 piscator (Tropidonotus), 22.
 piscivorus (Ancistrodon), 136.
 planiceps (Homalocranium), 110.
 planiceps (Rhinophis), 15.
 Platurus, 114.
 platurus (Hydrus), 112.
 platyceph (Tropidonotus), 25.
 Platyplectrurus, 15.
 platyrrhinus (Heterodon), 65.
 plumbea (Hypsirhina), 87.
 plumbeum (Brachyrhynchus), 97.
 plumbeus (Coluber), 97.
 plumbiceps (Coronella), 71.
 plumbicolor (Macropisthodon), 29.
 poecilogyrus (Liophis), 61.
 poecilonotus (Phrynonax), 49.
 poecilostoma (Tropidonotus), 52.
 polygrammicus (Typhlops), 3.
 Polyodontophis, 16.
 ponticus (Tropidonotus), 20.
 porphyraceus (Coluber), 50.
 porphyraceus (Pseudechis), 117.
 porphyreus (Coluber), 117.
 praeornatus (Dromophis), 102.
 prasinus (Dryinus), 106.
 prasinus (Dryophis), 106.
 prester (Vipera), 131.
 proboscideum (Rhinostoma), 76.
 pryeri (Tropidonotus), 26.
 Psammodynastes, 105.
 Psammophis, 103.
 psammophis (Diemenia), 116.
 psammophis (Pseudelaps), 116.
 Pseudablades, 99.
 Pseudaspis, 40.
 Pseudechis, 117.
 Pseudelaps, 115.
 Pseudorhabdium, 82.
 Pseudoxenodon, 29.

pullatus (Spilotes), 49.
 pulneyensis (Silybura), 14.
 pulverulentus (Psammodynastes), 105.
 punctata (Coronella), 72.
 punctatissima (Dipsas), 98.
 punctatissimus (Psammodynastes), 98.
 punctatolineata (Contia), 77.
 punctatolineatus (Cyclophis), 77.
 punctatus (Homolepsis), 125.
 punctatus (Psammophis), 103.
 punctatus (Python), 7.
 punctatus (Typhlops), 4.
 punctiventris (Tropidonotus), 19.
 punctulatus (Dendrophis), 56, 57.
 punctulatus (Psammophis), 103.
 punicea (Lachesis), 140.
 puniceus (Trigonocephalus), 140.
 puniceus (Trimeresurus), 140.
 purpurascens (Sinotes), 73.
 pustulatus (Thrasops), 59.
 Python, 7.
 Pythoninae, 7.

quadrilineatus (Boodon), 36.
 quadrilineatus (Coluber), 50.
 quadrilineatus (Dromicodryas), 17.
 quadrilineatus (Herpetodryas), 17.
 quadrivirgatus (Coluber), 53.
 quatuorlineatus (Coluber), 51.
 quincunciatus (Tropidonotus), 22.
 quinquelineatus (Drymobius), 48.

radiatus (Coluber), 54.
 rappi (Ablades), 78.
 rappi (Drymobius), 48.
 ravigieri (Zamenis), 45.
 reginae (Coronella), 63.
 reginae (Liophis), 63.
 regius (Python), 9.
 reinhardti (Philodryas), 100.
 renardi (Vipera), 130.
 reticulata (Diemenia), 117.
 reticulatus (Atractus), 80.
 reticulatus (Python), 8.
 reticulatus (Stegonotus), 38.
 reticulatus (Typhlops), 3.
 reuteri (Typhlops), 2.

- rhabdocephalus* (*Ophis*), 63.
Rhabdophidium, 81.
Rhachiodontinae, 86.
Rhadinaea, 65.
Rhamphiophis, 102.
Rhinophis, 15.
Rhinostoma, 98.
rhinostoma (*Simophis*), 76.
rhodogaster (*Enicognathus*), 16.
rhodomelas (*Macropisthodon*), 28.
rhodopleuron (*Chrysopelea*), 108.
rhodorhachis (*Zamenis*), 44.
rhodostoma (*Ancistrodon*), 137.
rhodostoma (*Trigonocephalus*), 137.
rhombeata (*Coronella*), 101.
rhombeata (*Lachesis*), 137.
rhombeatus (*Aspidelaps*), 130.
rhombeatus (*Causus*), 130.
rhombeatus (*Psammophylax*), 101.
rhombeatus (*Trimerorhinus*), 101.
rhombifer (*Drymobius*), 48.
rhombifer (*Oxyrrhopus*), 96.
rhomboidea (*Calamaria*), 85.
rhynchops (*Cerberus*), 88.
rostrata (*Atractaspis*), 136.
rothi (*Ablabes*), 77.
rothi (*Contia*), 77.
ruber (*Typhlops*), 3.
rupepelli (*Typhlops*), 3.
rufescens (*Coronella*), 35.
rufescens (*Crotaphopeltis*), 94.
rufescens (*Leptodira*), 94.
rufiventris (*Dromicus*), 61.
rufodorsatus (*Coluber*), 50.
rufozonatus (*Dinodon*), 38.
rufulus (*Ablabophis*), 35.
rufus (*Cylindrophis*), 14.
ruschenbergi (*Corallus*), 10.
russelli (*Vipera*), 133.
rusticus (*Oxyrrhopus*), 97.

salomonis (*Dendrophis*), 56.
sagittifera (*Rhadinaea*), 66.
samarensis (*Naja*), 122.
saurita (*Herpetodryas*), 19.
saurita (*Tropidonotus*), 19.
sauromates (*Coluber*), 51.

savignyi (*Tarbophis*), 91.
sayi (*Coronella*), 71.
sayi (*Herpetodryas*), 72.
scabra (*Dasyplectis*), 86.
scalaris (*Coluber*), 54.
scalaris (*Tropidonotus*), 18.
schinzi (*Typhlops*), 5.
schistosum (*Homaloceranium*), 110.
schistosus (*Helicops*), 29.
schistosus (*Hydrophis*), 114.
schlegeli (*Lachesis*), 141.
schmaackeri (*Coluber*), 53.
schneideri (*Python*), 8.
schneideri (*Vipera*), 134.
schokari (*Psammophis*), 103.
schotti (*Philodryas*), 100.
schrencki (*Coluber*), 51.
scutatus (*Tropidonotus*), 21.
scutifrons (*Glaeonotia*), 6.
scytale (*Calamaria*), 33.
scytale (*Ilysia*), 14.
sebae (*Python*), 8.
sebae (*Streptophorus*), 32.
sechellensis (*Lycognathopsis*), 34.
semiannulata (*Calamaria*), 84.
semiannulata (*Leptodira*), 91.
semiannulatus (*Tarbophis*), 91.
semicarinatus (*Ablabes*), 78.
semicinctum (*Homaloceranium*), 110.
semicinctus (*Tropidonotus*), 19.
semidoliatus (*Geophis*), 81.
semifasciatus (*Bungarus*), 119.
semimaclulata (*Contia*), 77.
semimaclulatus (*Ablabes*), 77.
semiornata (*Coronella*), 71.
semivariiegatus (*Philothamnus*), 58.
seoanei (*Vipera*), 131.
severus (*Ophis*), 64.
severus (*Xenodon*), 64.
sexcarinatus (*Herpetodryas*), 55.
sibilans (*Psammophis*), 103, 104.
siculus (*Tropidonotus*), 20.
signata (*Denisonia*), 117.
signatus (*Simotes*), 74.
Silybura, 15.
simoni (*Onychocephalus*), 5.
simoni (*Typhlops*), 5.

Simophis, 76.
 Simotes, 73.
 simus (Heterodon), 65.
 sirtalis (Tropidonotus), 18.
 Sistrurus, 141.
 smaragdina (Gastropyxis), 59.
 smaragdina (Hapsidophrys), 59.
 smythii (Grayia), 79.
 spilogaster (Tropidonotus), 27.
 Spilotes, 49.
 spilotes (Python), 7.
 spinalis (Achalinus), 33.
 spixi (Elaps), 126.
 sputatrix (Naja), 121.
 squamiger (Atheris), 135.
 Stegonotus, 38.
 Stenophis, 90.
 Stenorhina, 111.
 stolatus (Tropidonotus), 26.
 storerioides (Ischnognathus), 31.
 Streptophorus, 31.
 striatus (Epicrates), 10.
 striatus (Lycodon), 37.
 strigata (Lachesis), 139.
 stumpffi (Dromicus), 25.
 stumpffi (Tropidonotus), 25.
 Styporhynchus, 28.
 subcinctus (Lycodon), 38.
 subgriseus (Oligodon), 75.
 sublineatus (Oligodon), 75.
 subminiatus (Tropidonotus), 26.
 subniger (Zamenis), 44.
 subpunctatus (Polyodontophis), 17.
 sulphureus (Phrynonax), 48.
 sumatrana (Calamaria), 83.
 sundevalli (Glauconia), 6.
 surinamensis (Elaps), 125.
 syriacus (Tarbophis), 91.
Tachymenis, 98.
 taeniatus (Zamenis), 42.
 taeniogastra (Rhadinaea), 66.
 taeniolata (Coronella), 67.
 taeniurus (Coluber), 51.
 taeniurus (Liophis), 61.
 taeniurus (Oligodon), 75.
 Taphrometopon, 103

Tarbophis, 91.
 templetoni (Oligodon), 75.
 tenuis (Typhlops), 2.
 terlineata (Calamaria), 81.
 terrificus (Crotalus), 142.
 terrificus (Dendrelaphis), 57.
 tessellata (Calamaria), 85.
 tessellatus (Tropidonotus), 23.
 Tetralepis, 35.
 tetrataenia (Doliophis), 123.
 tetrazonus (Erythrolamprus), 109.
 textilis (Diemenia), 117.
 Thamnodynastes, 98.
 thebaicus (Eryx), 13.
 Thelotornis, 107.
 thomensis (Philothamnus), 59.
 Thrasops, 59.
 tigrinus (Tropidonotus), 25.
 Tomodon, 99.
 torquatus (Atractus), 80.
 torquatus (Leptocalamus), 75.
 torquatus (Polyodontophis), 16.
 trabalis (Zamenis), 43.
 Trachischium, 32.
 trachyrocta (Aspidura), 33.
 transversalis (Calamaria), 85.
 travancoricus (Lycodon), 38.
 Tretanorhinus, 30.
 trevelyanus (Rhinophis), 15.
 triangularis (Grayia), 79.
 triangularis (Hydrops), 70.
 trianguligerus (Tropidonotus), 21.
 triangulum (Coronella), 72.
 tricolor (Ablabes), 78.
 trigeminus (Oxyrhopus), 96.
 trigonatus (Dipsadomorphus), 92.
 trigonocephala (Lachesis), 140.
 trigonocephalus (Trimeresurus), 140.
 trilineatus (Atractus), 81.
 trilineatus (Dromicodryas), 17.
 trilineatus (Herpetodryas), 17.
 trilineatus (Trimerorhinus), 101.
 Trimerorhinus, 101.
 trimotatus (Simotes), 73.
 tripudians (Naja), 121.
 tristis (Dendrelaphis), 57.
 Tropidonotus, 18.

- troscheli (Typhlops), 3.
 truncatus (Styporhynchus), 28.
 truncatus (Tropidonotus), 28.
 tschudii (Elaps), 125.
 Typhlopidae, 1.
 Typhlops, 1.
 typhlus (Liophis), 62.
 typus (Dispholidus), 108.
- undulata** (Rhadinaea), 67.
 Ungalia, 12.
 unicolor (Boodon), 36.
 unicolor (Forlonia), 89.
 unicolor (Xenopeltis), 16.
 univirgatus (Callophis), 123.
 Uromacer, 60.
 Uropeltidae, 15.
 Urotheca, 68.
 ursinii (Vipera), 130.
- valakadien** (Enhydrina), 114.
 varia (Echis), 135.
 variabilis (Coluber), 49.
 variegatus (Boodon), 36.
 variegatus (Python), 7.
 variegatus (Tropidonotus), 19.
 varius (Typhlops), 5.
 ventrimaculata (Leptognathus), 129.
 ventrimaculatus (Zamenis), 44.
 venustissimus (Erythrolamprus), 109.
 vermicularis (Typhlops), 2.
 vermiformis (Calamaria), 83.
 vernalis (Contia), 76.
 versicolor (Calamaria), 85.
 versicolor (Zamenis), 46.
 vibakari (Tropidonotus), 21.
 Vipera, 130.
- vipera (Cerastes), 135.
 Viperidae, 130.
 viperina (Distira), 114.
 Viperinae, 130.
 viperinus (Hydrophis), 114.
 viperinus (Tropidonotus), 24.
 virgulata (Calamaria), 83.
 viridiflavus (Coluber), 43.
 viridiflavus (Zamenis), 43.
 viridis (Chondropython), 9.
 viridis (Dendraspis), 127.
 viridis (Trigonocephalus), 139.
 viridissimus (Herpetodryas), 100.
 viridissimus (Philodryas), 100.
 vitianus (Ogmodon), 115.
 vittata (Rhadinaea), 67.
 vittatus (Tropidonotus), 22, 26.
 vivax (Aelurophis), 91.
 vivax (Tarbophis), 91.
 vossi (Gonionotophis), 35.
 vossi (Gonionotus), 35.
- wagleri** (Lachesis), 141.
 weigeli (Dipsas), 129.
 weneri (Aparallactus), 111.
 wiedi (Typhlops), 4.
- xanthina** (Vipera), 133.
 Xenelaphis, 47.
 Xenocalamus, 111.
 Xenodon, 63.
 Xenopeltidae, 16.
 Xenopeltis, 16.
 Xylophis, 32.
- Zamenis**, 41.
 Zaoecys, 40.



Druckfehler.

Auf pag. 59 ist unter der Zeile:

Genus XLVIII. Gastropyxis Cope.

aus Versehen ausgefallen

„1. *Gastropyxis smaragdina* (Schlg.)“,
was wir zu verbessern bitten.







Acme

Bookbinding Co., Inc.
300 Summer Street
Boston, Mass. 02210



3 2044 093 315 299

